

TITLE - ISONIAZID + PYRAZINAMIDE + RIFAMPICIN / RIFATER MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Source : Medicines Org UK

Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

ריפאטר 50, 120, 300 מ"ג טבליות

איזוניאזיד, ריפמפיצין, פיראזינמיד

האם העלון הזה קשה לראות או לקרוא
טלפון 0800 035 2525 לעזרה

דברים חשובים שאתה צריך לדעת על טבליות Rifater

- חשוב מאוד שטיטול טבליות ריפאטר בדיוק כפי שהרופא שלך אמר לך
- אתה חייב להמשיך לקחת את זה עד שהרופא שלך אומר לך להפסיק
- אם אתה נוטל תרופות אחרות, כולל תרופות שקנית מבית המרקחת או החנות, עליך לוודא שהרופא שלך יודע
- טבליות Rifater הופכות את כל נוזלי הגוף שלך לצבע כתום או אדום. אל דאגה - זה נורמלי ולא מזיק
- קח טבליות Rifater על בטן ריקה. זה אומר לפחות 30 דקות לפני האוכל או שתיים אחרי האוכל
- בזמן שאתה נוטל טבליות ריפאטר, אסור לך לאכול גבינות מבשילות, בשר מבושל, דגים מסוימים (כמו טונה, סלמון ומקרל) או לשתות יין ובירה (ראה "נטילת טבליות ריפאטר עם אוכל ושתיה")
- אם אתה מקבל חום, אתה חולה, מתחיל להרגיש לא טוב יותר, מאבד תיאבון או הצהבה של העור, החניכיים או העיניים, עליך לדבר מיד עם הרופא שלך

קרא בעיון את שאר העלון לפני שתתחיל ליטול תרופה זו.

שמור עלון זה. ייתכן שתצטרך לקרוא אותו שוב. אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא או הרוקח שלך. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר את זה לאחרים. זה עלול להזיק להם, גם אם הסימפטומים שלהם זהים לשלך. אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם אתה מבחין בתופעות לוואי שאינן מופיעות בעלון זה, ספר לרופא או לרוקח.

מה יש בעלון זה

1. מה הן טבליות Rifater ולמה הן משמשות
2. מה עליך לדעת לפני נטילת טבליות ריפאטר
3. כיצד ליטול טבליות ריפאטר
4. תופעות לוואי אפשריות
5. כיצד לאחסן טבליות Rifater
6. תוכן החבילה ומידע נוסף

1. מה הן טבליות Rifater ולמה הן משמשות

טבליות ריפאטר מכילות שלוש תרופות שונות הנקראות איזוניאזיד, ריפמפיצין ופיראזינאמיד. כולם שייכים לקבוצת תרופות הנקראות תרופות נגד שחפת. הם פועלים על ידי הריגת החיידקים הגורמים לשחפת. טבליות Rifater משמשות לטיפול בשחפת (הידועה גם בשם שחפת).

2. מה עליך לדעת לפני נטילת טבליות ריפאטר

אין ליטול טבליות ריפאטר אם:

- אאתה אלרגי (רגיש יתר) ל
- איזוניאזיד
- ריפמפיצין
- פיראזינאמיד
- כל אחד מהמרכיבים האחרים של טבליות Rifater (ראה סעיף 6: מידע נוסף) סימנים לתגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות בליעה או נשימה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.

× יש לך הצהבה של העור והעיניים (צהבת)

- × אתה נוטל סקווינאוור או ריטונביר לטיפול בזיהום ב-HIV (ראה סעיף 'נטילת תרופות אחרות' להלן)
- אין ליטול אם אחד מהמפורטים לעיל חל עליך. אם אינך בטוח, שוחח עם הרופא או הרוקח לפני נטילת טבליות Rifater.

אזהרות ואמצעי זהירות

שוחח עם הרופא או הרוקח שלך לפני נטילת טבליות Rifater אם:

- יש לך בעיות בכבד
- יש לך בעיות כליות כלשהן ואם יש לך יותר מ-600 מ"ג ריפמפיצין ליום יש לך סוכרת. הסוכרת שלך עלולה להיות קשה יותר לשלוט בזמן נטילת התרופה
- יש לך או סבלת אי פעם בגאוס (כאב או נפיחות במפרקים) אתה משתעל דם
- יש לך אפילפסיה
- יש לך או היו לך אי פעם בעיות נפשיות (כגון דיכאון או סכיזופרניה) אתה מרגיש קהה או חלש בידיים וברגליים (נוירופתיה היקפית)
- יש לך זיהום ב-HIV
- אתה תחת משקל או מתת תזונה
- אתה שותה אלכוהול כל יום או שאתה אלכוהוליסט
- אתה מזריק לעצמך סמים
- את אישה שחורה או היספנית
- יש לך בעיית דם נדירה הנקראת 'פורפיריה'
- יש לך בעיה עם דימום או נטייה לחבלות בקלות
- הסימפטומים של שחפת חוזרים או מחמירים (ראה סעיף 4 תופעות לוואי אפשריות) הרופא אמר לך שלוקח לגוף שלך הרבה זמן להיפטר מכמה תרופות (יש לך מצב של אצטילטור איטי)
- אתה מרכיב עדשות מגע. נטילת טבליות ריפאטר עלולה להכתיים לצמיתות עדשות מגע רכות האדם הנוטל תרופה זו הוא ילד
- אתה בן 65 ומעלה
- אם אינך בטוח אם אחד מהדברים לעיל חל עליך, שוחח עם הרופא או הרוקח שלך לפני נטילת טבליות Rifater.

בדיקת דם

- הרופא שלך יצטרך לבדוק את הדם שלך לפני שאתה לוקח את התרופה. זה יעזור לרופא שלך לדעת אם יש שינויים כלשהם בדם שלך לאחר נטילת התרופה.
- אם אתה בן 35 ומעלה, תצטרך גם לעבור בדיקות דם חודשיות כדי לבדוק איך הכבד שלך פועל.

יש להיזהר במיוחד עם טבליות Rifater

- תגובות עור חמורות כולל תסמונת סטיבנס-ג'ונסון (SJS), נמק אפידרמיס רעיל(עשר), דווח על תגובה של תרופה עם אאוזינופיליה ותסמינים מערכתיים (DRESS), (AGEP) (generalized exanthematous pustulosis) עם שימוש בטבליות Rifater.
- יכולים להופיע בתחילה ככתמי מטה אדמדמים או ככתמים עגולים, לעתים קרובות עם שלפוחיות מרכזיות על תא המטען. כמו כן, עלולים להופיע כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניים (עיניים אדומות ונפוחות). פריחות עור חמורות אלו קודמות לרוב על ידי חום ו/או תסמינים דמויי שפעת. הפריחות עלולות להתקדם לקילוף נרחב של העור ולסיבוכים מסכני חיים או להיות קטלניים SJS/TEN
- . מופיע בתחילה כתסמינים דמויי שפעת ופריחה בפנים ולאחר מכן פריחה ממושכת עם טמפרטורת גוף גבוהה, רמות מוגברות של אנזימי כבד הנראות בבדיקות דם ועלייה בסוג של תאי דם לבנים (אאוזינופיליה) ובלוטות לימפה מוגדלות DRESS

- מופיעה בתחילת הטיפול כפריחה אדומה וקשקשת נרחבת עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות המלוות בחום. המיקום הנפוץ ביותר: ממוקם בעיקר על קפלי העור, הגזע והגפיים העליונות AGEP

הסיכון הגבוה ביותר להתרחשות של תגובות עור חמורות הוא תוך יומיים עד חודשיים לאחר תחילת הטיפול בהתאם למצב. **אם אתה מפתח פריחה חמורה או אחר מתסמיני עור אלו, הפסק ליטול טבליות Rifater ופנה לרופא שלך או פנה מיד לטיפול רפואי.**

תרופות אחרות וטבליות ריפאטר

אנא ספר לרופא או לרוקח אם אתה נוטל או נטלת לאחרונה תרופות אחרות כלשהן. זה כולל תרופות שאתה קונה ללא מרשם, כולל תרופות צמחיות. הסיבה לכך היא שטבליות Rifater יכולות להשפיע על אופן הפעולה של תרופות אחרות. כמו כן, תרופות מסוימות יכולות להשפיע על אופן הפעולה של טבליות Rifater.

בפרט, אל תיקח תרופה זו, וספר לרופא שלך אם אתה נוטל:

HIV-המשמשים לזיהום ב ritonavir או Saquinavir ×

התרופות הבאות יכולות לגרום לטבליות Rifater לעבוד פחות טוב:

- נוגדי חומצה המשמשים לבעיות עיכול. קח טבליות Rifater לפחות שעה אחת לפני נטילת נוגדי חומצה
- תרופות אחרות המשמשות לשחפת כגון (PAS) (P-aminosalicylic acid-1-cycloserine). יש ליטול טבליות PAS וריפאטר בהפרש של 8 שעות לפחות

ספר לרופא שלך אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:

תרופות לב ודם

- תרופות ליתר לחץ דם
- תרופות לבעיות לב או לשלוט בקצב הלב שלך
- תרופות המשמשות לדילול הדם כגון וורפרין וקלופידוגרל
- תרופות המשמשות להורדת כולסטרול
- טבליות מים (משתנים) כגון אפלרנון **בריאות הנפש,**

אפילפסיה ותרופות נירונים מוטוריים

- תרופות להפרעות חשיבה הידועות בשם 'אנטי פסיכוטיות' כגון הלופרידול
- תרופות להרגעה או הפחתת חרדה (תרופות היפנוטיות, תרופות חרדה)
- תרופות שיעזרו לך לישון (ברביטורטים)
- תרופות המשמשות לאפילפסיה כגון פניטואין וקרבימזפין
- תרופות מסוימות המשמשות לדיכאון כגון אמיטריפטילין ונורטריפטילין
- רילוזול - משמש למחלת נירונים מוטוריים

תרופות לזיהומים ולמערכת החיסון

- תרופות מסוימות המשמשות לזיהום HIV כגון stavudine ו- zalcitabine
- תרופות מסוימות המשמשות לזיהומים ויראליים כגון אינדינביר, אפבירנץ, אמפרנביר, נלפינביר, אטאזנוויר, לופינאביר, נוויפרין, דקלטאסוויר, סימפרוויר, סופוסבוביר וטלפרביר
- תרופות המשמשות לזיהומים פטרייתיים
- תרופות המשמשות לזיהומים חיידקיים (אנטיביוטיקה)
- תרופות המשמשות להורדת המערכת החיסונית שלך כגון ציקלוספורין, סירולימוס וטקרולימוס
- משמש לזיהומים בתולעי סרט - Praziquantel
- משמש לדלקת ריאות -

Atovaquone תרופות הורמונים וסרטן

- תרופות הורמונליות מסוימות (אסטרוגן, הורמונים מערכתיים, פרוגסטוגנים) המשמשות לאמצעי מניעה או סוגים מסוימים של סרטן כגון אתנילאסטרדיול, לבונורגסטרל או דידרוסטרון
- כמה תרופות הורמונים (אנטי אסטרוגנים) המשמשות לסרטן השד או אנדומטריוזיס כגון טמוקסיפן, טורמיפן וגסטרינון

- תרופות מסוימות המשמשות לסרטן (ציטוטוקסיות) כגון אימטיניב
- המשמש לבעיות בבלוטת התריס (הורמון בלוטת התריס) (Levothyroxine)
- אירינוטקן - משמש לסרטן **תרופות**

לכאב, דלקת וגאווט

- תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידליות (NSAIDs) כגון אטוריקוקסיב, אספירין ואינדומטצין
- תרופות המשמשות לכאב כגון קודאין, מורפיום, פנטניל או פטידין
- קורטיקוסטרואידים המשמשים לדלקת כגון הידרוקורטיזון, בטמתזון ופרדניזולון

- מתדון - משמש לגמילה מהרואין
- משמש למחלת גאווט -

Sulfinpyrazone תרופות אחרות

- תרופות המשמשות לסוכרת
- תרופות המשמשות להרפיית שרירים לפני ניתוח (חומרי הרדמה) כגון הלוטן
- תרופות המשמשות לבעיות זקפה כגון טדלפיל
- תרופות מסוימות המשמשות לתחושת חולי או חולה כגון אונדנסטרון ואפרפיטנט
- פרובנציד (בשימוש עם תרופה בשם cidofovir כדי לעצור נזק לכליות)
- תרופות אנטיביוטיות אחרות כגון צפזולין
- כינין - משמש למלריה
- תיאופילין - משמש לצפצופים או קשיי נשימה

נטילת טבליות Rifater עם אוכל ושתייה

איזוניאזיד עלול לקיים אינטראקציה עם מזונות המכילים היסטמין או טירמין (למשל גבינות מבשילות, בשר מבושל, דגים מסוימים כמו טונה, סלמון ומקרל, יין ובירה), ולגרום לתסמינים הכוללים כאב ראש, הזעה, הסמקה, דופק מהיר, לא אחיד או חזק (דפיקות לב), סחרחורת, תחושת סחרחורת או עילפון (עקב לחץ דם נמוך). יש להימנע ממזונות אלה אם אתה מקבל איזוניאזיד. הרופא שלך יוכל ליעץ בהמשך.

הריון והנקה

שוחח עם הרופא שלך לפני נטילת התרופה אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או חושבת שאת בהריון טבליות ריפאטר עשויות לגרום ל"גלולה" למניעת הריון לעבוד פחות טוב. המשמעות היא שעליך לעבור לסוג אחר של אמצעי מניעה. במקום זאת, עליך להשתמש באמצעי מניעה אמין, כגון קונדומים או "סליל" בעת נטילת טבליות ריפאטר. אם יש לך שאלות או אינך בטוח לגבי זה, שוחח עם הרופא או הרוקח שלך.

אסור להניק אם את נוטלת טבליות ריפאטר. הסיבה לכך היא שכמויות קטנות עלולות לעבור לחלב האם. אם את מניקה או מתכננת להניק, שוחח עם הרופא או הרוקח שלך לפני נטילת תרופה כלשהי.

נהיגה ושימוש במכוונות

אתה עלול להרגיש סחרחורת או עילפון, לסבול מבעיות ראייה או לתופעות לוואי אחרות שעלולות להשפיע על יכולתך לנהוג בזמן נטילת התרופה. אם זה קורה, אין לנהוג או להשתמש בכלים או מכוונות כלשהן.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של טבליות Rifater טבליות Rifater

מכילות:

- **סוכרוז:** אם הרופא שלך אמר לך שאתה לא יכול לסבול כמה סוכרים, שוחח עם הרופא שלך לפני נטילת טבליות ריפאטר
- **נתרן:** טבליות אלו מכילות פחות מ-1 ממול נתרן (23 מ"ג) למנה יומית והן בעצם 'נטולות נתרן'.

3. כיצד ליטול טבליות ריפאטר

קח תמיד ריפאטר טבליות בדיוק כפי שהרופא שלך אמר לך. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המשך לקחת את התרופה

- עליך ליטול את הטבליות כל יום במשך כל הזמן שהרופא אמר לך לקחת אותן
- אל תפסיק ותתחיל ליטול את הטבליות. זה עלול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי והשחפת שלך לא תטופל כראוי

כיצד לקחת את הטבליות

- קח תרופה זו דרך הפה
 - יש לבלוע את הטבליות בשלמותן, עם משקה מים
 - קח לפחות 30 דקות לפני הארוחה או שעתיים לאחר הארוחה
 - קח את כל הטבליות יחד כל יום, כמנה בודדת
 - אין לתת תרופה זו לילדים
 - אם אתה מרגיש שההשפעה של התרופה שלך חלשה מדי או חזקה מדי, אל תשנה את המינון בעצמך, אלא שאל את הרופא שלך
- הרופא שלך עשוי לבקש ממך לקחת ויטמין B₆ במהלך הטיפול בטבליות Rifater, במיוחד אם אתה מתת תזונה, קשיש או חולה סוכרת.

כמה לקחת המינון

הרגיל הוא:

מבוגרים וקשישים

- בין 3 ל-6 טבליות בכל יום. הכמות תלויה במשקל הגוף שלך
- אם אתה מבוגר, הרופא שלך עשוי לעקוב מקרוב אחר הטיפול שלך **ילדים**

תרופה זו אינה מומלצת לשימוש בילדים.

אם אתה נוטל יותר טבליות Rifater ממה שאתה צריך

אם אתה נוטל יותר טבליות Rifater ממה שאתה צריך, ספר לרופא או פנה מיד למחלקת נפגעים בבית החולים. קח איתך את חבילת התרופות. זה כדי שהרופא ידע מה לקחת.

אתה עלול להרגיש בחילה (בחילה), להיות חולה (הקאה), לסבול מכאבי בטן, גירוד או כאב ראש. אתה עלול גם להרגיש עייף, ישנוני, סחרחורת, סחרחורת, חזון מטושטש או מוזר (הזיות) ולהתעלף או להרגיש עילפון. סימנים אחרים של נטילת יותר מדי כוללים נפיחות של הפנים, העיניים או העפעפיים, עיכוב בדיבור, קשיי נשימה, דופק מהיר, פעימות לב לא אחידות, התקפים והתקף לב.

אם שכחת ליטול טבליות ריפאטר

אם שכחת מנה, קח אותה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על הטבליות שנשכחו.

מבחנים

נטילת טבליות Rifater עשויה להשפיע על תוצאות בדיקות דם מסוימות. בפרט, בדיקות לחומצה פולית, ויטמין B₁₂ ותפקודי כבד. אם אתה עומד לעבור בדיקת דם, חשוב לספר לרופא שלך שאתה נוטל טבליות ריפאטר.

4. תופעות לוואי אפשריות

כמו כל התרופות, תרופה זו עלולה לגרום לתופעות לוואי, אם כי לא כולם מקבלים אותן. **הפסק ליטול ופנה מיד לבית חולים אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:**

- יש לך תגובה אלרגית. הסימנים עשויים לכלול: פריחה, בעיות בליעה או נשימה, צפצופים, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.

- פריחת חמורות בעור כולל תסמונת סטיבן-ג'ונסון, נמק אפידרמיס רעיל. אלה יכולים להופיע כמקולות דמויות מטרה אדמדמות או כתמים עגולים, לעתים קרובות עם שלפוחיות מרכזיות על תא המטען, קילוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניים ויכולים להקדים אותם על ידי חום ותופעות דמויי שפעת. **ראה גם סעיף 2.**
- פריחה נרחבת, טמפרטורת גוף גבוהה, עליות אנזימי כבד, הפרעות בדם (אאוזינופיליה), בלוטות לימפה מוגדלות ומעורבות של איברי גוף אחרים (תגובת תרופות עם אאוזינופיליה ותסמינים מערכתיים המוכרת גם כ-DRESS או תסמונת רגישות יתר לתרופות). **ראה גם סעיף 2.**
- פריחה אדומה, קשקשית נרחבת עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות המלוות בחום בתחילת הטיפול (פוסטולוזיס אקוסטמטי אקוטי). **ראה גם סעיף 2.**
- אתה חוט בקלות מהרגיל. לחלופין, ייתכן שיש לך פריחה כואבת של כתמים אדומים כהים מתחת לעור אשר אינם נעלמים כאשר אתה לוחץ עליהם (פורפורה). זה יכול להיות בגלל בעיית דם חמורה
- יש לך דימום חמור (דימום)
- תגובה פרדוקסלית לתרופה: תסמיני שחפת יכולים לחזור, או תסמינים חדשים יכולים להופיע לאחר שיפור ראשוני במהלך הטיפול. תגובות פרדוקסליות דווחו כבר שבועיים ועד מאוחר עד 18 חודשים לאחר תחילת הטיפול נגד שחפת. תגובות פרדוקסליות קשורות בדרך כלל לחום, בלוטות לימפה נפוחות (לימפדניטיס), קוצר נשימה ושיעול. חולים עם תגובה פרדוקסלית לתרופה יכולים גם לחוות כאבי ראש, אובדן תיאבון וירידה במשקל
- יש לך צמרמורות, עייפות, צבע עור חיוור יוצא דופן, קוצר נשימה, דופק מהיר או שתן כהה. זה יכול להיות סימנים לסוג רציני של אנמיה
- יש לך דם בשתן או עלייה או ירידה בכמות השתן שאתה מייצר. אתה עלול גם לקבל נפיחות, במיוחד של הרגליים, הקרסוליים או הרגליים. זה עלול להיגרם מבעיות כליות חמורות
- יש לך כאב ראש חזק פתאומי. זה יכול להיות סימן לדימום במוח
- קוצר נשימה וצפצופים
- אתה מתבלבל, ישנוני, עור דביק קר, נשימה רדודה או קשה, דופק דופק או שהעור שלך חיוור מהרגיל. אלה יכולים להיות סימנים להלם
- אתה מקבל יותר זיהומים בקלות רבה מהרגיל. הסימנים כוללים חום, כאב גרון או כיבים בפה. זה יכול להיות בגלל שיש לך מספר נמוך של תאי דם לבנים
- יש לך דימום מהאף, האוזן, החניכיים, הגרון, העור או הבטן. הסימנים עשויים לכלול תחושת רגישות ונפיחות בבטן, כתמים סגולים על העור וצואה שחורה או דמוית זפת.

אם אתה נתקל באחת מתופעות הלוואי הבאות פנה לרופא בהקדם האפשרי:

- דלקת בלבלב, הגורמת לכאבים עזים בבטן ובגב (דלקת לבלב, תדירות לא ידועה).
- הצהבה של העור או לובן העיניים, או שתן מתכהה והצואה חיוורת, עייפות, חולשה, חולשה, חוסר תיאבון, בחילות או הקאות הנגרמות מבעיות כבד (דלקת כבד, עשויה להשפיע על עד 1 מכל 100 אנשים).

שוחח מיד עם הרופא שלך אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:

- בעיות נפשיות עם מחשבות חריגות וחזיונות מוזרים (הזיות)
- כיב הקיבה שלך מחמיר
- שלשול מימי חמור שלא יפסיק ואתה מרגיש חולשה וחום. זה עשוי להיות משהו שנקרא 'קוליטיס פסאודומברני'
- ההתקפים שלך מחמירים או שאתה מתחיל לקבל התקפים
- תסמינים דמויי שפעת כולל צמרמורות, חום, כאבי ראש, סחרחורת וכאבי עצמות

ספר לרופא שלך בהקדם האפשרי אם יש לך אחת מתופעות הלוואי הבאות:

- אצירת מים (בצקת) שעלולה לגרום לנפיחות בפנים, בבטן, בזרועות או ברגליים
- חולשת שרירים או כאב או אובדן רפלקסים בשרירים
- סחרחורת, תחושת סחרחורת והתעלפות, במיוחד כאשר אתה עומד או מתיישב במהירות (בשל לחץ דם נמוך)
- אצבעות, בהונות או קרסוליים נפוחות
- חוסר יכולת להתרכז, תחושת עצבים, עצבנות או דיכאון
- בעיות שיווי משקל עם סחרחורת (ורטיגו)
- תחושת עייפות וחולשה רבה או קשיי שינה (נדודי שינה)
- תחושות עור חריגות כגון תחושת חוסר תחושה, עקצוץ, דקירות, צריבה או זחילה על העור (פארסתזיה)
- אובדן זיכרון לטווח קצר, חרדה, פחות ערנות או תגובה
- ראייה מטושטשת או מעוותת
- בזבוז של שרירים או רקמות גוף אחרות
- ירידה במשקל, הזעות לילה וחום. אלה יכולים להיות סימנים למצב דם הנקרא אאוזינופיליה
- מרגישים חולים או חולים

ספר לרופא או לרוקח אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מחמירה או נמשכת יותר ממספר ימים:

- אקנה
- אובדן תיאבון (אנורקסיה)
- כאב ראש
- סומק בעור או גירוד
- מפרקים כואבים, אדומים, נפוחים
- כאב או אי נוחות בעת מתן שתן
- מחזור לא סדיר
- עצירות, שלשול, אי נוחות בבטן או יובש בפה
- הגדלת חזה אצל גברים
- צמא מוגבר, ללכת לשירותים לעתים קרובות יותר ותחושת עייפות. ייתכן שרמת הסוכר בדם שלך גבוהה
- דלקת של כלי הדם.

תופעות לוואי אחרות עליך לדון עם הרופא שלך אם אתה מודאג מהן

- אתה מבחין בשינוי צבע (צבע צהוב, חום, כתום או אדום בשיניים, שתן, זיעה, ליחה (ליחה), רוק או דמעות. זה די נפוץ ואין צורך לדאוג. עם זאת, הצבע עלול להכתים לצמיתות עדשות מגע רכות הצבע בדמעות עשוי להימשך זמן מה לאחר הפסקת השימוש בטבליות ריפאטר.

בדיקת דם

- בדיקת דם עשויה להראות שינויים באופן שבו הכבד פועל

דיווח על תופעות לוואי

אם אתה מקבל תופעות לוואי כלשהן, שוחח עם הרופא, הרוקח או האחיות. זה כולל כל תופעות לוואי אפשריות שאינן מופיעות בעלון זה. אתה יכול גם לדווח על תופעות לוואי ישירות דרך תוכנית הכרטיס הצהוב בכתובת: www.mhra.gov.uk/yellowcard או חפש את MHRA Yellow Card ב-Google Play או Apple App Store.

על ידי דיווח על תופעות לוואי אתה יכול לעזור לספק מידע נוסף על הבטיחות של תרופה זו.

5. כיצד לאחסן טבליות Rifater

שמור את התרופה במקום בטוח שבו ילדים לא יכולים לראות או להגיע אליה. אין להשתמש בטבליות Rifater לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה והבליסטר. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. אחסן מתחת ל-25 מעלות צלזיוס. אחסן במיכל המקורי.

אין להשליך תרופות דרך פסולת מים או פסולת ביתית. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאינן נחוצות עוד. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. תוכן החבילה ומידע נוסף

מה מכילות טבליות Rifater:

- כל טבליה מכילה 50 מ"ג איזוניאזיד, 120 מ"ג ריפמפיצין ו-300 מ"ג פיראזינימיד. אלו הם החומרים הפעילים
- המרכיבים האחרים הם פוליווינילפירולידון, נתרן קרבוקסימילצלולוזה, נתרן לאוריל סולפט, סידן סטארט, סוכרוז, מסטיק שיטה, טלק, מגנזיום פחמתי קל, קאולין, סיליקון דו-חמצני קולואידי, ג'ל אלומיניום הידרוקסיד וצבעים טיטניום דו חמצני (E172) וברזל דו חמצני (E172).

איך נראות טבליות Rifater ותכולת האריזה

הטבליות בצבע ורוד בהיר, חלק, מבריק, עגול ומצופה בסוכר. כל חבילה מכילה 100 טבליות.

בעל אישור שיווק בעל אישור

שיווק

Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK Tel : 0800 0352525

Sanofi, 410Thames

דוא"ל: medicalinformation@sanofi.com

uk יצרן

SanofiSPA

ViaValcanello, 4

03012Anagni)FR(

איטליה

עלון זה אינו מכיל את כל המידע הנדרש על התרופה שלך. אם יש לך שאלות או אינך בטוח במשהו, שאל את הרופא או הרוקח.

עלון זה עודכן לאחרונה באוגוסט 2021

סאנופי 1984 - 2021