TITLE - ISOTRETINOIN / ABSORICA ACCUTANE
MEDICATION PATIENT INFORMATION
IN SWEDISH

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a681043.html

Isotretinoin

uttalas som (eye soe tret' i noyn)

VIKTIG VARNING:

För alla patienter:

Isotretinoin får inte tas av patienter som är gravida eller som kan bli gravida. Det finns en stor risk att isotretinoin kommer att orsaka förlust av graviditeten, eller att barnet föds för tidigt, dör kort efter födseln eller föds med fosterskador (fysiska problem som finns vid födseln).

Ett program som heter iPLEDGE har satts upp för att säkerställa att gravida kvinnor inte tar isotretinoin och att kvinnor inte blir gravida medan de tar isotretinoin. Alla patienter, inklusive kvinnor som inte kan bli gravida och män, kan få isotretinoin endast om de är registrerade hos iPLEDGE, har ett recept från en läkare som är registrerad hos iPLEDGE och fyller i receptet på ett apotek som är registrerat hos iPLEDGE. Köp inte isotretinoin över internet.

Du kommer att få information om riskerna med att ta isotretinoin och måste skriva under ett informerat samtycke om att du förstår denna information innan du kan få medicinen. Du kommer att behöva träffa din läkare varje månad under din behandling för att prata om ditt tillstånd och de biverkningar du upplever. Vid varje besök kan din läkare ge dig ett recept på upp till 30 dagars leverans av medicin utan påfyllning. Om du är en kvinna som kan bli gravid behöver du också göra ett graviditetstest i ett godkänt labb varje månad och få ditt recept fyllt och hämtat inom 7 dagar efter ditt graviditetstest. Om du är en man eller om du är en kvinna som inte kan bli gravid måste du få detta recept fyllt och hämtat inom 30 dagar efter ditt läkarbesök.

Berätta för din läkare om du inte förstår allt du fick höra om isotretinoin och iPLEDGE-programmet eller om du inte tror att du kommer att kunna hålla tider eller fylla på ditt recept enligt schemat varje månad.

Din läkare kommer att ge dig ett identifikationsnummer och kort när du påbörjar din behandling. Du behöver detta nummer för att fylla i dina recept och för att få information från iPLEDGEs webbplats och

telefonlinje. Förvara kortet på ett säkert ställe där det inte försvinner bort. Om du tappar bort ditt kort kan du be om ett ersättningskort via webbplatsen eller telefonlinjen.

Donera inte blod medan du tar isotretinoin och under 1 månad efter din behandling.

Dela inte isotretinoin med någon annan, inte ens någon som har samma symtom som du har.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med isotretinoin och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administrations (FDA) webbplats (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]), tillverkarens webbplats eller iPLEDGE-programmets webbplats (http://www.ipledgeprogram.com [http://www.ipledgeprogram.com]) för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att ta isotretinoin.

För kvinnliga patienter:

Om du kan bli gravid måste du uppfylla vissa krav under din behandling med isotretinoin. Du måste uppfylla dessa krav även om du inte har börjat menstruera (har månatliga menstruationer) eller har genomgått en äggledarligation ('rör knutna'; operation för att förhindra graviditet). Du kan vara ursäktad från att uppfylla dessa krav endast om du inte har haft mens på 12 månader i rad och din läkare säger att du har passerat klimakteriet (livsförändring) eller om du har opererat bort din livmoder och/eller båda äggstockarna. Om inget av dessa stämmer för dig måste du uppfylla kraven nedan.

Du måste använda två acceptabla former av preventivmedel i 1 månad innan du börjar ta isotretinoin, under din behandling och i 1 månad efter din behandling. Din läkare kommer att tala om för dig vilka former av preventivmedel som är acceptabla och kommer att ge dig skriftlig information om preventivmedel. Du kan också få ett kostnadsfritt besök hos en läkare eller familjeplaneringsexpert för att prata om preventivmedel som är rätt för dig. Du måste alltid använda dessa två former av preventivmedel om du inte kan lova att du inte kommer att ha någon sexuell kontakt med en man under 1 månad före din behandling, under din behandling och under 1 månad efter din behandling.

Om du väljer att ta isotretinoin är det ditt ansvar att undvika graviditet i 1 månad före, under och i 1 månad efter din behandling. Du måste förstå att alla former av preventivmedel kan misslyckas. Därför är det mycket viktigt att minska risken för oavsiktlig graviditet genom att hela tiden använda två former av preventivmedel. Berätta för din läkare om du inte förstår allt du fick höra om preventivmedel eller om du inte tror att du kommer att kunna använda två former av preventivmedel hela tiden.

Om du planerar att använda p-piller (p-piller) medan du tar isotretinoin, berätta för din läkare namnet på det p-piller du ska använda. Isotretinoin stör effekten av mikrodoserat gestagen

('minipiller') orala preventivmedel (Ovrette, Micronor, Nor-QD). Använd inte denna typ av preventivmedel när du tar isotretinoin.

Om du planerar att använda hormonella preventivmedel (p-piller, plåster, implantat, injektioner, ringar eller intrauterina enheter), var noga med att berätta för din läkare om alla mediciner, vitaminer och växtbaserade kosttillskott du tar. Många mediciner stör effekten av hormonella preventivmedel. Ta inte johannesört om du använder någon typ av hormonellt preventivmedel.

Du måste ha två negativa graviditetstester innan du kan börja ta isotretinoin. Din läkare kommer att tala om för dig när och var du ska göra dessa tester. Du kommer också att behöva testas för graviditet i ett laboratorium varje månad under din behandling, när du tar din sista dos och 30 dagar efter att du tagit din sista dos.

Du kommer att behöva kontakta iPLEDGE-systemet via telefon eller internet varje månad för att bekräfta de två former av preventivmedel du använder och för att svara på två frågor om iPLEDGE-programmet. Du kommer bara att kunna fortsätta att få isotretinoin om du har gjort detta, om du har besökt din läkare för att prata om hur du mår och hur du använder din preventivmedel och om du har haft ett negativt graviditetstest under de senaste 7 dagar.

Sluta ta isotretinoin och ring din läkare omedelbart om du tror att du är gravid, missar en menstruation eller om du har sex utan att använda två former av preventivmedel. Om du blir gravid under din behandling eller inom 30 dagar efter din behandling kommer din läkare att kontakta iPLEDGE-programmet, tillverkaren av isotretinoin och Food and Drug Administration (FDA). Du kommer också att prata med en läkare som är specialiserad på problem under graviditeten som kan hjälpa dig att göra val som är bäst för dig och ditt barn. Information om din hälsa och ditt barns hälsa kommer att användas för att hjälpa läkare att lära sig mer om effekterna av isotretinoin på ofödda barn.

För manliga patienter:

En mycket liten mängd isotretinoin kommer förmodligen att finnas i din sperma när du tar ordinerade doser av denna medicin. Det är inte känt om denna lilla mängd isotretinoin kan skada fostret om din partner är eller blir gravid. Tala om för din läkare om din partner är gravid, planerar att bli gravid eller blir gravid under din behandling med isotretinoin.

hur är denna medicin utskriven?

Isotretinoin används för att behandla svår motstridig nodulär akne (en viss typ av svår akne) som inte har hjälpt av andra behandlingar, såsom antibiotika. Isotretinoin är i en klass av läkemedel som kallas retinoider. Det fungerar genom att bromsa produktionen av vissa naturliga ämnen som kan orsaka akne.

hur ska detta läkemedel användas?

Isotretinoin kommer som en kapsel att ta genom munnen. Isotretinoin tas vanligtvis två gånger om dagen med måltider i 4 till 5 månader åt gången. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och fråga din

läkare eller apotekspersonal för att förklara någon del du inte förstår. Ta isotretinoin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj kapslarna hela med ett helt glas vätska. Tugga, krossa eller sug inte på kapslarna.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en genomsnittlig dos av isotretinoin och öka eller minska din dos beroende på hur väl du svarar på medicinen och de biverkningar du upplever. Följ dessa anvisningar noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du inte är säker på hur mycket isotretinoin du ska ta.

Det kan ta flera veckor eller längre för dig att känna full nytta av isotretinoin. Din akne kan förvärras under början av din behandling med isotretinoin. Detta är normalt och betyder inte att medicinen inte fungerar. Din akne kan fortsätta att förbättras även efter att du avslutat din behandling med isotretinoin.

användningsområdena för detta läkemedel

Isotretinoin har använts för att behandla vissa andra hudåkommor och vissa typer av cancer. Tala med din läkare om de möjliga riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Detta läkemedel kan ordineras för andra ändamål. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar isotretinoin,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot isotretinoin, vitamin A, andra läkemedel eller något av innehållsämnena i isotretinoinkapslar. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista över de inaktiva ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, örtprodukter och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna mediciner för anfall som fenytoin (Dilantin); mediciner för psykisk ohälsa; orala steroider såsom dexametason (Decadron, Dexone), metylprednisolon (Medrol) och prednison; tetracyklinantibiotika såsom demeklocyklin (Declomycin), doxycyklin (Monodox, Vibramycin, andra), minocyklin (Minocin, Vectrin), oxytetracyklin (Terramycin) och tetracyklin (Sumycin, Tetrex, andra); och vitamin A-tillskott. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- tala om för din läkare om du eller någon i din familj har funderat på eller försökt begå självmord och om du eller någon i din familj har eller någonsin har haft depression, psykisk sjukdom, diabetes, astma, osteoporos (ett tillstånd där benen är sköra och går sönder lätt), osteomalaci (svaga ben på grund av brist på vitamin D eller svårigheter att absorbera detta vitamin), eller andra tillstånd som orsakar svaga ben, en hög triglyceridnivå (fetter i blodet), en störning i lipidmetabolismen (vilket som helst tillstånd som gör det svårt för din kropp att bearbeta fetter), anorexia nervosa (en ätstörning där väldigt lite äts) eller hjärt- eller leversjukdom. Tala även om för din läkare om du är överviktig eller om du dricker eller någonsin har druckit stora mängder alkohol.
- amma inte medan du tar isotretinoin och i 1 månad efter att du slutat ta isotretinoin.
- planera för att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus och att bära skyddskläder, solglasögon och solskyddsmedel. Isotretinoin kan göra din hud känslig för solljus.

- du bör veta att isotretinoin kan orsaka förändringar i dina tankar, beteende eller mental hälsa. Vissa patienter som tagit isotretinoin har utvecklat depression eller psykos (förlust av kontakt med verkligheten), har blivit våldsamma, har funderat på att döda eller skada sig själva och har försökt eller lyckats med det. Du eller din familj bör ringa din läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom: ångest, sorg, gråtfall, förlorat intresse för aktiviteter du brukade tycka om, dåliga prestationer i skolan eller arbetet, sova mer än vanligt, svårt att falla sova eller sova, irritabilitet, ilska, aggression, förändringar i aptit eller vikt, koncentrationssvårigheter, dra sig undan från vänner eller familj, brist på energi, känslor av värdelöshet eller skuld, funderingar på att döda eller skada dig själv, agera på farliga tankar, eller hallucinationer (att se eller höra saker som inte finns). Se till att dina familjemedlemmar vet vilka symtom som är allvarliga så att de kan ringa läkare om du inte kan söka behandling på egen hand.
- du bör veta att isotretinoin kan få dina ögon att kännas torra och göra det obehagligt att bära kontaktlinser under och efter behandlingen.
- du bör veta att isotretinoin kan begränsa din förmåga att se i mörker. Detta problem kan uppstå plötsligt när som helst under behandlingen och kan fortsätta efter att behandlingen har avbrutits. Var mycket försiktig när du kör bil eller använder maskiner på natten.
- planera för att undvika hårborttagning genom vaxning, laser hudbehandlingar och dermabrasion (kirurgisk utjämning av huden) medan du tar isotretinoin och i 6 månader efter din behandling. Isotretinoin ökar risken för att du ska utveckla ärr från dessa behandlingar. Fråga din läkare när du säkert kan genomgå dessa behandlingar.
- prata med din läkare innan du deltar i hård fysisk aktivitet som sport. Isotretinoin kan göra att benen försvagas eller förtjockas onormalt och kan öka risken för vissa benskador hos personer som utför vissa typer av fysisk aktivitet. Om du bryter ett ben under din behandling, se till att berätta för alla dina vårdgivare att du tar isotretinoin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Isotretinoin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- röda, spruckna och ömma läppar
- torr hud, ögon, mun eller näsa
- näsblod
- förändringar i hudfärg
- peeling hud på handflatorna och fotsulorna
- förändringar i naglarna
- bromsad läkning av skärsår eller sår

- blödande eller svullet tandkött
- håravfall eller oönskad hårväxt
- svettas
- spolning
- röstförändringar
- trötthet
- förkylningssymptom

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom eller de som anges i avsnitten VIKTIG VARNING eller SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, sluta ta isotretinoin och ring din läkare eller få akut medicinsk behandling omedelbart:

- huvudvärk
- suddig syn
- yrsel
- illamående
- kräkningar
- anfall
- långsamt eller svårt tal
- svaghet eller domningar i en del eller sida av kroppen
- magont
- bröstsmärta
- svårigheter att svälja eller smärta vid sväljning
- ny eller förvärrad halsbränna
- diarre
- rektal blödning
- gulfärgning av huden eller ögonen
- mörkfärgad urin
- rygg-, skelett-, led- eller muskelvärk
- muskelsvaghet
- svårt att höra
- ringer i öronen
- synproblem
- smärtsam eller konstant torrhet i ögonen

- ovanlig törst
- regelbunden urination
- problem att andas
- svimning
- snabba eller bultande hjärtslag
- röda, svullna, kliande eller tårade ögon
- feber
- utslag
- hud som skalar eller får blåsor, särskilt på ben, armar eller ansikte
- sår i mun, hals, näsa eller ögon
- röda fläckar eller blåmärken på benen
- svullnad av ögon, ansikte, läppar, tunga, svalg, armar, händer, fötter, vrister eller underben
- svårigheter att svälja eller smärta vid sväljning

Isotretinoin kan få benen att sluta växa för tidigt hos tonåringar. Tala med ditt barns läkare om riskerna med att ge detta läkemedel till ditt barn.

Isotretinoin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332-1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i

ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

- kräkningar
- spolning
- kraftigt spruckna läppar
- magont
- huvudvärk
- yrsel
- förlust av koordination

Den som tagit en överdos av isotretinoin bör känna till risken för fosterskador orsakade av isotretinoin och bör inte donera blod under 1 månad efter överdoseringen. Gravida kvinnor bör prata med sina läkare om riskerna med att fortsätta graviditeten efter överdosen. Kvinnor som kan bli gravida bör använda två former av preventivmedel i 1 månad efter överdosen. Män vars partner är eller kan bli gravida bör använda kondom eller undvika sexuell kontakt med den partnern i 1 månad efter överdoseringen eftersom isotretinoin kan finnas i sperman.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att kontrollera ditt svar på isotretinoin.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Absorica®
- Accutane®¶
- Amnesteem®
- Claravis®

- Myorisan®
- Sotret®¶
- Zenatane®

¶-Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.

Senast reviderad - 2018-08-15

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022