

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609029.html>

## הזרקת לקוסמיד (la koe' sa mide) מבוסא כ-

### היי האם נרשמה תרופה זו?

הזרקת Lacosamide משמשת לשליטה בהתקפים חלקיים (התקפים המערבים רק חלק אחד של המוח) אצל מבוגרים וילדים מגיל חודש ומעלה שאינם יכולים לקחת תרופות דרך הפה. הזרקת Lacosamide משמשת גם בשילוב עם תרופות אחרות כדי לשלוט בהתקפים טוניים-קלוניים כלליים ראשוניים (שנודעו בעבר כהתקף גראנד מאל; התקף המערב את כל הגוף) במבוגרים וילדים מגיל 4 ומעלה שאינם יכולים לקחת תרופות דרך הפה. הזרקת לקוסמיד היא בקבוצה של תרופות הנקראות נוגדי פרכוסים. זה פועל על ידי הפחתת פעילות חשמלית חריגה במוח.

### כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

הזרקת לקוסמיד מגיעה כתמיסה (נוזל) למתן תוך ורידי (לווריד). זה מוזרק בדרך כלל לאט על פני תקופה של 30 עד 60 דקות לילדים ומבוגרים, או מעל 15 דקות למבוגרים במידת הצורך. זה ניתן בדרך כלל פעמיים ביום לילדים או למבוגרים או 3 פעמים ביום לילדים השוקלים 6 ק"ג (13 פאונד) או פחות כל עוד אינך מסוגל ליטול טבליות לקוסמיד או תמיסת פה דרך הפה.

אתה יכול לקבל זריקת לקוסמיד בבית חולים או שאתה יכול להשתמש בתרופה בבית. אם תשתמש בהזרקת לקוסמיד בבית, הרופא שלך יראה לך כיצד להחדיר את התרופה. ודא שאתה מבין את ההנחיות האלה, ושאל את ספק שירותי הבריאות שלך אם יש לך שאלות כלשהן. שאל את הרופא שלך מה לעשות אם יש לך בעיות כלשהן בהזרקת לקוסמיד.

הרופא שלך כנראה יתחיל במינון נמוך של לקוסמיד ויגדיל את המינון בהדרגה, לא יותר מפעם בשבוע.

עשוי לעזור לשלוט במצבך אך לא ירפא אותו. ייתכן שיחלפו מספר שבועות או יותר עד שתרגיש את התועלת המלאה של לקוסמיד. המשך להשתמש בלקוסמיד גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק להשתמש בלקוסמיד מבלי לדבר עם הרופא שלך, גם אם אתה חווה תופעות לוואי כגון שינויים חריגים בהתנהגות או במצב הרוח. אם תפסיק לפתע להשתמש בלקוסמיד, ההתקפים שלך עשויים להתרחש לעתים קרובות יותר. הרופא שלך כנראה יקטין את המינון שלך בהדרגה Lacosamide

### השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

## יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

### לפני השימוש בהזרקת לקוסמיד,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי ללקוסמיד, לכל תרופה אחרת או לכל אחד מהמרכיבים בהזרקת לקוסמיד. שאל את הרוקח שלך או עיין במדריך התרופות לקבלת רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר את כל אחד מהדברים הבאים: חוסמי בטא כגון (atenolol) Tenormin, ב (Tenoretic- (Corgard, (nadolol) Lopressor, ToprolXL, (metoprolol) Trandate, (labetalol) ו (-Hemangeol, Inderal- (propranolol; חוסמי תעלות סידן כגון אמלודיפין (Norvasc, ב-Caduet, ב-Lotrel, ב-Exforge, אחרים), (Cardizem, Cartia, Tiazac) diltiazem, (Procordia, (nimodipine) Nymalize, (nisoldipine) felodipine, isradipine, nicardipine, nifedipine) (סולאר), ו-ורפמיל (קלאן, ורלאן, בטארקה); ותרופות לדופק לא סדיר כמו אמיודרון (נקסטרון, פאסרון), דיגוקסין (לנוקסין), דרונדרון (מולטאק), פלקאיניד (טמבוקור), פרופאנון (ריתמול), quinidine (בנואדקסטה), וסוטלול (Betapace, Sorine, Sotylize). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי. תרופות רבות אחרות עשויות גם הן לקיים אינטראקציה עם לקוסמיד, לכן הקפידו לספר לרופא על כל התרופות שאתם נוטלים, גם אלו שאינן מופיעות ברשימה זו.
- ספר לרופא שלך אם אתה כרגע או שתית כמויות גדולות של אלכוהול, השתמשת בסמי רחוב או בשימוש יתר בתרופות מרשם. ספר גם לרופא שלך אם יש לך או סבלת אי פעם בדיכאון, בעיות במצב רוח, מחשבות או התנהגות אובדנית; דופק לא סדיר; התקף לב; אי ספיקת לב, או בעיות לב אחרות; נוירופתיה סוכרתית (נזק עצבי שנגרם על ידי סוכרת); או מחלת כבד או כליות.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם אתה נכנס להריון בזמן השימוש בהזרקת לקוסמיד, התקשר לרופא שלך.
- עליך לדעת שהזרקת לקוסמיד עלולה לגרום לך לסחרחורת או ישנונית ועלולה לגרום לראייה מטושטשת או לבעיות בקואורדינציה ושינוי משקל. אין לנהוג במכונית, להפעיל מכונות או להשתתף בפעילויות הדורשות ערנות או תיאום עד שתדע כיצד התרופה משפיעה עליך.
- אתה צריך לדעת שהבריאות הנפשית שלך עשויה להשתנות בדרכים בלתי צפויות ואתה עלול להפוך לאובדני (מחשבה על פגיעה או התאבדות או תכנון או ניסיון לעשות זאת) בזמן שאתה משתמש בהזרקת לקוסמיד. מספר קטן של מבוגרים וילדים מגיל 5 ומעלה (כ-1 מתוך 500 אנשים) שנטלו נוגדי פרוכוסים כמו זריקת לקוסמיד לטיפול במצבים שונים במהלך מחקרים קליניים הפכו להתאבדות במהלך הטיפול. חלק מהאנשים הללו פיתחו מחשבות והתנהגות אובדניות כבר שבוע לאחר שהחלו ליטול את התרופה. קיים סיכון שאתה עלול לחוות שינויים בבריאות הנפשית שלך אם אתה נוטל תרופה נוגדת פרוכוסים כגון זריקת לקוסמיד, אך ייתכן גם סיכון שתחווה שינויים בבריאות הנפשית שלך אם מצבך לא יטופל. אתה והרופא שלך תחליטו אם הסיכונים בנטילת תרופה נוגדת פרוכוסים גדולים יותר מהסיכונים של אי נטילת התרופה. אתה, משפחתך או המטפל שלך צריכים להתקשר לרופא שלך מיד אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים: התקפי פאניקה; תסיסה או אי שקט; עצבנות חדשה או מחמירה, חרדה או דיכאון; פועל לפי דחפים מסוכנים; קושי להירדם או להישאר ישן; התנהגות תוקפנית, כועסת או אלימה; מאניה (מצב רוח מטורף, נרגש באופן חריג); דיבור או חשיבה על רצון לפגוע בעצמך או לסיים את חייך; או כל שינוי חריג אחר בהתנהגות או במצב הרוח. ודא שהמשפחה או המטפל שלך יודעים אילו תסמינים עלולים להיות חמורים, כך שהם יכולים להתקשר לרופא אם אינך יכול לפנות לטיפול בעצמך.
- עליך לדעת שהזרקת לקוסמיד עלולה לגרום לסחרחורת, סחרחורת, התעלפות או דופק לא סדיר, במיוחד כאשר אתה קם מהר מדי משכיבה. אם אתה מפתח תסמינים אלה, שכב עם רגליים מורמות עד שתרגיש טוב יותר, והתקשר לרופא שלך מיד.

## האם עלי לפעול לפי הוראות תזונתיות מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

## כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

השתמש במנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין להשתמש במנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

## התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

**הזרקת לקוסמיד עלולה לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:**

- בחילה
- הקאה
- שלשול
- פה יבש
- חוסר תחושה או עקצוץ בפה
- ראייה מטושטשת או כפולה
- תנועות עיניים בלתי נשלטות
- סחרחורת
- כאב ראש
- נומה
- רעד בלתי נשלט של חלק מהגוף
- בעיות בקואורדינציה, שיווי משקל או הליכה
- חולשה
- עקצוץ
- אדמומיות, גירוי, כאב או אי נוחות במקום ההזרקה

**תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הללו, או אלה המפורטים בסעיף אמצעי זהירות מיוחדים, התקשר לרופא שלך מיד:**

- דופק או דופק מהיר או דופק
- קוצר נשימה
- דופק איטי
- כאב בחזה
- התעלפות
- נפיחות של הפנים, הגרון, הלשון, השפתיים והעיניים

- חום
- פריחה
- עייפות
- הצהבה של העור או העיניים
- שתן כהה

הזרקת לקוסמיד עלולה לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן השימוש בתרופה זו.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון 1-800-332-1088).

## צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

הרופא שלך יגיד לך איך לאחסן את התרופה שלך. אחסן את התרופה רק לפי ההוראות. ודא שאתה מבין כיצד לאחסן את התרופה שלך כראוי.

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>]) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

## במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisohelp.org/help>] <https://www.poisohelp.org/help>]. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

## צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך.

אל תיתן לאף אחד אחר להשתמש בתרופות שלך. הזרקת לקוסמיד היא חומר מבוקר. ניתן למלא מרשמים רק מספר מצומצם של פעמים; שאל את הרוקח אם יש לך שאלות.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

## שמות רנד

IV®Vimpat •

עדכון אחרון - 15/12/2021

[למד כיצד לצטט דף זה](#)[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022