

[家 → 薬、ハーブ、サプリメント](#) → ラコサミド注射

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609029.html>

## ラコサミド注射

(la koe'sa mide) と発音します

### なぜこの薬が処方されているのですか？

ラコサミド注射は、経口薬を服用できない1か月以上の成人および小児の部分てんかん発作（脳の一部のみが関与する発作）を制御するために使用されます。ラコサミド注射は、他の薬剤と組み合わせて使用され、経口薬を服用できない4歳以上の成人および小児における一次性全身性強直間代発作（以前は大発作として知られていました。全身を伴う発作）を制御します。ラコサミド注射は、抗けいれん薬と呼ばれる薬のクラスにあります。それは脳の異常な電気的活動を減らすことによって機能します。

### わあ、この薬を使うべきですか？

ラコサミド注射は、静脈内（静脈内）に投与される溶液（液体）として提供されます。通常、子供と大人の場合は30～60分、必要に応じて大人の場合は15分以上かけてゆっくりと注射します。ラコサミド錠や経口液剤を口から摂取できない場合は、通常、子供または大人に1日2回、体重が6 kg（13ポンド）以下の子供に1日3回投与されます。

あなたは病院でラコサミド注射を受けるかもしれませんが、あるいはあなたは家で薬を使うかもしれません。自宅でラコサミド注射を使用する場合は、医療提供者が薬の注入方法を説明します。これらの指示を必ず理解し、質問がある場合は医療提供者に尋ねてください。ラコサミド注射の注入に問題がある場合は、医療提供者に何をすべきか尋ねてください。

あなたの医者はおそらくあなたを低用量のラコサミドで始めて、あなたの用量を徐々に増やします、週に一度より頻繁ではありません。

ラコサミドはあなたの状態をコントロールするのを助けるかもしれませんが、それを治すことはありません。ラコサミドの効果を十分に実感できるようになるまでには、数週間以上かかる場合があります。気分が良くてもラコサミドを使い続けてください。行動や気分の異常な変化などの副作用が発生した場合でも、医師に相談せずにラコサミドの使用を中止しないでください。ラコサミドの使用を突然やめると、発作がより頻繁に起こる可能性があります。あなたの医者はおそらくあなたの用量を徐々に減らします。

### この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

## 特別な注意事項に従う必要がありますか？

### ラコサミド注射を使用する前に、

- ラコサミド、他の薬、またはラコサミド注射の成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては、薬剤師に尋ねるか、投薬ガイドを確認してください。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください：アテノロール（Tenormin、テノレティック）、ラベタロール（Trandate）、メトプロロール（Lopressor、Toprol XL）、ナドロール（Corgard）、およびプロプラノロール（Hemangeol、Inderal）などのベータブロッカー。アムロジピン（Norvasc、Caduet、Lotrel、Exforgeなど）、ジルチアゼム（Cardizem、Cartia、Tiazacなど）、フェロジピン、イスラジピン、ニカルジピン、ニフェジピン（Procardia）、ニモジピン（Nymalize）、ニソルジピン（Sular）、およびベラパミル（Calan、Verelan、Tarka）；アミオダロン（Nexterone、Pacerone）、ジゴキシン（Lanoxin）、ドロネダロン（Multaq）、フレカイニド（Tambocor）、プロパフェノン（Rythmol）などの不規則な心拍の薬 キニジン（Nuedexta）、およびソタロール（Betapace、Sorine、Sotylize）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。他の多くの薬もラコサミドと相互作用する可能性があるため、このリストに記載されていない薬も含め、服用しているすべての薬について医師に必ず伝えてください。
- あなたが現在またはこれまでに大量のアルコールを飲んだか、ストリートドラッグを使用したか、または処方薬を過剰に使用したことがあるかどうかを医師に伝えてください。また、うつ病、気分の問題、自殺念慮、または行動を起こしたことがあるか、または経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。不整脈；心臓発作；心不全、または他の心臓の問題；糖尿病性ニューロパチー（糖尿病によって引き起こされる神経損傷）；または肝臓や腎臓の病気。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。ラコサミド注射を使用しているときに妊娠した場合は、医師に連絡してください。
- ラコサミド注射は、めまいや眠気を引き起こし、かすみ目や協調性とバランスの問題を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにどのように影響するかを理解するまでは、車を運転したり、機械を操作したり、注意力や調整を必要とする活動に参加したりしないでください。
- ラコサミド注射を使用していると、メンタルヘルスが予期せぬ形で変化し、自殺する可能性があることを知っておく必要があります（自分を傷つけたり殺したりすることを考えたり、計画したりしようとしたりすることを考えてください）。臨床試験中にさまざまな状態を治療するためにラコサミド注射などの抗けいれん薬を服用した5歳以上の少数の成人および子供（約500人に1人）は、治療中に自殺しました。これらの人々の何人かは、薬を服用し始めてから早くも1週間で自殺念慮と行動を起こしました。ラコサミド注射などの抗けいれん薬を服用するとメンタルヘルスが変化するリスクがありますが、治療を行わないとメンタルヘルスが変化するリスクもあります。あなたとあなたの医師は、抗けいれん薬を服用するリスクが薬を服用しないリスクよりも大きいかどうかを判断します。次の症状のいずれかが発生した場合は、あなた、あなたの家族、またはあなたの介護者はすぐに医師に連絡する必要があります。興奮または落ち着きのなさ；新規または悪化する過敏性、不安、またはうつ病；危険な衝動に作用する；眠りにつくまたは眠り続けるのが難しい；攻撃的、怒り、または暴力的な行動。マニア（熱狂的、異常に興奮した気分）；自分を傷つけたり、人生を終わらせたいと話したり考えたりする。または行動や気分のその他の異常な変化。自分で治療を求めることができない場合に医師に連絡できるように、家族や介護者がどの症状が深刻であるかを知っていることを確認してください。
- ラコサミド注射は、特に横臥位からの立ち上がりが速すぎる場合に、めまい、立ちくらみ、失神、または不整脈を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。これらの症状が出た場合は、気分が良くなるまで足を上げて横になり、すぐに医師に連絡してください。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

## 服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は覚えてからすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。逃したものを補うために2回分を使用しないでください。

## この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ラコサミド注射は副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 吐き気
- 嘔吐
- 下痢
- 口渇
- 口の中のしびれやうずき
- ぼやけたまたは複視
- 制御できない眼球運動
- めまい
- 頭痛
- 眠気
- 体の一部の制御不能な揺れ
- 協調、バランス、または歩行に関する問題
- 弱点
- かゆみ
- 注射部位の発赤、刺激、痛み、または不快感

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれか、または特別な注意事項のセクションに記載されている症状が発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 速いまたはドキドキする心拍または脈拍
- 呼吸困難
- 遅い心拍
- 胸痛
- 失神
- 顔、喉、舌、唇、目の腫れ

- 熱
- 発疹
- 疲れ
- 皮膚や目の黄変
- 暗色尿

ラコサミド注射は他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の使用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

## この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

あなたの医療提供者はあなたの薬を保管する方法を教えてください。指示通りにのみ薬を保管してください。薬を適切に保管する方法を理解していることを確認してください。

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

## 他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とのすべての約束を守ってください。

他の人にあなたの薬を使わせないでください。ラコサミド注射は規制物質です。処方箋は限られた回数だけ補充することができます。ご不明な点がございましたら、薬剤師にご相談ください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- ヴィンパット®IV

最終改訂日-2021年12月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製  
商用利用はASHPの承認が必要です。

---

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日