

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Injecție de lacosamid

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609029.html>

Lacosamid injectabil

pronunțat ca (la koe' sa mide)

de ce este prescris acest medicament?

Lacosamidă injectabilă este utilizată pentru a controla crizele cu debut parțial (crizele care implică doar o parte a creierului) la adulți și copiii cu vârsta de 1 lună și peste care nu pot lua medicamente orale. Injecția de lacosamidă este, de asemenea, utilizată în combinație cu alte medicamente pentru a controla crizele tonico-clonice primare generalizate (cunoscute anterior ca criză grand mal; convulsii care implică întregul corp) la adulții și copiii de 4 ani și peste care nu pot lua medicamente orale. Injecția cu lacosamidă face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticonvulsivante. Funcționează prin scăderea activității electrice anormale din creier.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de lacosamidă vine sub formă de soluție (lichid) care se administrează intravenos (în venă). De obicei, se injectează lent pe o perioadă de 30 până la 60 de minute la copii și adulți sau peste 15 minute la adulți, dacă este necesar. De obicei, se administrează de două ori pe zi la copii sau adulți sau de 3 ori pe zi pentru copiii cu o greutate de 6 kg (13 lire) sau mai puțin, atâta timp cât nu puteți lua lacosamidă comprimate sau soluție orală pe cale orală.

Puteți primi injecție cu lacosamidă într-un spital sau puteți utiliza medicamentul acasă. Dacă veți folosi injecția de lacosamidă acasă, medicul dumneavoastră vă va arăta cum să infuzați medicamentul. Asigurați-vă că înțelegeți aceste instrucțiuni și adresați-vă furnizorului de servicii medicale dacă aveți întrebări. Întrebați medicul dumneavoastră ce să faceți dacă aveți probleme la perfuzarea injecției cu lacosamidă.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil cu o doză mică de lacosamid și vă va crește treptat doza, nu mai des de o dată pe săptămână.

Lacosamida vă poate ajuta să vă controlați starea, dar nu o va vindeca. Poate dura câteva săptămâni sau mai mult înainte de a simți beneficiul complet al lacosamidei. Continuați să utilizați lacosamidă chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să utilizați lacosamidă fără a discuta cu medicul dumneavoastră, chiar dacă aveți reacții adverse, cum ar fi modificări neobișnuite de comportament sau de dispoziție. Dacă încetați brusc să utilizați lacosamidă, convulsiile pot apărea mai des. Medicul dumneavoastră vă va reduce probabil doza treptat.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza injecția cu lacosamidă,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la lacosamidă, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele din injecția cu lacosamidă. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: beta-blocante, cum ar fi atenolol (Tenormin, în Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) și propranolol (Hemangeol, Inderal); blocante ale canalelor de calciu precum amlodipina (Norvasc, în Caduet, în Lotrel, în Exforge, altele), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, altele), felodipină, isradipină, nicardipină, nifedipină (Procardia), nimodipină (Nymalize), nisoldipină (Sular) și verapamil (Calan, Verelan, în Tarka); și medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi amiodarona (Nexterone, Pacerone), digoxină (Lanoxin), dronedarona (Multaq), flecainidă (Tambocor), propafenona (Rythmol), chinidină (în Nuedexta) și sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu lacosamida, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă în prezent sau ați băut vreodată cantități mari de alcool, ați consumat droguri stradale sau ați suprautilizat medicamente pe bază de rețetă. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată depresie, probleme de dispoziție, gânduri sau comportament suicidar; bătăi neregulate ale inimii; un atac de cord; insuficiență cardiacă sau alte probleme cardiace; neuropatie diabetică (leziuni ale nervilor cauzate de diabet); sau boli hepatice sau renale.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce utilizați injecție cu lacosamidă, sunați la medicul dumneavoastră.
- trebuie să știți că injecția cu lacosamidă vă poate provoca amețeli sau somnolență și poate provoca vedere încețoșată sau probleme de coordonare și echilibru. Nu conduceți o mașină, nu utilizați utilaje și nu participați la activități care necesită vigilență sau coordonare până când nu știți cum vă afectează acest medicament.
- trebuie să știți că sănătatea dumneavoastră mintală se poate schimba în moduri neașteptate și puteți deveni sinucigași (gândindu-vă să vă faceți rău sau să vă sinucideți sau să plănuiți sau să încercați să faceți acest lucru) în timp ce utilizați injecție cu lacosamidă. Un număr mic de adulți și copii cu vârsta de 5 ani și peste (aproximativ 1 din 500 de persoane) care au luat anticonvulsivante cum ar fi lacosamidă injectabilă pentru a trata diferite afecțiuni în timpul studiilor clinice s-au suicidat în timpul tratamentului. Unii dintre acești oameni au dezvoltat gânduri și comportamente suicidare încă de la o săptămână după ce au început să ia medicamentul. Există riscul ca să aveți modificări ale sănătății mintale dacă luați un medicament anticonvulsivant, cum ar fi injecția cu lacosamidă, dar poate exista și riscul să aveți modificări în sănătatea dumneavoastră mintală dacă starea dumneavoastră nu este tratată. Tu și medicul dumneavoastră veți decide dacă riscurile de a lua un medicament anticonvulsivant sunt mai mari decât riscurile de a nu lua medicamentul. Dumneavoastră, familia dumneavoastră sau îngrijitorul dumneavoastră ar trebui să vă sunați imediat medicul dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: atacuri de panică; agitație sau neliniște; iritabilitate, anxietate sau depresie noi sau agravate; acționează pe impulsuri periculoase; dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit; comportament agresiv, furios sau violent; manie (dispoziție frenetică, anormal de excitată); vorbesc sau te gândești să vrei să te rănești sau să-ți închei viața; sau orice alte modificări neobișnuite de comportament sau de dispoziție. Asigurați-vă că familia sau îngrijitorul dumneavoastră știe ce simptome pot fi grave, astfel încât să poată suna medicul dacă nu puteți căuta singur tratament.
- trebuie să știți că injecția de lacosamidă poate provoca amețeli, amețeli, leșin sau bătăi neregulate ale inimii, mai ales când vă ridicați prea repede din poziție culcat. Dacă dezvoltați aceste simptome, întindeți-vă cu picioarele ridicate până când vă simțiți mai bine și sunați imediat medicul.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Utilizați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu lacosamid poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispere:

- greață
- vărsături
- diaree
- gură uscată
- amorțeală sau furnicături în gură
- vedere încețoșată sau dublă
- mișcări necontrolabile ale ochilor
- amețelă
- durere de cap
- somnolență
- tremurarea necontrolată a unei părți a corpului
- probleme cu coordonarea, echilibrul sau mersul pe jos
- slăbiciune
- mâncărime
- roșeață, iritație, durere sau disconfort la locul injectării

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în secțiunea PRECAUȚII SPECIALE, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

- bătăi sau puls ale inimii rapide sau puternice
- dificultăți de respirație
- bătăi lente ale inimii
- dureri în piept
- leșin
- umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor și ochilor

- febră
- eczemă
- oboseală
- îngălbenirea pielii sau a ochilor
- urină închisă la culoare

Injecția cu lacosamidă poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va spune cum să vă păstrați medicamentele. Păstrați medicamentele numai conform instrucțiunilor. Asigurați-vă că înțelegeți cum să vă păstrați medicamentul în mod corespunzător.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informații ar trebui să știu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Lacosamidă injectabilă este o substanță controlată. Rețetele pot fi reumplute doar de un număr limitat de ori; întrebați-vă farmacistul dacă aveți întrebări.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Vimpat®IV

Ultima revizuire - 15.12.2021

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022