



[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Lakosamidinjektion

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609029.html>

Lacosamid Injection

uttalas som (la koe' sa mide)

hur är denna medicin utskriven?

Lacosamidinjektion används för att kontrollera partiella anfall (anfall som endast involverar en del av hjärnan) hos vuxna och barn 1 månad och äldre som inte kan ta orala mediciner. Lakosamidinjektion används också i kombination med andra mediciner för att kontrollera primära generaliserade tonisk-kloniska anfall (tidigare känt som ett grand mal-anfall; anfall som involverar hela kroppen) hos vuxna och barn från 4 år och äldre som inte kan ta orala mediciner. Lakosamidinjektion är i en klass av läkemedel som kallas antikonvulsiva medel. Det fungerar genom att minska onormal elektrisk aktivitet i hjärnan.

hur ska detta läkemedel användas?

Lacosamidinjektion kommer som en lösning (vätska) som ska ges intravenöst (i en ven). Det injiceras vanligtvis långsamt under en period av 30 till 60 minuter hos barn och vuxna, eller över 15 minuter hos vuxna om det behövs. Det ges vanligtvis två gånger om dagen till barn eller vuxna eller 3 gånger dagligen till barn som väger 6 kg (13 pund) eller mindre så länge du inte kan ta lakosamidtabletter eller oral lösning genom munnen.

Du kan få lakosamidinjektion på ett sjukhus eller så kan du använda medicinen hemma. Om du kommer att använda lakosamidinjektion hemma, kommer din vårdgivare att visa dig hur du infunderar medicinen. Se till att du förstår dessa anvisningar och fråga din vårdgivare om du har några frågor. Fråga din vårdgivare vad du ska göra om du har problem med att infundera lakosamidinjektion.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos lakosamid och gradvis öka din dos, inte oftare än en gång i veckan.

Lacosamid kan hjälpa till att kontrollera ditt tillstånd men kommer inte att bota det. Det kan ta några veckor eller längre innan du känner full nytta av lakosamid. Fortsätt att använda lakosamid även om du mår bra. Sluta inte använda lakosamid utan att prata med din läkare, även om du upplever biverkningar som ovanliga förändringar i beteende eller humör. Om du plötsligt slutar använda lakosamid kan dina anfall inträffa oftare. Din läkare kommer förmodligen att minska din dos gradvis.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordinerats för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder lakosamidinjektion,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot lakosamid, andra läkemedel eller något av ingredienserna i lakosamidinjektion. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: betablockerare som atenolol (Tenormin, i Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) och propranolol (Hemangeol, Inderal); kalciumkanalblockerare såsom amlodipin (Norvasc, i Caduet, i Lotrel, i Exforge, andra), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, andra), felodipin, isradipin, nikardipin, nifedipin (Procardia), nimodipin (Nymalize), nisoldipin (Sular) och verapamil (Calan, Verelan, i Tarka); och mediciner för oregelbunden hjärtrytm som amiodaron (Nexterone, Pacerone), digoxin (Lanoxin), dronedaron (Multaq), flekainid (Tambocor), propafenon (Rythmol), kinidin (i Nuedexta) och sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med lakosamid, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.
- berätta för din läkare om du för närvarande eller någonsin har druckit stora mängder alkohol, använt gatudroger eller överanvänt receptbelagda läkemedel. Tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft depression, humörproblem, självmordstankar eller självmordsbeteende; oregelbunden hjärtslag; en hjärtattack; hjärtsvikt eller andra hjärtproblem; diabetisk neuropati (nervskada orsakad av diabetes); eller lever- eller njursjukdom.
- berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du använder lakosamidinjektion, kontakta din läkare.
- du bör veta att lakosamidinjektion kan göra dig yr eller dåsig och kan orsaka dimsyn eller problem med koordination och balans. Kör inte bil, använd inte maskiner eller delta i aktiviteter som kräver vakenhet eller koordination förrän du vet hur denna medicin påverkar dig.
- du bör veta att din mentala hälsa kan förändras på oväntade sätt och du kan bli självmordsbenägen (tänker på att skada eller ta livet av dig eller planerar eller försöker göra det) medan du använder lakosamidinjektion. Ett litet antal vuxna och barn 5 år och äldre (cirka 1 av 500 personer) som tog antikonvulsiva medel som lakosamidinjektion för att behandla olika tillstånd under kliniska studier blev suicidala under sin behandling. Vissa av dessa personer utvecklade självmordstankar och självmordsbeteende redan 1 vecka efter att de började ta medicinen. Det finns en risk att du kan uppleva förändringar i din psykiska hälsa om du tar ett antikonvulsivt läkemedel som lakosamidinjektion, men det kan också finnas risk att du upplever förändringar i din psykiska hälsa om ditt tillstånd inte behandlas. Du och din läkare kommer att avgöra om riskerna med att ta ett antikonvulsivt läkemedel är större än riskerna med att inte ta medicinen. Du, din familj eller din vårdgivare bör ringa din läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom: panikattacker; agitation eller rastlöshet; ny eller förvärrad irritabilitet, ångest eller depression; agerar på farliga impulser; svårt att somna eller att sova; aggressivt, argt eller våldsamt beteende; mani (frenziert, onormalt upphetsat humör); pratar eller funderar på att vilja skada dig själv eller avsluta ditt liv; eller andra ovanliga förändringar i beteende eller humör. Se till att din familj eller vårdgivare vet vilka symtom som kan vara allvarliga så att de kan ringa läkare om du inte kan söka behandling på egen hand.
- du bör veta att lakosamidinjektion kan orsaka yrsel, yrsel, svimning eller oregelbunden hjärtrytm, särskilt när du reser dig upp för snabbt från liggande ställning. Om du utvecklar dessa symtom, lägg dig ner med benen upphöjda tills du mår bättre och ring din läkare omedelbart.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Använd inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Lacosamidinjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- illamående
- kräkningar
- diarre
- torr mun
- domningar eller stickningar i munnen
- suddig eller dubbelseende
- okontrollerbara ögonrörelser
- yrsel
- huvudvärk
- dåsighet
- okontrollerbar skakning av en del av kroppen
- problem med koordination, balans eller gång
- svaghet
- klåda
- rodnad, irritation, smärta eller obehag vid injektionsstället

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, eller de som anges i avsnittet SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare omedelbart:

- snabba eller bultande hjärtslag eller puls
- andnöd
- långsam hjärtslag
- bröstsmärta
- svimning
- svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar och ögon

- feber
- utslag
- trötthet
- gulfärgning av huden eller ögonen
- mörk urin

Lacosamidinjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du använder denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Din vårdgivare kommer att tala om för dig hur du ska förvara din medicin. Förvara din medicin endast enligt anvisningarna. Se till att du förstår hur du förvarar din medicin på rätt sätt.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan använda din medicin. Lacosamidinjektion är en kontrollerad substans. Recept får endast fyllas på ett begränsat antal gånger; fråga din apotekspersonal om du har några frågor.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Vimpat®IV

Senast reviderad - 2021-12-15

Lär dig hur du citerar den här sidan



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022