

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609029.html>

حقن لاكوساميد تنطق (la koe 'sa mide)

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم حقن لاكوساميد للسيطرة على نوبات الصرع الجزئية (النوبات التي تشمل جزءاً واحداً فقط من الدماغ) عند البالغين والأطفال الذين يبلغون من العمر شهراً واحداً أو أكبر والذين لا يستطيعون تناول الأدوية عن طريق الفم. يستخدم حقن لاكوساميد أيضاً مع أدوية أخرى للسيطرة على نوبات الصرع الارتجاجية الأولية المعممة (المعروفة سابقاً باسم نوبة الصرع الكبرى ؛ نوبة الصرع التي تشمل الجسم بالكامل) عند البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات فما فوق والذين لا يستطيعون تناول الأدوية عن طريق الفم. يقع حقن لاكوساميد في فئة من الأدوية تسمى مضادات الاختلاج. يعمل عن طريق تقليل النشاط الكهربائي غير الطبيعي في الدماغ.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي حقن لاكوساميد كمحلول (سائل) يعطى عن طريق الوريد (في الوريد). عادة ما يتم حقنها ببطء على مدى 30 إلى 60 دقيقة في الأطفال والبالغين ، أو أكثر من 15 دقيقة للبالغين إذا لزم الأمر. يُعطى عادةً مرتين يومياً للأطفال أو البالغين أو 3 مرات يومياً للأطفال الذين يزنون 6 كجم (13 رطلاً) أو أقل طالما أنك غير قادر على تناول أقراص لاكوساميد أو محلول فموي عن طريق الفم.

قد تتلقى حقن لاكوساميد في المستشفى أو يمكنك استخدام الدواء في المنزل. إذا كنت ستستخدم حقن اللاكوساميد في المنزل ، فسوف يوضح لك مقدم الرعاية الصحية كيفية حقن الدواء. تأكد من فهمك لهذه التوجيهات ، واسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي أسئلة. اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما يجب أن تفعله إذا كنت تعاني من أي مشاكل في حقن اللاكوساميد.

من المحتمل أن يبدأ طبيبك بجرعة منخفضة من لاكوساميد ويزيد جرعتك تدريجياً ، ليس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

قد يساعد لاكوساميد في التحكم في حالتك ولكنه لن يعالجها. قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع أو أكثر قبل أن تشعر بالفائدة الكاملة من لاكوساميد. استمر في استخدام لاكوساميدي حتى إذا كنت تشعر جيداً. لا تتوقف عن استخدام لاكوساميد دون التحدث مع طبيبك ، حتى إذا كنت تعاني من آثار جانبية مثل التغيرات غير العادية في السلوك أو الحالة المزاجية. إذا توقفت فجأة عن استخدام اللاكوساميد ، فقد تحدث نوباتك كثيراً. من المحتمل أن طبيبك تقلل الجرعة تدريجياً.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل استخدام حقن لأكوساميد ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من لأكوساميد ، أو أي أدوية أخرى ، أو أي من مكونات حقن لأكوساميد. اسأل الصيدلي أو تحقق من دليل الأدوية للحصول على قائمة بالمكونات.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: حاصرات بيتا مثل أتينولول (تينورمين ، في تينورتيك) ، لايتالول (تراندات) ، ميتوبرولول (لوبريسور ، توبرول إكس إل) ، نادولول (كوجارد) ، وبروبرانولول (هيماجلول ، إندرال) ؛ حاصرات قنوات الكالسيوم مثل أملوديبين (نورفاسك ، في كادويت ، في لوتريل ، في إكسفورج ، وغيرها) ، ديلتيازيم (كارديزيم ، كارتيا ، تيازاك ، وغيرها) ، فيلوديبين ، إيزراديبين ، نيكارديبين ، نيفيديبين (بروكارديا) ، نيموديبين (نيماليز) (نيسولديبين (Sular) ، وفيراباميل (كالان ، فيريلان ، في تاركا) ؛ وأدوية عدم انتظام ضربات القلب مثل أميودارون (نيكسترون ، باسيرون) ، ديجوكسين (لانوكسين) ، درونيدارون (ملتق) ، فليكاينيد (تامبوكور) ، بروفاينون (ريثمول) ، كينيدين (في Nuedexta) ، وسوتالول (Sotylize ، Sorine ، Betapace). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية. قد تتفاعل العديد من الأدوية الأخرى أيضاً مع الأكوساميد ، لذا تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها ، حتى تلك التي لا تظهر في هذه القائمة.
- أخبر طبيبك إذا كنت قد شربت حالياً أو سبق لك تناول كميات كبيرة من الكحول ، أو تعاطي المخدرات في الشوارع ، أو الإفراط في استخدام الأدوية الموصوفة. أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت تعاني أو سبق أن عانيت من اكتئاب أو مشاكل مزاجية أو أفكار أو سلوك انتحاري ؛ عدم انتظام ضربات القلب. نوبة قلبية قصور القلب أو مشاكل القلب الأخرى. اعتلال الأعصاب السكري (تلف الأعصاب الناجم عن مرض السكري) ؛ أو أمراض الكبد أو الكلى.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا أصبحت حاملاً أثناء استخدام حقن لأكوساميد ، فاتصل بطبيبك.
- يجب أن تعلم أن حقن لأكوساميد قد يجعلك تشعر بالدوار أو النعاس وقد يسبب عدم وضوح الرؤية أو مشاكل في التنسيق والتوازن. لا تقود السيارة أو تشغل الآلات أو تشارك في الأنشطة التي تتطلب اليقظة أو التنسيق حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء عليك.
- يجب أن تعلم أن صحتك العقلية قد تتغير بطرق غير متوقعة وقد تصبح انتحارياً (التفكير في إيذاء أو قتل نفسك أو التخطيط أو محاولة القيام بذلك) أثناء استخدامك حقنة لأكوساميد. عدد قليل من البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق (حوالي 1 من كل 500 شخص) الذين تناولوا مضادات الاختلاج مثل حقن لأكوساميد لعلاج حالات مختلفة أثناء الدراسات السريرية أصبحوا انتحاريين أثناء علاجهم. طور بعض هؤلاء الأشخاص أفكاراً وسلوكيات انتحارية في وقت مبكر بعد أسبوع واحد من بدء تناول الدواء. هناك خطر من أنك قد تواجه تغييرات في صحتك العقلية إذا كنت تتناول دواءً مضاداً للاختلاج مثل حقن لأكوساميد ، ولكن قد يكون هناك أيضاً خطر من حدوث تغييرات في صحتك العقلية إذا لم يتم علاج حالتك. ستقرر أنت وطبيبك ما إذا كانت مخاطر تناول الأدوية المضادة للاختلاج أكبر من مخاطر عدم تناول الدواء. يجب عليك أنت أو عائلتك أو مقدم الرعاية الخاص بك الاتصال بطبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية: نوبات الهلع ؛ الإثارة أو الأرق. تهيج أو قلق أو اكتئاب جديد أو متفاقم ؛ العمل على نبضات خطيرة. صعوبة في النوم أو البقاء نائماً ؛ السلوك العدواني أو الغاضب أو العنيف ؛ هوس (مزاج مسعور ، متحمس بشكل غير طبيعي) ؛ التحدث أو التفكير في الرغبة في إيذاء نفسك أو إنهاء حياتك ؛ أو أي تغييرات غير عادية أخرى في السلوك أو الحالة المزاجية. تأكد من أن عائلتك أو مقدم الرعاية يعرف الأعراض التي قد تكون خطيرة حتى يتمكنوا من الاتصال بالطبيب إذا كنت غير قادر على طلب العلاج بمفردك.
- يجب أن تعلم أن حقن لأكوساميد قد يسبب الدوخة أو الدوار أو الإغماء أو عدم انتظام ضربات القلب ، خاصة عندما تستيقظ بسرعة كبيرة من وضعية الكذب. إذا ظهرت لديك هذه الأعراض ، استلق مع رفع رجليك حتى تشعر بالتحسن ، واتصل بطبيبك على الفور.

قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

استخدم الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان الوقت تقريباً للجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب حقن لأكوساميد آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أولاً تختفي:

- غثيان
- التقيؤ
- إسهال
- فم جاف
- خدر أو وخز في الفم
- عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها
- حركات العين التي لا يمكن السيطرة عليها
- دوخة
- صداع الراس
- النعاس
- اهتزاز لا يمكن السيطرة عليه لجزء من الجسم
- مشاكل في التنسيق أو التوازن أو المشي
- ضعف
- متلهف، متشوق
- احمرار أو تهيج أو ألم أو إزعاج في مكان الحقن

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، أو تلك المذكورة في قسم الإجراءات الوقائية الخاصة ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- ضربات القلب أو النبض بسرعة أو خفقان
- ضيق في التنفس
- بطن ضربات القلب
- ألم صدر
- إغماء
- تورم في الوجه والحلق واللسان والشفتين والعينين

- حمى
- متسرع
- تعب
- اصفرار الجلد أو العينين
- البول الداكن

قد يسبب حقن لأكوساميد آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء استخدام هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

سيخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بكيفية تخزين أدويةك. قم بتخزين الأدوية الخاصة بك وفقاً للتوجيهات فقط. تأكد من فهمك لكيفية تخزين الأدوية الخاصة بك بشكل صحيح.

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراحيض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [http://goo.gl/c4Rm4p] [http://goo.gl/c4Rm4p] لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] [https://www.poisonhelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

إبقاء جميع المواعيد مع الطبيب.

لا تدع أي شخص يستخدم الدواء الخاص بك. حقن لأكوساميد مادة خاضعة للرقابة. لا يجوز إعادة تعبئة الوصفات الطبية إلا لعدد محدود من المرات ؛ اسأل الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

• فيمبات® رابعا

آخر مراجعة - 15/12/2021

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS® معلومات الدواء المريض™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة.
الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland.
للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022