

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Lakozamid Enjeksiyonu

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609029.html>

Lakozamid Enjeksiyonu

(la koe' sa mide) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Lakozamid enjeksiyonu, oral ilaç alamayan yetişkinlerde ve 1 aylık ve daha büyük çocuklarda kısmi başlangıçlı nöbetleri (beynin sadece bir bölümünü içeren nöbetler) kontrol etmek için kullanılır.

Lakozamid enjeksiyonu ayrıca yetişkinlerde ve oral ilaç alamayan 4 yaş ve üstü çocuklarda birincil jeneralize tonik-klonik nöbetleri (eski adıyla büyük mal nöbeti; tüm vücudu kapsayan nöbet) kontrol etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Lakozamid enjeksiyonu, antikonvülsanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi azaltarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Lakozamid enjeksiyonu, damardan (damar içine) verilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle çocuklarda ve yetişkinlerde 30 ila 60 dakikalık bir sürede veya gerekirse yetişkinlerde 15 dakikadan fazla bir sürede yavaşça enjekte edilir. Çocuklarda veya yetişkinlerde genellikle günde iki kez veya 6 kg (13 pound) veya daha az olan çocuklar için günde 3 kez, lakozamid tabletleri veya ağızdan oral solüsyon alamadığınız sürece verilir.

Bir hastanede lakozamid enjeksiyonu alabilir veya ilacı evde kullanabilirsiniz. Evde lakozamid enjeksiyonu kullanacaksanız, sağlık uzmanınız ilacı nasıl infüze edeceğinizi size gösterecektir. Bu talimatları anladığınızdan emin olun ve herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun. Lakozamid enjeksiyonunu infüze etmede herhangi bir probleminiz varsa, sağlık uzmanınıza ne yapacağınızı sorun.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda lakozamid ile başlayacak ve haftada bir defadan fazla olmamak üzere dozunuzu kademeli olarak artıracaktır.

Lakozamid, durumunuzu kontrol etmenize yardımcı olabilir, ancak onu iyileştirmez. Lakozamidin tam faydasını hissetmeniz birkaç hafta veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile lakozamid kullanmaya devam edin. Alışılmadık davranış veya ruh hali değişiklikleri gibi yan etkiler yaşarsanız bile, doktorunuzla konuşmadan lakozamid kullanmayı bırakmayın. Lakozamid kullanmayı aniden bırakırsanız, nöbetleriniz daha sık olabilir. Doktorunuz muhtemelen dozunuzu kademeli olarak azaltacaktır.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Lakozamid enjeksiyonunu kullanmadan önce,

- lakozamide, diğer ilaçlara veya lakozamid enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.
- aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: atenolol (Tenormin, Tenoretic'te), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) ve propranolol (Hemangeol, Inderal) gibi beta blokerler; amlodipin (Norvasc, Caduet'te, Lotrel'de, Exforge'da, diğerleri), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, diğerleri), felodipin, isradipin, nikardipin, nifedipin (Procardia), nimodipin (Nymalize), nisoldipin (Sular) ve verapamil (Calan, Verelan, Tarka'da); ve amiodaron (Nexterone, Pacerone), digoksin (Lanoxin), dronedaron (Multaq), flekainid (Tambocor), propafenon (Rythmol) gibi düzensiz kalp atışı için ilaçlar, kinidin (Nuedexta'da) ve sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da lakozamid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.
- Şu anda veya daha önce çok miktarda alkol içtiyseniz, sokak uyuşturucuları kullandıysanız veya aşırı kullanılmış reçeteli ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza söyleyin. Ayrıca, depresyon, duygudurum sorunları, intihar düşünceleri veya davranışlarınız varsa veya daha önce yaşadysanız da doktorunuza söyleyin; düzensiz kalp atışı; kalp krizi; kalp yetmezliği veya diğer kalp problemleri; diyabetik nöropati (diyabetin neden olduğu sinir hasarı); veya karaciğer veya böbrek hastalığı.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Lakozamid enjeksiyonu kullanırken hamile kalırsanız doktorunuza arayın.
- Lakozamid enjeksiyonunun başınızı döndürebileceğini veya uyuşukluğa neden olabileceğini ve bulanık görme veya koordinasyon ve denge sorunlarına neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba sürmeyin, makine kullanmayın veya uyanıklık veya koordinasyon gerektiren faaliyetlere katılmayın.
- Lakozamid enjeksiyonu kullanırken ruh sağlığınızın beklenmedik şekillerde değişebileceğini ve intihara (kendinize zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünme veya bunu yapmayı planlama veya yapmaya çalışma) dönüşebileceğinizi bilmelisiniz. Klinik çalışmalar sırasında çeşitli durumları tedavi etmek için lakozamid enjeksiyonu gibi antikonvülzanlar alan az sayıda yetişkin ve 5 yaş ve üzeri çocuk (yaklaşık 500 kişiden 1'i) tedavileri sırasında intihara meyilli olmuştur. Bu insanlardan bazıları, ilacı almaya başladıktan 1 hafta sonra intihar düşünceleri ve davranışları geliştirdi. Lakozamid enjeksiyonu gibi antikonvülzan bir ilaç alırsanız ruh sağlığınızda değişiklik yaşama riskiniz vardır, ancak durumunuz tedavi edilmezse ruh sağlığınızda değişiklik yaşama riski de olabilir. Bir antikonvülzan ilaç almanın risklerinin, ilacı almamanın risklerinden daha büyük olup olmadığına siz ve doktorunuz karar vereceksiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, siz, aileniz veya bakıcınız hemen doktorunuza aramalısınız: panik atak; ajitasyon veya huzursuzluk; yeni veya kötüleşen sinirlilik, kaygı veya depresyon; tehlikeli dürtülere göre hareket etmek; uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu; saldırgan, öfkeli veya şiddet içeren davranışlar; mani (çılgın, anormal derecede heyecanlı ruh hali); kendine zarar vermek ya da hayatına son vermek hakkında konuşmak ya da düşünmek; veya davranış veya ruh halindeki diğer olağandışı değişiklikler. Ailenizin veya bakıcınızın hangi semptomların ciddi olabileceğini bildiğinden emin olun, böylece kendi başınıza tedavi göremiyorsanız doktoru arayabilirler.
- Lakozamid enjeksiyonunun, özellikle yatar pozisyondan çok hızlı kalktığınızda baş dönmesine, baş dönmesine, bayılmaya veya düzensiz kalp atışlarına neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu semptomları geliştirirseniz, kendinizi daha iyi hissedene kadar bacaklarınızı kaldırarak uzanın ve hemen doktorunuza arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda kullanın. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz kullanmayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Lakozamid enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- mide bulantısı
- kusma
- ishal
- kuru ağız
- ağızda uyuşma veya karıncalanma
- bulanık veya çift görme
- kontrol edilemeyen göz hareketleri
- baş dönmesi
- baş ağrısı
- uyuşukluk
- vücudun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması
- koordinasyon, denge veya yürüme ile ilgili sorunlar
- zayıflık
- kaşıntı
- enjeksiyon yerinde kızarıklık, tahriş, ağrı veya rahatsızlık

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümünde listelenenlerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal doktorunuzu arayın:

- hızlı veya vurucu kalp atışı veya nabız
- nefes darlığı
- yavaş kalp atışı
- göğüs ağrısı
- bayılma
- yüz, boğaz, dil, dudaklar ve gözlerin şişmesi

- ateş
- döküntü
- yorgunluk
- cilt veya gözlerin sararması
- Koyu idrar

Lakozamid enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı sorunlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Sağlık uzmanınız, ilacınızı nasıl saklayacağınıza size söyleyecektir. İlaçlarınızı yalnızca belirtildiği şekilde saklayın. İlaçlarınızı doğru şekilde nasıl saklayacağınıza anladığınızdan emin olun.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefonda zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Lakozamid enjeksiyonu kontrollü bir maddedir. Reçeteler yalnızca sınırlı sayıda yeniden doldurulabilir; herhangi bir sorunuz varsa eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- Vimpat®IV

Son Revize - 12/15/2021

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022