Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

عنوانURL لهذه الصفحة: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694003.html

بيبيراسيلينوحقن تازوباكتام

تنطقكـ (pi per 'a sil in) (ta zoe bak' tam)

لماذايوصف هذا الدواء؟

يستخدمحقن Piperacillin و tazobactam لعلاج الالتهاب الرئوي والتهابات الجلد وأمراض النساء والبطن (منطقة المعدة) التي تسببهاالبكتيريا. Piperacillin ينتمي إلى فئة من الأدوية تسمى المضادات الحيوية البنسلين. وهو يعمل عن طريق قتل البكتيريا المسببةللعدوى. تازوباكتام في فئة تسمى مثبطات بيتالاكتاماز. وهو يعمل عن طريق منع البكتيريا من تدمير البيبيراسيلين.

لنتعمل المضادات الحيوية مثل بيبيراسيلين وحقن تازوباكتام لنزلات البرد أو الأنفلونزا أو أي عدوى فيروسية أخرى. إن تناول المضاداتالحيوية أو استخدامها عندما لا تكون هناك حاجة إليها يزيد من خطر الإصابة بعدوى تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية.

فكيفيستعمل هذا الدواء؟

يأتيحقن Piperacillin و tazobactam على شكل مسحوق يتم خلطه مع السائل وحقنه عن طريق الوريد (في الوريد). عادة ما يتمإعطاؤه كل 6 ساعات ، ولكن قد يتلقى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 9 أشهر فما فوق كل 8 ساعات. تعتمد مدة العلاج على صحتكالعامة ، ونوع العدوى التي تعاني منها ، ومدى استجابتك للأدوية. سيخبرك طبيبك بمدة استخدام حقن بيبيراسيلين وتازوباكتام.بعد أن تتحسن حالتك ، قد يحولك طبيبك إلى مضاد حيوي آخر يمكنك تناوله عن طريق الفم لإكمال علاجك.

قدتتلقى حقنة بيبيراسيلين وتازوباكتام في المستشفى ، أو يمكنك إعطاء الدواء في المنزل. إذا كنت ستتلقى حقن بيبيراسيلين وتازوباكتامفي المنزل ، فسوف يوضح لك مقدم الرعاية الصحية كيفية استخدام الدواء. تأكد من فهمك لهذه التوجيهات ، واسأل مقدمالرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي أسئلة.

يجبأن تبدأ في الشعور بالتحسن خلال الأيام القليلة الأولى من العلاج باستخدام حقن بيبيراسيلين وتازوباكتام. إذا لم تتحسن الأعراضالخاصة بك أو إذا ساءت ، اتصل بطبيبك.

اطلبمن الصيدلي أو الطبيب الحصول على نسخة من معلومات الشركة المصنعة للمريض.

هناكاستخدامات لهذا الدواء

يمكنوصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعةالاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبلاستخدام حقن بيبيراسيلين وتازوباكتام ،

- أخبرطبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه البيبراسيلين وتازوباكتام والمضادات الحيوية من السيفالوسبورين مثل سيفاكلوروسيفادروكسيل وسيفوروكسيم (سيفتين وزيناسيف) وسيفاليكسين (كيفليكس) ؛ المضادات الحيوية بيتا لاكتام مثل البنسلينأو أموكسيسيلين (أموكسيل ، لاروتيد ، موكساتاج) ؛ أي أدوية أخرى ، أو أي من المكونات في حقن بيبيراسيلين وتازوباكتام.اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.

- أخبرطبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التيتتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: المضادات الحيوية أمينوغليكوزيد مثل أميكاسين ، جنتاميسين ، أو توبراميسين ؛مضادات التخثر (مميعات الدم) مثل الهيبارين أو الوارفارين (كومادين ، جانتوفين) ؛ الميثوتريكسات (Trexall ، Rasuvo ، Otrexup) ، البروبينسيد (Probalan ، في Col-Probenecid) ؛ أو فانكومايسين (فانكوسين). قد يحتاج طبيبك إلىتغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.

- أخبرطبيبك إذا كان لديك أو سبق أن أصبت بالتليف الكيسي (مرض وراثي يسبب مشاكل في التنفس والهضم والتكاثر) أو أمراض الكلى.
- أخبرطبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو مرضعة. إذا أصبحت حاملاً أثناء تلقيك حقن بيبيراسيلين وتازوباكتام ، فاتصلبطبيبك.
- إذاكنت ستخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتلقى حقنة بيبيراسيلينوتازوباكتام.

قبعةتعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

الآثارالجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قديسبب حقن Piperacillin و tazobactam آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراضشديدة أو لا تختفي:

- إسهال
- إمساك
- غثيان
- التقيؤ
- حرقةمن المعدة
- آلامفي المعدة
- حمُى
- صداعالراس
- تقرحاتالفم
- صعوبةفي النوم أو البقاء نائما

بعضالآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أياً من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفورأو احصل على علاج طبي طارئ:

- متسرع

- متلهف،متشوق
- قشعريرة
- صعوبةفي التنفس أو البلع
- أزيز
- الإسهالالشديد (البراز المائي أو الدموي) الذي قد يحدث مع أو بدون حمى وتقلصات في المعدة (قد تحدث حتى شهرين أو أكثربعد العلاج)

قديسبب حقن Piperacillin و tazobactam آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تلقيهذا الدواء.

إذاكنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرةعبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[) أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبعةمعلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظبجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك اختبارات معملية معينة للتحقق من استجابة جسمك لحقن بيبيراسيلينوتازوباكتام.

قبلإجراء أي اختبار معمل ، أخبر طبيبك وموظفي المختبر أنك تتلقى حقن piperacillin و tazobactam. إذا كنت مصاباً بداء السكري ،فيمكن أن يتسبب حقن البيبراسيلين وتازوباكتام في نتائج خاطئة مع بعض اختبارات جلوكوز البول. تحدث إلى طبيبكحول استخدام اختبارات الجلوكوز الأخرى أثناء استخدام حقن بيبيراسيلين وتازوباكتام.

منالمهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجاتمثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباًأو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماءراند

- زوسين®(كمنتج تركيبي يحتوي على Piperacillin و Tazobactam)

آخرمراجعة - 15/10/2016

تعلمكيفية الاستشهاد بهذه الصفحة

إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة.
الازدواجية ، 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland.
للاستخدامالتجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبةالوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهدالوطنية للصحة

آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022