Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696011.html

Lamivudina

pronunciado como (la mi' vyoo deen)

AVISO IMPORTANTE:

Informe o seu médico se tem ou pensa que pode ter infecção pelo vírus da hepatite B (VHB; uma infecção hepática em curso). O seu médico pode testá-lo para ver se tem HBV antes de iniciar o tratamento com lamivudina. Se você tem HBV e toma lamivudina, sua condição pode piorar repentinamente quando você parar de tomar lamivudina. Seu médico irá examiná-lo e solicitar exames laboratoriais regularmente por vários meses após você parar de tomar lamivudina para ver se o seu HBV piorou.

Os comprimidos e o líquido de Epivir (usados para tratar o vírus da imunodeficiência humana [HIV]) não são intercambiáveis com os comprimidos e o líquido de Epivir-HBV (usados para tratar a infecção por hepatite B). Epivir contém uma dose mais elevada de lamivudina do que Epivir-HBV. O tratamento com Epivir-HBV em pacientes infectados pelo HIV pode fazer com que o vírus HIV seja menos tratável com lamivudina e outros medicamentos. Se você tem HIV e hepatite B, você deve tomar apenas Epivir. Se você estiver tomando Epivir-HBV para infecção por hepatite B, converse com seu médico sobre os riscos de infecção pelo HIV.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns testes para verificar a resposta do seu corpo à lamivudina.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar lamivudina.

por que este medicamento é prescrito?

A lamivudina (Epivir) é usada junto com outros medicamentos para tratar a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em adultos e crianças com 3 meses de idade ou mais. A lamivudina (Epivir-HBV) é usada para tratar a infecção por hepatite B. A lamivudina está em uma classe de medicamentos chamados inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa (NRTIs). Funciona diminuindo a quantidade de HIV e hepatite B no sangue. Embora a lamivudina não cure o HIV, ela pode diminuir sua chance de desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e doenças relacionadas ao HIV, como infecções graves ou câncer. Tomar esses medicamentos junto com a prática de sexo seguro e outras mudanças no estilo de vida pode diminuir o risco de transmissão (disseminação) do vírus HIV ou da hepatite B para outras pessoas.

como este medicamento deve ser usado?

A lamivudina vem como um comprimido e solução oral (líquido) para tomar por via oral. A lamivudina (Epivir) é geralmente tomada uma ou duas vezes ao dia com ou sem alimentos. A lamivudina (Epivir-HBV) é geralmente tomada uma vez ao dia. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome lamivudina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

A lamivudina controla a infecção pelo HIV e hepatite B, mas não os cura. Continue a tomar lamivudina mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar lamivudina sem falar com o seu médico. Quando o seu suprimento de lamivudina começar a diminuir, peça mais ao seu médico ou farmacêutico. Se você perder doses ou parar de tomar lamivudina, sua condição pode se tornar mais difícil de tratar.

outros usos para este medicamento

A lamivudina também é usada às vezes em combinação com outros medicamentos para tratar profissionais de saúde ou outros indivíduos expostos à infecção pelo HIV após contato acidental com sangue, tecidos ou outros fluidos corporais contaminados pelo HIV. Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar lamivudina,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à lamivudina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de lamivudina ou da solução oral. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar o seguinte: interferon alfa (Intron A), ribavirina (Copegus, Rebetol, outros), sorbitol; e trimetoprima/sulfametoxazol (Bactrim, Septra).
- informe o seu médico se tem ou já teve infecção pelo vírus da hepatite C ou outra doença hepática, doença renal ou doença pancreática (apenas em crianças).
- informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar lamivudina, contacte o seu médico. Você não deve amamentar se estiver infectada pelo HIV ou se estiver tomando lamivudina.
- você deve saber que enquanto estiver tomando medicamentos para tratar a infecção pelo HIV, seu sistema imunológico pode ficar mais forte e começar a combater outras infecções que já estavam em seu corpo. Isso pode fazer com que você desenvolva sintomas dessas infecções. Se tiver sintomas novos ou agravados após o início do tratamento com lamivudina, informe o seu médico.
- se você tem diabetes, saiba que há 3 gramas de sacarose em cada colher de sopa (15 mL) de solução de lamivudina.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A lamivudina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- diarréia
- dor de cabeça
- dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo
- depressão
- nariz entupido

Se você tiver algum dos seguintes sintomas ou aqueles listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente:

- irritação na pele
- vômito (em crianças)
- náusea (em crianças)
- dor contínua que começa na área do estômago, mas pode se espalhar para as costas (em crianças)
- dormência, formigamento ou queimação nos dedos das mãos ou dos pés
- cansaço excessivo; fraqueza, tonturas ou vertigens; batimentos cardíacos rápidos ou irregulares; dor muscular; dor de estômago com náusea e vômito; falta de ar ou dificuldade para respirar; sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, calafrios ou tosse; ou sensação de frio, especialmente nos braços ou pernas
- evacuações de cor clara; amarelecimento da pele ou dos olhos; perda de apetite; sangramento incomum ou hematomas; urina amarela escura ou marrom; ou dor na parte superior direita do estômago

A lamivudina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). A solução oral não precisa ser refrigerada; no entanto, deve ser armazenado em local fresco.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

Mantenha um suprimento de lamivudina à mão. Não espere até ficar sem medicação para reabastecer sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Epivir®
- Epivir-HBV®

nomes rand de produtos combinados

- Epzicom®(contendo abacavir, lamivudina)

outros nomes

- 3TC

Última revisão - 15/06/2018

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022