Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

כתובת האתר של דף זה: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601066.html

למיוודין וזידוודין

מבוטא בתור (zye doe' vyoo deen) (la mi' vyoo deen)

אזהרה חשובה:

למיוודין וזידוודין עשויים להפחית את מספר התאים מסוימים בדם שלך, כולל תאי דם אדומים ולבנים. ספר לרופא שלך אם יש לך או היה לך אי פעם מספר נמוך של כל סוג של תאי דם או הפרעות דם כלשהן כגון אנמיה (מספר נמוך מהרגיל של תאי דם אדומים) או בעיות במח עצם. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר מיד לרופא שלך: דימום חריג או חבורות; קוצר נשימה; עור חיוור; חום, כאב גרון, צמרמורות וסימנים אחרים של זיהום; או עייפות או חולשה חריגים.

למיוודין וזידוודין עלולים לגרום להפרעות בשרירים, במיוחד בשימוש במשך תקופה ארוכה. ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממחלה כלשהי בשרירים או חולשת שרירים. אם אתה חווה כאבי שרירים או חולשת שרירים, התקשר לרופא מיד.

למיבודין וזידוודין עלולים לגרום לנזק מסכן חיים לכבד ולמצב שעלול לסכן חיים הנקרא חמצת לקטית (הצטברות חומצת חלב בדם). ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממחלת כבד. אם יש לך מחלת כבד הרופא שלך כנראה יגיד לך לא לקחת למיוודין וזידוודין. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא מיד או קבל טיפול רפואי חירום: בחילות, הקאות, כאבים בחלק הימני העליון של הבטן, חוסר תיאבון, עייפות קיצונית, דימום או חבורות חריגות, חולשה, סחרחורת, סחרחורת. דופק מהיר או לא סדיר, קשיי נשימה, שתן צהוב או חום כהה, יציאות בהירות, הצהבה של העור או העיניים, תחושת קור, במיוחד בזרועות או ברגליים,

ספר לרופא שלך אם יש לך או חושב שיש לך זיהום בנגיף הפטיטיס B (HBV; זיהום מתמשך בכבד). הרופא שלך עשוי לבדוק אותך כדי לראות אם יש לך HBV לפני שתתחיל את הטיפול עם lamivudine וזידובודין. אם יש לך HBV ואתה נוטל למיוודין וזידוודין, מצבך עלול להחמיר פתאום כאשר אתה מפסיק ליטול למיוודין וזידוודין. הרופא שלך יבדוק אותך ויזמין בדיקות מעבדה באופן קבוע במשך מספר חודשים לאחר הפסקת נטילת lamivudine כדי לראות אם HBVשלך החמיר.

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מעבדה מסוימות במהלך הטיפול ולאחריו כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך ללימוודין וזידובודין.

היי האם נרשמה תרופה זו?

השילוב של lamivudine ו-zidovudine משמש יחד עם תרופות אחרות לטיפול בזיהום בנגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV).למיוודין וזידוודין הם בקבוצה של תרופות הנקראות מעכבי תעתוק הפוך של נוקלאוזיד (NRTIs). הם פועלים על ידי הפחתת כמות ה-HIV בדם. למרות שהשילוב של lamivudine וזידובודין אינו מרפא HIV, הוא עשוי להפחית את הסיכוי שלך לפתח תסמונת כשל חיסוני נרכש (איידס) ומחלות הקשורות ל-HIV כגון זיהומים חמורים או סרטן. נטילת תרופות אלו יחד עם תרגול סקס בטוח יותר וביצוע שינויים אחרים באורח החיים עשויים להפחית את הסיכון להעברת (הפצת) נגיף ה-HIV לאנשים אחרים.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

השילוב של lamivudine וזידובודין מגיע כטבליה לנטילה דרך הפה. זה נלקח בדרך כלל פעמיים ביום עם או בלי אוכל. קח למיוודין וזידובודין בערך באותן שעות בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח את התרופה בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא.

למיודין וזידוודין שולטים בזיהום ב-HIV אך אינם מרפאים אותו. המשך ליטול למיודין וזידוודין גם אם אתה מרגיש טוב .אל תפסיק ליטול למיוודין וזידוודין מבלי לדבר עם הרופא שלך. כאשר האספקה שלך של lamivudine וזידובודין מתחילה להיגמר, קבל יותר מהרופא או הרוקח שלך. אם אתה מחמיץ מינונים או מפסיק ליטול למיוודין וזידובודין, המצב שלך עלול להיות קשה יותר לטיפול.

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת למיוודין וזידובודין,

- ספר לרופא או לרוקח אם אתה אלרגי ל-lamivudine (Epivir, Epivir HBV, אחרים); Retrovir(zidovudine); כל תרופה אחרת; או כל אחד מהמרכיבים בטבליות למיוודין וזידוודין. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.

- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם או ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחי מרפא אתה נוטל. הקפד להזכיר את כל אחד מהדברים הבאים: אטובקוויון (מלרון, מפרון), תרופות מסוימות לסרטן כגון דוקסורוביצין (דוקסיל), פלוקונאזול (דיפלוקן), גנציקלוביר (ציטובן, ולציט), אינטרפרון אלפא, מתדון (דולופין, מתדוז), ריבאווירין (קופגוס, רבטרול ואחרים), ריפמפין (ריפאדין, רימקטן, בריפאמט, בריפאטר) וסטבודין (זריט). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי. תרופות רבות אחרות עשויות לקיים אינטראקציה עם lamivudine וזידובודין, לכן הקפידו לספר לרופא על כל התרופות שאתם נוטלים, גם אלו שאינן מופיעות ברשימה זו.

- בנוסף לתנאים המפורטים בסעיף אזהרה חשובה, ספר לרופא אם יש לך או סבלת אי פעם בדלקת לבלב (נפיחות של הלבלב שאינה חולפת) או מחלת כליות.

- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן נטילת למיוודין וזידובודין, התקשר לרופא שלך. אתה לא צריך להניק אם אתה

נגועים ב-HIV או אם אתה נוטל למיוודין וזידוודין.

- עליך להיות מודע לכך ששומן הגוף שלך עשוי לעלות או לעבור לאזורים שונים בגופך, כגון הגב העליון, הצוואר ("גבנון תאו"), השדיים וסביב הבטן. ייתכן שתבחין באובדן שומן בגוף מהפנים, הרגליים והזרועות שלך.

- עליך לדעת שבזמן שאתה נוטל תרופות לטיפול בזיהום ב-HIV, המערכת החיסונית שלך עלולה להתחזק ולהתחיל להילחם בזיהומים אחרים שכבר היו בגופך. זה עלול לגרום לך לפתח תסמינים של זיהומים אלה. אם יש לך תסמינים חדשים או מחמירים בכל עת במהלך הטיפול עם lamivudine וזידובודין, הקפד לספר לרופא שלך.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

למיוודין וזידוודין עלולים לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- כְּאֵב רֹאשׁ
- שִׁלְשׁוּל
- צִרְבֶת
- קושי להירדם או להישאר ישן
- דִּכְאוֹן
- האף סתום
- לְהִשְׁתַּעֵל
- כאב מפרקים

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. תופעות הלוואי הבאות אינן שכיחות, אך אם אתה חווה אחת מהן, או כל אחת מאלה המפורטות בסעיף אזהרה חשובה, התקשר לרופא מיד :

- כוורות
- פריחה
- עקצוץ
- קשיי נשימה או בליעה
- חוסר תחושה, עקצוץ או צריבה באצבעות או בהונות
- חום

- צפצופים

למיוודין וזידוודין עלולים לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות כלשהן בזמן נטילת למיוודין וזידובודין.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatchבאינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[) או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן את הטבליות במקרר או בטמפרטורת החדר אך הרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם.]http://www.upandaway.org[http://www.upandaway.org

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (]http://goo.gl/c4Rm4p[http://goo.gl/c4Rm4p) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת]https://www.poisonhelp.org/help[https://www.poisonhelp.org/help. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול את הדברים הבאים:

- כְּאֵב רֹאשׁ
- הקָאָה
- עייפות קיצונית

צריך לדעת מידע אחר?

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

שמור על אספקה של lamivudine וזידובודין בהישג יד. אל תחכה עד שתיגמר התרופות כדי למלא מחדש את המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- קומביביר®

השמות שלהם

- 3TC ו-ZDV
- 3TC ו-AZT
- ואזידותימידין 3TC

מתוקן לאחרונה - 15/05/2019

למד כיצד לצטט דף זה

האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור

AHFS®מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות®כל הזכויות שמורות. שִׁכפּוּל .4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland ,
לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022