Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619006.html

Larotrectinib

ออกเสียงว่า (lar" oh trek 'ti nib)

hy เป็นยานี้กำหนด?

Larotrectinib ใช้รักษาเนืองอกบางชนิดในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไปที่ลุกลามไปยังส่วนอืน ๆ ของร่างกายหรือไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้สำเร็จ ยานี้ใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการรักษาอืนๆ และเนืองอกจะแย่ลงหลังจากได้รับการรักษาด้วยวิธีอืน Larotrectinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทำงานโดยการปิดกันการทำงานของโปรตีนผิดปกติที่บอกให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งอาจช่วยชะลอการเติบโตของเนืองอก

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Larotrectinib มาในรูปแบบแคปซูลและเป็นสารละลาย (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละสองครั้ง รับประทาน larotrectinib ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึงที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ larotrectinib ตรงตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

กลืนแคปซูลทังหมดด้วยน้ำ อย่าเคียวหรือบดขยี้

ใช้กระบอกฉีดยาในช่องปาก (อุปกรณ์ตรวจวัด) เพื่อวัดและใช้ยา larotrectinib ในปริมาณที่ถูกต้องแม่นยำ สอบถามเภสัชกรของคุณสำหรับเข็มฉีดยาในช่องปากหากไม่ได้รวมอยู่ในยาของคุณ อย่าใช้ช้อนชาที่ใช้ในครัวเรือนเพื่อวัดสารละลาย เปลี่ยนหลอดฉีดยาในช่องปากแต่ละอันหลังจากใช้งานเป็นเวลา 7 วันหรือหากได้รับความเสียหาย ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับวิธีการใช้และทำความสะอาดกระบอกฉีดยาในช่องปาก ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ

หากคุณกำลังให้สารละลายกับเด็ก ให้วางปลายกระบอกฉีดยาในช่องปากเข้าไปในปากของเด็กโดยชิดด้านในของแก้ม ให้เด็กอยู่ในท่าตังตรงสักครู่หลังจากให้ยา larotrectinib หากเด็กคายยาหรือคุณไม่แน่ใจว่าได้รับยาครบถ้วนแล้ว อย่าให้ยาอีก

หากคุณอาเจียนทันทีหลังจากรับประทาน larotrectinib อย่าใช้ยาซ้ำ ทำตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณ

แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวร หรือลดขนาดยา larotrectinib ระหว่างการรักษา ขึ้นอยู่กับว่ายาทำงานได้ดีแค่ไหนสำหรับคุณและผลข้างเคียงที่คุณพบ อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วย larotrectinib

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสำเนาข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานลาโรเตรคตินิบ

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ larotrectinib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลหรือสารละลาย larotrectinib สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, Sporanox) และ ketoconazole; อวานาฟิล (สเตนดรา); บัสไพโรน; clarithromycin (Biaxin ใน PrevPac); ยาบางชนิดสำหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับ (AIDS) เช่น efavirenz (Sustiva, ใน Atripla), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), nevirapine (Viramune), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ ซาควินาเวียร์ (Invirase); ยาบางชนิดที่กดภูมิคุ้มกัน เช่น everolimus (Afinitor, Zortress), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Prograf); โลวาสแตติน; มิดาโซแลม; เนฟาโซโดน; pioglitazone (Actos); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); ยาบางชนิดสำหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol, อื่น ๆ), phenobarbital และ phenytoin (Dilantin, Phenytek); ซิลเดนาฟิล (Revatio, ไวอากร้า), ซิมวาสแตติน (Flolipid, Zocor); และวาร์เดนาฟิล (Levitra, Staxyn) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจำนวนมากอาจมีปฏิกิริยากับ larotrectinib ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ ซิมวาสแตติน (โฟลลิปิด, โซคอร์); และวาร์เดนาฟิล (Levitra, Staxyn) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจำนวนมากอาจมีปฏิกิริยากับ larotrectinib ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ ซิมวาสแตติน (โฟลลิปิด, โซคอร์); และวาร์เดนาฟิล (Levitra, Staxyn) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจำนวนมากอาจมีปฏิกิริยากับ larotrectinib ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้
- บอกแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น อย่าใช้สาโทเซนต์จอห์นในขณะที่รับประทาน larotrectinib
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยมีอาการที่ส่งผลต่อระบบประสาทหรือโรคตับ
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อกับลูก หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะต้องทำการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษาและใช้การคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังจากทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใช้การคุมกำเนิดระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่คุณสามารถใช้ได้ Larotrectinib อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในสตรี อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ ให้โทรปรึกษาแพทย์ทันที Larotrectinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
- แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย
- คุณควรรู้ว่า larotrectinib อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ หรือสับสน อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

อย่ากินส้มโอหรือดื่มน้ำเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใช้เวลาน้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนการให้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามกำหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Larotrectinib อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ไอ
- ท้องผูก
- ท้องเสีย
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- อาการปวดท้อง
- ปวดหัว
- คัดจมูก
- น้ำหนักมากขึ้น, น้ำหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น
- ปวดกล้ามเนื้อ ข้อ หรือปวดหลัง
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- เพิ่มความกระหาย; เปลี่ยนปริมาณหรือสีของปัสสาวะ ผิวแห้ง; หรือเป็นลม

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยู่ในส่วน ข้อควรระวังพิเศษ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

- พูดช้าหรือยาก ล้มโดยไม่ได้ตั้งใจ; หรือรู้สึกเสียวซ่า ชา หรือแสบร้อนที่มือและเท้า
- ไข้
- บวมที่มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง
- หายใจถี่
- ความเหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงผิดปกติ หรือผิวสีซีด
- สูญเสียความกระหาย; คลื่นไส้ อาเจียน; สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา หรือปวดท้องด้านขวาบน

Larotrectinib อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยานี้?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บแคปซูลไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ) เก็บสารละลายในช่องปากไว้ในตู้เย็นและปิดให้สนิท อย่าหยุด กำจัดสารละลายปากเปล่าที่ไม่ได้ใช้ 90 วันหลังจากเปิดขวดเป็นครั้งแรก

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษาเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ larotrectinib สำหรับเงื่อนไขบางอย่าง แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษา เพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วย larotrectinib ได้หรือไม่

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- Vitrakvi®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022