TITLE - LEDIPASVIR + SOFOSBUVIR / HARVONI
MEDICATION PATIENT INFORMATION
IN FILIPINO

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614051.html

Ledipasvir at Sofosbuvir

binibigkas bilang (le dip' as vir) at (soe fos' bue vir)

MAHALAGANG BABALA:

Maaaring nahawaan ka na ng hepatitis B (isang virus na nakahahawa sa atay at maaaring magdulot ng matinding pinsala sa atay), ngunit wala kang anumang mga sintomas ng sakit. Sa kasong ito, ang pag-inom ng kumbinasyon ng ledipasvir at sofosbuvir ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng mga sintomas at ang iyong impeksiyon ay magiging mas malala o nagbabanta sa buhay Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ng impeksyon sa hepatitis B na virus. Mag-uutos ang iyong doktor ng pagsusuri sa dugo upang makita kung mayroon ka o nagkaroon na ng impeksyon sa hepatitis B. Susubaybayan ka rin ng iyong doktor para sa mga palatandaan ng impeksyon sa hepatitis B sa panahon at sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng iyong paggamot. Kung kinakailangan, maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng gamot upang gamutin ang impeksyong ito bago at sa panahon ng iyong paggamot na may kumbinasyon ng ledipasvir at sofosbuvir.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng ilang mga pagsusuri bago, habang, at pagkatapos ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa kumbinasyon ng ledipasvir at sofosbuvir.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa (mga) panganib ng pag-inom ng kumbinasyon ng ledipasvir at sofosbuvir.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang kumbinasyon ng ledipasvir at sofosbuvir ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere, iba pa) upang gamutin ang ilang uri ng talamak na hepatitis C (isang patuloy na impeksyon sa viral na pumipinsala sa atay) sa mga matatanda at bata 3 taong gulang at mas matanda. Ang Sofosbuvir ay nasa isang klase ng mga antiviral na gamot na tinatawag na nucleotide polymerase inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng hepatitis C virus (HCV) sa katawan. Ang Ledipasvir ay nasa isang klase ng mga antiviral na gamot na tinatawag na HCV NS5A inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa virus na nagdudulot ng hepatitis C mula sa pagkalat sa loob ng katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang kumbinasyon ng ledipasvir at sofosbuvir ay nagmumula bilang isang tableta at mga pellet na inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha nang may pagkain o walang pagkain isang beses araw-araw. Uminom ng ledipasvir at sofosbuvir sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng ledipasvir at sofosbuvir nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ang ledipasvir at sofosbuvir pellets ay maaaring lunukin (nang walang nginunguya) o maaari itong inumin kasama ng pagkain. Upang maghanda ng isang dosis ng ledipasvir at sofosbuvir pellets na may pagkain, iwisik ang buong pakete ng mga pellets sa isa o higit pang kutsara ng malamig o room temperature na hindi acidic na malambot na pagkain tulad ng puding, chocolate syrup, mashed potato, o ice cream. Kunin ang buong timpla sa loob ng 30 minuto ng pagwiwisik ng mga pellets sa pagkain. Upang maiwasan ang mapait na aftertaste, huwag nguyain ang mga pellets.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng ledipasvir at sofosbuvir kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Ang tagal ng iyong paggamot (8 hanggang 24 na linggo) ay depende sa iyong kondisyon, kung gaano ka kahusay tumugon sa gamot, at kung nakakaranas ka ng malubhang epekto. Huwag ihinto ang pag-inom ng ledipasvir at sofosbuvir nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng ledipasvir at sofosbuvir,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa ledipasvir o sofosbuvir, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa ledipasvir at sofosbuvir na mga tablet o pellets. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at nutritional supplement na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: amiodarone (Nexterone, Pacerone); digoxin (Lanoxin); ilang mga gamot para sa kanser; mga gamot para sa diabetes; ilang mga gamot para sa mga seizure tulad ng carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol), oxcarbazepine (Oxtellar XR, Trileptal), phenobarbital, o phenytoin (Dilantin, Phenytek); mga gamot para sa heartburn at ulcers; mga gamot para sa HIV na pinagsama-sama tulad ng efavirenz (Sustiva, sa Atripla), emtricitabine (Emtriva, sa Atripla) at tenofovir (Viread, sa Atripla); elvitegravir (Sustiva, sa Atripla), cobicistat (Tybost, sa Stribild), emtricitabine (Emtriva, sa Stribild), at tenofovir (Viread, sa Stribild); tenofovir (Viread), atazanavir (Reyataz) at ritonavir (Norvir); tenofovir (Viread), darunavir (Prezista) at ritonavir (Norvir); tenofovir (Viread), lopinavir (sa Kaletra), at ritonavir (Norvir, sa Kaletra); o tipranavir (Aptivus) at ritonavir (Norvir); ilang mga gamot na pumipigil sa immune system; rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); rifapentine (Priftin); rosuvastatin (Crestor); simeprevir (Olysio); sofosbuvir (Sovaldi); at warfarin (Coumadin, Jantoven). Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng ledipasvir at sofosbuvir kung umiinom ka ng isa o higit pa sa mga gamot na ito o maaaring masubaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa ledipasvir at sofosbuvir, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.
- kung umiinom ka ng mga antacid na naglalaman ng aluminum hydroxide o magnesium hydroxide (Maalox, Mylanta, Tums, iba pa), inumin ang mga ito 4 na oras bago o 4 na oras pagkatapos uminom ng ledipasvir at sofosbuvir.

- sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng gamot para sa hindi pagkatunaw ng pagkain, heartburn, o ulcers (H_2blockers) tulad ng cimetidine, ranitidine (Zantac), famotidine (Pepcid, sa Duexis) o nizatidine. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na inumin ang mga ito 12 oras bago o 12 oras pagkatapos ng ledipasvir at sofosbuvir, o kasabay ng pag-inom mo ng ledipasvir at sofosbuvir.
- sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort. Hindi ka dapat uminom ng St. John's wort sa panahon ng iyong paggamot na may ledipasvir at sofosbuvir.
- sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng liver transplant o kung mayroon kang human immunodeficiency virus (HIV). Gayundin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng anumang uri ng sakit sa atay maliban sa hepatitis C, sakit sa bato, o nasa dialysis.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng ledipasvir at sofosbuvir, tawagan ang iyong doktor. Kung ang ledipasvir at sofosbuvir ay ginagamit kasama ng ribavirin, siguraduhing basahin ang impormasyon tungkol sa mga pag-iingat sa pagbubuntis sa ribavirin monograph.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang ledipasvir at sofosbuvir ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pagkapagod
- sakit ng ulo
- nahihirapang makatulog o manatiling tulog
- pagduduwal
- pagtatae
- ubo
- pagkahilo
- pananakit ng kalamnan
- pagkamayamutin

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng pang-emerhensiyang paggamot:

- pantal
- paltos

- pamamaga ng mukha, braso, o binti
- kinakapos na paghinga
- pamamalat
- kahirapan sa paglunok o paghinga

Ang ledipasvir at sofosbuvir ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Huwag gamitin kung nasira o nawawala ang seal sa pagbubukas ng bote. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa liwanag, sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng mga reseta at hindi reseta (over-the-counter) na gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang dietary.

pandagdag. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Harvoni®

Huling Binago - 12/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022