Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.



Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615008.html

# Pirfenidone

**ออกเสียงว่า (pir fen 'ฉันทำ)**

## hy เป็นยานี้กำหนด?

Pirfenidone ใช้สำหรับการรักษาพังผืดในปอดที่ไม่ทราบสาเหตุ (แผลเป็นของปอดโดยไม่ทราบสาเหตุ) Pirfenidone อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าไพริโดน ไม่ทราบแน่ชัดว่า pirfenidone ทำงานอย่างไรในการรักษาโรคพังผืดในปอดที่ไม่ทราบสาเหตุ

## ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Pirfenidone มาในรูปแบบแคปซูลทางปาก มักรับประทานพร้อมอาหารวันละสามครั้ง ใช้แคปซูล pirfenidone ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ pirfenidone ตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

แพทย์ของคุณจะเริ่มต้นให้คุณกินยาไพร์เฟนิโดนขนาดต่ำและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาในช่วง 2 สัปดาห์

แพทย์ของคุณอาจต้องลดขนาดยาหรือหยุดการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงที่รุนแรง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสำเนาข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

## ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

## หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

### ก่อนรับประทานยาไพร์เฟนิโดน

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเพร์เฟนิโดน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลไพร์เฟนิโดน สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); ไซเมทิดีน (Tagamet); ซิโปรฟลอกซาซิน (Cipro); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); อีนอกซาซิน (Penetrex); ฟลูโวซามีน (Luvox); หรือ rifampin

(Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับหรือไต
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาไพร์เฟนิโดน ควรปรึกษาแพทย์
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรี่อาจลดประสิทธิภาพของยานี้ คุณควรหยุดสูบบุหรี่ก่อนเริ่มรับประทานยาไพร์เฟนิโดนและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ระหว่างการรักษา

- plan to avoid unnecessary or prolonged exposure to sunlight (including sunlamps and tanning beds) and to wear protective clothing, sunglasses, and sunscreen (SPF 50 or higher). Pirfenidone may make your skin sensitive to sunlight. Ask your doctor or pharmacist about avoiding other medications that may make your skin sensitive to sunlight.If your skin becomes reddened, swollen, or blistered, like a bad sunburn, call your doctor.

## hat special dietary instructions should I follow?

Unless your doctor tells you otherwise, continue your normal diet.

## hat should I do if I forget a dose?

Take the missed dose as soon as you remember it. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed one.

หากคุณพลาดการรักษาด้วยยาไพร์เฟนิโดนเป็นเวลา 14 วันขึ้นไป ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ แพทย์ของคุณจะบอกคุณถึงวิธีการรีสตาร์ทในขนาดต่ำ จากนั้นค่อยๆ เพิ่มขนาดยาใน 2 สัปดาห์

## ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

## Pirfenidone อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ท้องเสีย
- อิจฉาริษยา
- อาการปวดท้อง
- ปวดหัว
- อาการวิงเวียนศีรษะ
- ความกดดันหรือความอ่อนโยนในไซนัส
- นอนหลับยากหรือหลับยาก
- ปวดข้อ
- ลดน้ำหนัก

**ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:**

- ผื่น
- เหนื่อยมาก
- เลือดออกหรือช้ำผิดปกติ
- ขาดพลังงาน
- เบื่ออาหาร
- ปวดท้องด้านขวาบน
- สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา
- ปัสสาวะสีเข้มหรือสีน้ำตาล (สีชา)
- อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- อาการบวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง
- เสียงแหบ
- กลืนหรือหายใจลำบาก

Pirfenidone อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

## หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยานี้?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ) อย่าใช้ยาหากตราประทับเหนือการเปิดขวดจากผู้ผลิตชำรุดหรือขาดหายไปเมื่อคุณได้รับครั้งแรก

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

## ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

## หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยาไพร์เฟนิโดน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

## ชื่อแรนด์

- Esbriet®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2017

**เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้**

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022