



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Leflunomida

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600032.html>

leflunomida

pronunciado como (le floo' na mide)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

No tome leflunomida si está embarazada o planea quedar embarazada. La leflunomida puede dañar al feto. No debe comenzar a tomar leflunomida hasta que se haya realizado una prueba de embarazo con resultados negativos y su médico le diga que no está embarazada. Debe usar un método anticonceptivo eficaz antes de comenzar a tomar leflunomida, durante su tratamiento con leflunomida y durante 2 años después del tratamiento. Si su período se retrasa o no tiene un período durante el tratamiento con leflunomida, llame a su médico de inmediato. Hable con su médico si planea quedarse embarazada dentro de los 2 años posteriores a la interrupción del tratamiento con leflunomida. Su médico puede recetarle un tratamiento que ayudará a eliminar este medicamento de su cuerpo más rápidamente.

La leflunomida puede causar daño hepático que puede poner en peligro la vida e incluso causar la muerte. El riesgo de daño hepático es mayor en personas que toman otros medicamentos que se sabe que causan daño hepático y en personas que ya tienen una enfermedad hepática. Informe a su médico si tiene o ha tenido hepatitis o cualquier otro tipo de enfermedad hepática y si bebe o ha bebido grandes cantidades de alcohol. Informe a su médico y farmacéutico si está tomando acetaminofén (Tylenol, en otros productos de venta libre), aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE como ibuprofeno [Advil, Motrin] y naproxeno [Aleve, Naprosyn], colesterol -medicamentos reductores (estatinas), hidroxiclороquina, productos de hierro, isoniazida (Laniazid, en Rifamate, en Rifater), metotrexato (Trexall), niacina (ácido nicotínico) o rifampicina (Rifadin, Rimactane, en Rifamate, en Rifamate, en Rifater). Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: náuseas, cansancio extremo, sangrado o moretones inusuales, falta de energía, pérdida de apetito, dolor en la parte superior derecha del estómago, coloración amarillenta de la piel o los ojos, ojos oscuros. -orina de color, o síntomas similares a los de la gripe.

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas para verificar la respuesta de su cuerpo a la leflunomida.

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar leflunomida.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La leflunomida se usa sola o en combinación con otros medicamentos para tratar la artritis reumatoide (una afección en la que el cuerpo ataca sus propias articulaciones, causando dolor, hinchazón y pérdida de función). La leflunomida pertenece a una clase de medicamentos llamados fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME). Funciona al disminuir la inflamación y retardar el progreso de la afección, lo que puede ayudar a mejorar la actividad física de las personas con artritis reumatoide.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La leflunomida viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Suele tomarse una vez por día. Su médico puede indicarle que tome una dosis mayor de leflunomida durante los primeros 3 días de tratamiento. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la leflunomida exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Es posible que su médico necesite disminuir su dosis o suspender el tratamiento si experimenta ciertos efectos secundarios graves. Asegúrese de decirle a su médico cómo se siente durante su tratamiento.

La leflunomida puede ayudar a controlar los síntomas de la artritis reumatoide, pero no la cura. Continúe tomando leflunomida incluso si se siente bien. No deje de tomar leflunomida sin consultar a su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar leflunomida,

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la leflunomida, la teriflunomida (Aubagio), a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las tabletas de leflunomida. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar los medicamentos enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE y cualquiera de los siguientes: anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin Jantoven); colestiramina (Prevalite); compuestos de oro tales como auranofina (Ridaura); medicamentos para tratar el cáncer; otros medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, como azatioprina (Azasan, Imuran), ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) y tacrolimus (Astagraf, Prograf); penicilamina (Cuprimine, Depen) y tolbutamida. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido infecciones graves o si tiene infecciones frecuentes, cáncer u otras afecciones que afectan la médula ósea o el sistema inmunitario (incluido el virus de inmunodeficiencia humana [VIH] y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida [SIDA]), diabetes, o enfermedad renal.
- Informe a su médico si está amamantando. No amamante mientras esté tomando leflunomida.
- Si planea tener un hijo, debe hablar con su médico acerca de suspender la leflunomida y recibir un tratamiento para ayudar a eliminar este medicamento de su cuerpo más rápidamente.
- pregúntele a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras toma leflunomida.

- Tomar leflunomida puede disminuir su capacidad para combatir infecciones. Informe a su médico si tiene una infección ahora o si tiene algún signo de infección, como fiebre, tos o síntomas similares a los de la gripe. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas durante su tratamiento con leflunomida, llame a su médico: fiebre; dolor de garganta; tos; síntomas parecidos a la gripe; área de piel caliente, roja, hinchada o adolorida; micción dolorosa, difícil o frecuente; u otros signos de infección. Es posible que sea necesario interrumpir su tratamiento con leflunomida si tiene una infección.
- Es posible que ya esté infectado con tuberculosis (TB; una infección pulmonar grave) pero no tenga ningún síntoma de la enfermedad. En este caso, la leflunomida puede hacer que su infección sea más grave y hacer que desarrolle síntomas. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido TB, si ha vivido o visitado un país donde la TB es común, o si ha estado cerca de alguien que tiene o ha tenido TB. Antes de comenzar su tratamiento con leflunomida, su médico le realizará una prueba cutánea para ver si tiene TB. Si tiene TB, su médico tratará esta infección con antibióticos antes de que comience a tomar leflunomida.
- no tenga ninguna vacuna sin hablar con su médico.
- Debe saber que la leflunomida puede causar presión arterial alta. Debe controlar su presión arterial antes de comenzar el tratamiento y regularmente mientras toma este medicamento.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario regular de dosificación. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La leflunomida puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- Diarrea
- vómitos
- acidez
- dolor de cabeza
- mareo
- pérdida de peso
- dolor de espalda
- dolor muscular o debilidad
- dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies
- pérdida de cabello
- calambres en las piernas
- piel seca

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas o los enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE o PRECAUCIONES ESPECIALES, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- sarpullido con o sin fiebre
- urticaria
- ampollas o descamación de la piel
- úlceras de boca
- Comezón
- respiración dificultosa
- tos nueva o que empeora
- Dolor de pecho
- piel pálida

Recibir medicamentos que suprimen el sistema inmunológico puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. No se informó un aumento en los cánceres en los estudios clínicos con leflunomida hasta la fecha. Hable con su médico sobre los riesgos de recibir leflunomida.

La leflunomida puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño) y la luz.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se ha derrumbado,

tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame de inmediato a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

- Diarrea
- dolor de estómago
- cansancio extremo
- debilidad
- piel pálida
- latidos cardíacos acelerados
- dificultad para respirar

¿Qué otra información debo saber?

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Aravá®

Última revisión - 15/08/2015

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA® Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022