



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → เลฟลูโนไมด์

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600032.html>

เลฟลูโนไมด์

ออกเสียงว่า (le floo' na mide)

คำเตือนที่สำคัญ:

อย่าใช้เลฟลูโนไมด์หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ Leflunomide อาจเป็นอันตรายต่อการกในครรภ์ คุณไม่ควรเริ่มใช้เลฟลูโนไมด์จนกว่าคุณจะทำทดสอบการตั้งครรภ์โดยให้ผลลัพธ์เป็นลบ และแพทย์แจ้งว่าคุณไม่ได้ตั้งครรภ์ คุณต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพก่อนเริ่มใช้เลฟลูโนไมด์ ระหว่างการรักษาด้วยเลฟลูโนไมด์ และเป็นเวลา 2 ปีหลังการรักษา หากระยะเวลาของคุณมาช้าหรือคุณพลาดช่วงเวลาระหว่างการรักษาด้วยเลฟลูโนไมด์ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที พูดคุยกับแพทย์ของคุณหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์ภายใน 2 ปีหลังจากหยุดการรักษาด้วยเลฟลูโนไมด์ แพทย์ของคุณสามารถกำหนดวิธีการรักษาที่จะช่วยกำจัดยานี้ออกจากร่างกายของคุณได้เร็วยิ่งขึ้น

เลฟลูโนไมด์อาจทำให้ตับถูกทำลายซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและถึงกับเสียชีวิตได้ ความเสี่ยงต่อความเสียหายของตับจะสูงที่สุดในผู้ที่ทานยาอื่นๆ ที่ทราบว่าทำให้ตับถูกทำลาย และในผู้ที่เป็นโรคตับอยู่แล้ว แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับอักเสบหรือโรคตับชนิดอื่น และหากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก บอกแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกำลังทานอะเซตามิโนเฟน (ไทลินอลในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์อื่น ๆ) แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs เช่น ไอบูโพรเฟน [Advil, Motrin] และนาโพรเซน [Aleve, Naprosyn] คอเลสเตรอล - ยาลดไขมัน (สแตติน), ไฮดรอกซีคลอโรควิน, ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก, ไอโซเนียซิด (Laniazid, ใน Rifamate, ใน Rifater), methotrexate (Trexall), โนอาซิน (กรดนิโคตินิก) หรือ rifampin (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ในริฟาเตอร์) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: คลื่นไส้, เหนื่อยมาก, เลือดออกหรือรอยฟกช้ำผิดปกติ, ขาดพลังงาน, เบื่ออาหาร, ปวดท้อง, ผิวหรือตาเหลือง, มีด - ปัสสาวะสีหรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อเลฟลูโนไมด์

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เลฟลูโนไมด์

hy เป็นยานี้กำหนด?

Leflunomide ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทำให้เกิดอาการปวดบวมและสูญเสียการทำงาน) Leflunomide อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาแก้โรคไขข้อที่ปรับเปลี่ยนโรค (DMARDs) มันทำงานโดยลดการอักเสบและชะลอความก้าวหน้าของอาการ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการออกกำลังกายของผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

เลฟลูโนไมด์มาในรูปแบบเม็ดรับประทานทางปาก โดยปกติจะใช้เวลาวันละครั้ง แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณทานเลฟลูโนไมด์ในปริมาณมากขึ้นในช่วง 3 วันแรกของการรักษา ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้เลฟลูโนไมด์ตามที่กำหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

แพทย์ของคุณอาจต้องลดขนาดยาหรือหยุดการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงที่รุนแรง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา

เลฟลูโนไมด์อาจช่วยควบคุมอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ของคุณ แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานเลฟลูโนไมด์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเลฟลูโนไมด์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันทควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเลฟลูโนไมด์

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เลฟลูโนไมด์ เทอร์ฟลูโนไมด์ (โอบาจิโอ) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเลฟลูโนไมด์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญและสิ่งต่อไปนี้: anticoagulants ('blood thinners') เช่น warfarin (Coumadin Jantoven); cholestyramine (Prevalite); สารประกอบทองคำเช่นออราโนฟิน (Ridaura); ยารักษามะเร็ง ยาอื่น ๆ ที่กดภูมิคุ้มกันเช่น azathioprine (Azasan, Imuran), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Astagraf, Prograf); เพนิซิลลามีน (Cuprimine, Depen) และโทลูตาไมด์ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยติดเชือรุนแรง หรือหากคุณติดเชือบ่อย มะเร็ง หรืออาการอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อไขกระดูกหรือระบบภูมิคุ้มกัน (รวมถึงไวรัสโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ [เอชไอวี] และกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไต้มา [เอ็ดส์]) เบาหวาน หรือโรคไต
- แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก อย่าให้นมลูกในขณะที่ทานเลฟลูโนไมด์
- หากคุณกำลังวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการหยุดยาเลฟลูโนไมด์และเข้ารับการรักษาเพื่อช่วยในการกำจัดยานี้ออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น
- ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้เครื่องตีแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานเลฟลูโนไมด์

- การใช้เลฟลูโนไมด์อาจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อ แจ็งให้แพทย์ทราบหากคุณติดเชื้อในขณะที่ หรือหากคุณมีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ ไอ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ระหว่างการรักษาด้วยเลฟลูโนไมด์ ให้โทรเรียกแพทย์: ไข้; เจ็บคอ; ไอ; อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ บริเวณผิวหนังที่บวม แดง บวมหรือเจ็บปวด เจ็บปวด, ปัสสาวะลำบากหรือบ่อย; หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ การรักษาด้วยเลฟลูโนไมด์ของคุณอาจต้องหยุดชะงักหากคุณติดเชื้อ
- คุณอาจติดเชื้อวัณโรคอยู่แล้ว (TB; การติดเชื้อที่ปอดอย่างร้ายแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณีนี้ เลฟลูโนไมด์อาจทำให้การติดเชื้อของคุณรุนแรงขึ้นและทำให้คุณมีอาการ แจ็งแพทย์หากเคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคมาก่อน หรือเคยอาศัยอยู่ในหรือไปเยือนประเทศที่มีวัณโรคทั่วไป หรือเคยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคมาก่อน ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วยเลฟลูโนไมด์ แพทย์ของคุณจะทำการทดสอบผิวหนังเพื่อดูว่าคุณเป็นวัณโรคหรือไม่ หากคุณมีวัณโรค แพทย์ของคุณจะรักษาการติดเชื้อนี้ด้วยยาปฏิชีวนะก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เลฟลูโนไมด์
- ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
- คุณควรรู้ว่าเลฟลูโนไมด์อาจทำให้ความดันโลหิตสูง คุณควรตรวจความดันโลหิตก่อนเริ่มการรักษาและสม่ำเสมอในขณะที่ทานยานี้

ฉันควรทำอะไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานีสามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

เลฟลูโนไมด์อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ็งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ก้องเสียว
- อาเจียน
- อิจฉาริษยา
- ปวดหัว
- อาการเวียนศีรษะ
- ลดน้ำหนัก
- ปวดหลัง
- ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง
- ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า
- ผม่ว่ง
- ปวดขา
- ผิวแห้ง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญหรือข้อควรระวังพิเศษ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

- ผื่นที่มีหรือไม่มีไข้
- ลมพิษ
- แผลพุพองหรือลอกของผิวหนัง
- แผลในปาก
- อาการคัน
- หายใจลำบาก
- อาการไอใหม่หรือแยลง
- อาการเจ็บหน้าอก
- ผิวสีซีด

การรับยาที่ก่อกวนมีคํ่ากันอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งบางชนิด จนถึงปัจจุบันการศึกษาทางคลินิกกับ leflunomide ไม่พบการเพิ่มขึ้นของมะเร็ง พุดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับเลฟลูโนไมด์

เลฟลูโนไมด์อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉนวนควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?

เก็บยาไว้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นส่วนเกิน (ไม่ใช่ในห้องน้ำ) และแสง

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พุดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตาครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ลือคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ก กรณีสึ่ฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ใช้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. หากเหยื่อล้มลง

มีอาการชก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินที่ 911 ทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

- ท้องเสีย
- อาการปวดท้อง
- เหนื่อยมาก
- ความอ่อนแอ
- ผิวน้ำซีด
- หัวใจเต้นเร็ว
- หายใจถี่

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ตามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- อรวา®

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2015

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022