



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Leflunomide

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600032.html>

Leflunomide

binibigkas bilang (le floo' na mide)

MAHALAGANG BABALA:

Huwag uminom ng leflunomide kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Ang Leflunomide ay maaaring makapinsala sa fetus. Hindi ka dapat magsimulang uminom ng leflunomide hanggang sa kumuha ka ng pregnancy test na may negatibong resulta at sasabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi ka buntis. Dapat kang gumamit ng epektibong paraan ng birth control bago ka magsimulang uminom ng leflunomide, sa panahon ng iyong paggamot sa leflunomide, at sa loob ng 2 taon pagkatapos ng paggamot. Kung ang iyong regla ay huli o hindi ka na regla sa panahon ng paggamot na may leflunomide, tawagan kaagad ang iyong doktor. Makipag-usap sa iyong doktor kung plano mong magbuntis sa loob ng 2 taon pagkatapos ihinto ang paggamot na may leflunomide. Maaaring magreseta ang iyong doktor ng paggamot na makakatulong upang mas mabilis na maalis ang gamot na ito sa iyong katawan.

Ang Leflunomide ay maaaring magdulot ng pinsala sa atay na maaaring maging banta sa buhay at maging sanhi ng kamatayan. Ang panganib para sa pinsala sa atay ay pinakamalaki sa mga taong umiinom ng iba pang mga gamot na kilala na nagdulot ng pinsala sa atay, at sa mga taong mayroon nang sakit sa atay. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng hepatitis o anumang iba pang uri ng sakit sa atay at kung ikaw ay umiinom o nakainom na ng maraming alak. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung umiinom ka ng acetaminophen (Tylenol, sa iba pang mga over-the-counter na produkto), aspirin at iba pang nonsteroidal anti-inflammatory medication (NSAIDs gaya ng ibuprofen [Advil, Motrin] at naproxen [Aleve, Naprosyn], cholesterol -pagpapababa ng mga gamot (statins), hydroxychloroquine, mga produktong bakal, isoniazid (Laniazid, sa Rifamate, sa Rifater), methotrexate (Trexall), niacin (nicotinic acid), o rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pagduduwal, matinding pagkapagod, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, kawalan ng enerhiya, kawalan ng gana, pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, paninilaw ng balat o mata, madilim. -kulay na ihi, o mga sintomas na parang trangkaso.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa leflunomide.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng leflunomide.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Leflunomide ay ginagamit nang mag-isa o kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang rheumatoid arthritis (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga kasukasuan, na nagdudulot ng pananakit, pamamaga, at pagkawala ng paggana). Ang Leflunomide ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng pamamaga at pagpapabagal sa pag-unlad ng kondisyon, na makakatulong na mapabuti ang pisikal na aktibidad ng mga taong may rheumatoid arthritis.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Leflunomide ay dumarating bilang isang tableta upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha isang beses sa isang araw. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng mas malaking dosis ng leflunomide para sa unang 3 araw ng paggamot. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin ang leflunomide nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na bawasan ang iyong dosis o ihinto ang paggamot kung nakakaranas ka ng ilang malalang epekto.

Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot.

Maaaring makatulong ang Leflunomide na kontrolin ang mga sintomas ng iyong rheumatoid arthritis ngunit hindi ito gumagaling. Ipagpatuloy ang pag-inom ng leflunomide kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng leflunomide nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng leflunomide,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa leflunomide, teriflunomide (Aubagio), anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa leflunomide tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: anticoagulants ('blood thinners') tulad ng warfarin (Coumadin Jantoven); cholestyramine (Prevalite); gintong compound tulad ng auranofin (Ridaura); mga gamot sa paggamot ng kanser; iba pang mga gamot na pumipigil sa immune system tulad ng azathioprine (Azasan, Imuran), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune), at tacrolimus (Astagraf, Prograf); penicillamine (Cuprimine, Depen), at tolbutamide. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng malubhang impeksyon o kung madalas kang makakuha ng mga impeksyon, kanser o iba pang kondisyon na nakakaapekto sa bone marrow o immune system (kabilang ang human immunodeficiency virus [HIV] at acquired immunodeficiency syndrome [AIDS]), diabetes, o sakit sa bato.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Huwag magpapasuso habang umiinom ka ng leflunomide.
- kung nagpaplano kang maging ama ng isang anak, dapat kang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa paghinto ng leflunomide at pagtanggap ng paggamot upang makatulong na alisin ang gamot na ito sa iyong katawan nang mas mabilis.
- tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming nakalalasing habang umiinom ka ng leflunomide.

- Maaaring bawasan ng pag-inom ng leflunomide ang iyong kakayahang labanan ang impeksiyon. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang impeksiyon ngayon o kung mayroon kang anumang mga palatandaan ng impeksiyon tulad ng lagnat, ubo, o mga sintomas na tulad ng trangkaso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas habang ginagamot mo ang leflunomide, tawagan ang iyong doktor: lagnat; namamagang lalamunan; ubo; mga sintomas tulad ng trangkaso; lugar ng mainit, pula, namamaga, o masakit na balat; masakit, mahirap, o madalas na pag-ihi; o iba pang mga palatandaan ng impeksiyon. Ang iyong paggamot sa leflunomide ay maaaring kailanganing maantala kung mayroon kang impeksiyon.
- Maaaring nahawaan ka na ng tuberculosis (TB; isang malubhang impeksiyon sa baga) ngunit wala kang anumang mga sintomas ng sakit. Sa kasong ito, maaaring gawing mas seryoso ng leflunomide ang iyong impeksiyon at magdulot sa iyo ng mga sintomas. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng TB, kung ikaw ay nanirahan o bumisita sa isang bansa kung saan karaniwan ang TB, o kung nakasama mo ang isang taong nagkaroon o nagkaroon ng TB. Bago mo simulan ang iyong paggamot sa leflunomide, magsasagawa ang iyong doktor ng pagsusuri sa balat upang makita kung mayroon kang TB. Kung mayroon kang TB, gagamutin ng iyong doktor ang impeksiyong ito gamit ang mga antibiotic bago ka magsimulang uminom ng leflunomide.
- huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.
- dapat mong malaman na ang leflunomide ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo. Dapat mong ipasuri ang iyong presyon ng dugo bago simulan ang paggamot at regular habang iniinom mo ang gamot na ito.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Leflunomide ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pagtatae
- pagsusuka
- heartburn
- sakit ng ulo
- pagkahilo
- pagbaba ng timbang
- sakit sa likod
- pananakit o panghihina ng kalamnan
- pananakit, paso, pamamanhid, o pangingilig sa mga kamay o paa
- pagkawala ng buhok
- paa cramps
- tuyong balat

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas o ang mga nakalista sa MAHALAGANG BABALA o ESPEYAL NA PAG-Iingat na seksyon, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:

- pantal na may lagnat o walang lagnat
- mga pantal
- paltos o pagbabalat ng balat
- mga sugat sa bibig
- nangangati
- hirap huminga
- bago o lumalalang ubo
- pananakit ng dibdib
- maputlang balat

Ang pagtanggap ng mga gamot na pumipigil sa immune system ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ng ilang uri ng kanser. Ang pagtaas ng mga kanser ay hindi naiulat sa mga klinikal na pag-aaral na may leflunomide hanggang sa kasalukuyan. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng leflunomide.

Ang Leflunomide ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo) at liwanag.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahasag na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

Mahalagang panatilihin malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak,

nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

- pagtatae
- sakit sa tyan
- matinding pagod
- kahinaan
- maputlang balat
- mabilis na tibok ng puso
- kinakapos na paghinga

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Arava®

Huling Binago - 08/15/2015

[Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022