Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608001.html

เลนาลิโดไมด์

ออกเสียงว่า (len a lid' oh mide)

คำเตือนที่สำคัญ:

ความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการแต่กำเนิดที่คุกคามชีวิตอย่างรุนแรงซึ่งเกิดจากเลนาลิโดไมด์:

สำหรับผู้ป่วยทุกราย:

ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภ์ต้องไม่รับประทาน Lenalidomide มีความเสี่ยงสูงที่เลนาลิโดไมด์จะทำให้เกิดข้อบกพร่องรุนแรง (ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิด) หรือการเสียชีวิตของทารกในครรภ์

โปรแกรมที่เรียกว่า REVLIMID REMSTMได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ใช้เลนาลิโดไมด์และผู้หญิงจะไม่ตั้งครรภ์ขณะรับประทานเลนาลิโดไมด์ ผู้ป่วยทุกราย รวมทั้งผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์และผู้ชาย สามารถได้รับ lenalidomide ได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนกับ REVLIMID REMS มีใบสั่งยาจากแพทย์ที่ลงทะเบียนกับ REVLIMID REMS และกรอกใบสั่งยาที่ร้านขายยาที่ลงทะเบียนกับ REVLIMID REMS .

คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เลนาลิโดไมด์ และต้องลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมโดยระบุว่าคุณเข้าใจข้อมูลนี้ก่อนที่คุณจะสามารถรับยาได้ หากคุณอายุน้อยกว่า 18 ปี พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมและตกลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องไปพบแพทย์ในระหว่างการรักษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอาการและผลข้างเคียงที่คุณกำลังประสบอยู่ หรือเพื่อรับการทดสอบการตั้งครรภ์ตามคำแนะนำของโปรแกรม คุณอาจต้องกรอกแบบสำรวจที่เป็นความลับในช่วงเริ่มต้นของการรักษาและในบางช่วงเวลาระหว่างการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับและเข้าใจข้อมูลนี้แล้ว และคุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันความเสี่ยงร้ายแรงต่อทารกในครรภ์ได้

บอกแพทย์หากคุณไม่เข้าใจทุกสิ่งที่คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับเลนาลิโดไมด์และโปรแกรม REVLIMID REMS และวิธีการใช้วิธีการคุมกำเนิดที่พูดคุยกับแพทย์ของคุณ หรือหากคุณไม่คิดว่าคุณจะสามารถนัดหมายได้

อย่าบริจาคเลือดในขณะที่คุณรับประทานเลนาลิโดไมด์ ระหว่างช่วงพักการรักษา และเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

ห้ามใช้เลนาลิโดไมด์ร่วมกับผู้อื่น แม้แต่คนที่มีอาการเดียวกันกับคุณ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยเลนาลิโดไมด์ และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) เว็บไซต์ของผู้ผลิต หรือเว็บไซต์โปรแกรม REVLIMID REMS (http://www.revlimidrems.com [http://www.revlimidrems.com]) เพื่อรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เลนาลิโดไมด์

สำหรับผู้ป่วยหญิง:

หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการในระหว่างการรักษาด้วยเลนาลิโดไมด์ คุณต้องใช้รูปแบบการคุมกำเนิดที่ยอมรับได้สองรูปแบบเป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนเริ่มใช้เลนาลิโดไมด์ ระหว่างการรักษา รวมถึงบางครั้งที่แพทย์แจ้งให้คุณหยุดใช้เลนาลิโดไมด์ชั่วคราว และ 4 สัปดาห์หลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่ารูปแบบการคุมกำเนิดแบบใดที่ยอมรับได้ และจะให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการคุมกำเนิดแก่คุณ คุณต้องใช้การคุมกำเนิดสองรูปแบบนี้ตลอดเวลา เว้นแต่คุณจะรับประกันได้ว่าคุณจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา ระหว่างการหยุดชะงักของการรักษา และเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังจากนั้น ปริมาณสุดท้ายของคุณ

หากคุณเลือกรับประทานเลนาลิโดไมด์ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อน ระหว่าง และ 4 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย คุณต้องเข้าใจว่าการคุมกำเนิดทุกรูปแบบสามารถล้มเหลวได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจโดยใช้การคุมกำเนิดสองรูปแบบ บอกแพทย์หากคุณไม่เข้าใจทุกสิ่งที่คุณได้รับการบอกเกี่ยวกับการคุมกำเนิดหรือคุณไม่คิดว่าคุณจะสามารถใช้การคุมกำเนิดสองรูปแบบได้ตลอดเวลา

คุณต้องมีการทดสอบการตั้งครรภ์เป็นลบสองครั้งก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้เลนาลิโดไมด์ได้ คุณจะต้องทำการทดสอบการตั้งครรภ์ในห้องปฏิบัติการในช่วงเวลาที่แน่นอนระหว่างการรักษาของคุณ แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าต้องทำการทดสอบเหล่านี้เมื่อใดและที่ไหน

หยุดทานเลนาลิโดไมด์และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที หากคุณคิดว่าคุณกำลังตั้งครรภ์ ประจำเดือนขาด คุณมีประจำเดือนผิดปกติ หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้การคุมกำเนิดสองรูปแบบ หากคุณตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาหรือภายใน 30 วันหลังการรักษา แพทย์ของคุณจะติดต่อโปรแกรม REVLIMID REMS ผู้ผลิตเลนาลิโดไมด์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คุณยังจะได้พูดคุยกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและลูกน้อยของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและสุขภาพของทารกจะถูกใช้เพื่อช่วยให้แพทย์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของเลนาลิโดไมด์ต่อทารกในครรภ์

สำหรับผู้ป่วยชาย:

Lenalidomide มีอยู่ในน้ำอสุจิของคุณเมื่อคุณใช้ยานี้ คุณต้องใช้ถุงยางอนามัยเสมอ แม้ว่าคุณจะทำหมันแล้ว (การผ่าตัดที่ป้องกันไม่ให้ผู้ชายตั้งครรภ์) ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือสามารถเป็นได้

ตั้งครรภ์ในขณะที่ทานเลนาลิโดไมด์ ระหว่างพักการรักษา และเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย บอกแพทย์หากคุณมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือหากคู่ของคุณคิดว่าเธออาจตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยเลนาลิโดไมด์

อย่าบริจาคสเปิร์มในขณะที่คุณทานเลนาลิโดไมด์ ระหว่างช่วงพักการรักษา และเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

ความเสี่ยงอื่น ๆ ของการรับประทานเลนาลิโดไมด์:

Lenalidomide อาจทำให้จำนวนเซลล์เม็ดเลือดบางชนิดในร่างกายของคุณลดลง แพทย์จะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการรักษา เพื่อดูว่าจำนวนเซลล์เม็ดเลือดลดลงเท่าใด แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยา ขัดจังหวะการรักษา หรือรักษาคุณด้วยยาหรือการรักษาอื่นๆ หากเซลล์เม็ดเลือดของคุณลดลงอย่างรุนแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้แจ้งแพทย์ทันที: เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ ช้ำหรือมีเลือดออกง่าย มีเลือดออกที่เหงือก; หรือเลือดกำเดา

หากคุณกำลังใช้เลนาลิโดไมด์ร่วมกับเดกซาเมทาโซนเพื่อรักษามะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่คุณจะเกิดลิ่มเลือดที่ขาซึ่งอาจเคลื่อนผ่านกระแสเลือดไปยังปอดของคุณ หรือมีอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์ของคุณอาจกำหนดให้ใช้ยาอื่นร่วมกับเลนาลิโดไมด์เพื่อลดความเสี่ยงนี้ บอกแพทย์หากคุณสูบบุหรี่ หากคุณเคยมีลิ่มเลือดที่ร้ายแรง และถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือมีไขมันในเลือดสูง แจ้งแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณทานเพราะยาบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะพัฒนาลิ่มเลือดในขณะที่ทานเลนาลิโดไมด์กับเดกซาเมทาโซนรวมถึงดาร์บีโพเอติน (Aranesp), epoetin alfa (Epogen, Procrit) และยาที่มีเอสโตรเจน เช่น การบำบัดทดแทนฮอร์โมนหรือฮอร์โมนคุมกำเนิด (ยาคุมกำเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย หรือการฉีดยา) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ แจ้งให้แพทย์ทราบทันที: หายใจถี่; อาการเจ็บหน้าอกที่อาจลามไปที่แขน คอ หลัง กราม หรือท้อง; ไอ; แดงหรือบวมที่แขนหรือขา เหงือออก; คลื่นไส้ อาเจียน; ความอ่อนแอหรือชาอย่างกะทันหันโดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ปวดหัว; ความสับสน หรือมีปัญหาด้านการมองเห็น การพูด หรือการทรงตัว ความอ่อนแอหรือชาอย่างกะทันหันโดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ปวดหัว; ความสับสน หรือมีปัญหาด้านการมองเห็น การพูด หรือการทรงตัว ความอ่อนแอหรือชาอย่างกะทันหันโดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ปวดหัว; ความสับสน หรือมีปัญหาด้านการมองเห็น การพูด หรือการทรงตัว

hy เป็นยานี้กำหนด?

Lenalidomide ใช้ในการรักษาโรค myelodysplastic บางประเภท (กลุ่มของเงื่อนไขที่ไขกระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดที่ผิดรูปร่างและไม่ได้ผลิตเซลล์เม็ดเลือดที่แข็งแรงเพียงพอ) Lenalidomide ยังใช้ร่วมกับ dexamethasone เพื่อรักษาผู้ที่มี multiple myeloma (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก) นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาผู้ที่มี myeloma หลายชนิดหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (HSCT; ขั้นตอนที่เซลล์เม็ดเลือดบางชนิดจะถูกลบออกจากร่างกายแล้วกลับสู่ร่างกาย) Lenalidomide ยังใช้ในการรักษาผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปกคลุม (มะเร็งที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่เริ่มต้นในเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน) ที่ได้รับการรักษาด้วย bortezomib (Velcade) และยาอื่นอย่างน้อยหนึ่งชนิด ไม่ควรใช้ Lenalidomide ในการรักษาผู้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซิติกเรื้อรัง (มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่แย่ลงอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป) เว้นแต่พวกเขาจะเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิก (การศึกษาวิจัยเพื่อดูว่ายาอาจใช้อย่างปลอดภัยและ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาสภาพบางอย่าง) Lenalidomide อยู่ในกลุ่มยา

เรียกว่า สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน มันทำงานโดยช่วยให้ไขกระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดปกติและโดยการฆ่าเซลล์ที่ผิดปกติในไขกระดูก

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Lenalidomide มาเป็นแคปซูลเพื่อรับประทานทางปาก เมื่อใช้ lenalidomide ในการรักษาโรค myelodysplastic มักรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง เมื่อใช้เลนาลิโดไมด์เพื่อรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดเซลล์มะเร็งหลายชนิด มักรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้งในช่วง 21 วันแรกของรอบ 28 วัน เมื่อใช้ lenalidomide เพื่อรักษา multiple myeloma หลัง HSCT มักรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้งเป็นเวลา 28 วันของรอบ 28 วัน ระบบการปกครองรอบ 28 วันอาจทำซ้ำตามที่แพทย์ของคุณแนะนำโดยพิจารณาจากการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยานี้ รับประทานเลนาลิโดไมด์ในเวลาเดียวกันของทุกวันที่รับประทาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานเลนาลิโดไมด์ให้ตรงตามที่กำกับไว้

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยน้ำปริมาณมาก อย่าหัก เคี้ยว หรือเปิดมัน จัดการแคปซูลให้น้อยที่สุด หากคุณสัมผัสแคปซูลเลนาลิโดไมด์ที่หักหรือยาในแคปซูล ให้ล้างบริเวณนั้นของร่างกายด้วยสบู่และน้ำ หากยาในแคปซูลเข้าไปในปาก จมูก หรือตาของคุณ ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก

แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดการรักษาหรือลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยเลนาลิโดไมด์

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเลนาลิโดไมด์

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้เลนาลิโดไมด์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลเลนาลิโดไมด์ สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญและดิจอกซิน (Lanoxin) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณแพ้แลคโตส และหากคุณเคยเป็นโรคไต ไทรอยด์ หรือตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยทานธาลิโดไมด์ (ธาโลมิด) และมีอาการผื่นขึ้นระหว่างการรักษา

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณกำลังให้นมบุตรหรือกำลังวางแผนที่จะให้นมลูก

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากเวลาผ่านไปน้อยกว่า 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่คุณถูกกำหนดให้ทานยา ให้ทานยาที่ลืมไปทันทีที่นึกได้ หากผ่านไปนานกว่า 12 ชั่วโมง ให้ข้ามมื้อที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Lenalidomide อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ท้องเสีย
- ท้องผูก
- อาการปวดท้อง
- เบื่ออาหาร
- ลดน้ำหนัก
- ความอ่อนแอ
- อาการวิงเวียนศีรษะ
- เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรส
- ปวดหรือแสบร้อนที่ลิ้น ปาก หรือคอ
- ความรู้สึกสัมผัสลดลง
- การเผาไหม้หรือรู้สึกเสียวซ่าในมือหรือเท้า
- นอนหลับยากหรือหลับยาก
- ภาวะซึมเศร้า
- ปวดข้อ กล้ามเนื้อ กระดูก หรือปวดหลัง
- ปัสสาวะเจ็บปวดบ่อยหรือเร่งด่วน
- เหงื่อออก
- ผิวแห้ง
- การเจริญเติบโตของเส้นผมผิดปกติในผู้หญิง
- ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้
- ความต้องการหรือความสามารถทางเพศลดลง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

- อาการบวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
- เสียงแหบ

- หัวใจเต้นเร็ว ช้า เต้นผิดปกติ
- อาการชัก
- ผื่น
- ปวดผิวหนัง
- พุพอง ลอก หรือลอกผิว
- ต่อมบวมที่คอ
- ปวดกล้ามเนื้อ
- ปวดท้องด้านขวาบน
- สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา
- ปัสสาวะสีเข้ม
- เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
- ปัสสาวะเป็นเลือด มีเมฆมาก หรือเจ็บปวด
- ปัสสาวะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

หากคุณกำลังใช้เลนาลิโดไมด์เพื่อรักษามะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา และคุณยังได้รับเมลฟาแลน (อัลเครัน) หรือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดด้วย คุณอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งชนิดใหม่ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เลนาลิโดไมด์ แพทย์ของคุณจะตรวจหามะเร็งชนิดใหม่ในระหว่างการรักษาด้วยเลนาลิโดไมด์

Lenalidomide อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่คุณกำลังใช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยานี้?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ) คืนยาที่ล้าสมัยหรือไม่ต้องการให้แพทย์ ร้านขายยาที่ให้ยานั้นแก่คุณ หรือผู้ผลิต

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

- อาการคัน
- ลมพิษ
- ผื่น

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อเลนาลิโดไมด์

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- Revlimid®

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022