

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → การฉีดลิวโคโวริน

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608038.html>

การฉีดลิวโคโวริน

ออกเสียงว่า (loo koe vor 'ใน)

hy เป็นยานี้กำหนด?

การฉีด Leucovorin ใช้เพื่อป้องกันผลร้ายของ methotrexate (Rheumatrex, Trexall; ยาเคมีบำบัดสำหรับมะเร็ง) เมื่อใช้ methotrexate เพื่อรักษามะเร็งบางชนิด การฉีด Leucovorin ใช้ในการรักษาผู้ที่ได้รับยา methotrexate หรือยาที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้ตั้งใจ การฉีด Leucovorin ยังใช้รักษาโรคโลหิตจาง (เซลล์เม็ดเลือดแดงในระดับต่ำ) ที่เกิดจากกรดโฟลิกในร่างกายในระดับต่ำ การฉีด Leucovorin ยังใช้กับ 5-fluorouracil (ยาเคมีบำบัด) เพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (มะเร็งที่เริ่มต้นในลำไส้ใหญ่) การฉีด Leucovorin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ากรดโฟลิกแอนะล็อก มันปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับเมโรเทรกเซตโดยการปกป้องเซลล์ที่มีสุขภาพดีจากผลกระทบของเมโรเทรกเซต รักษาโรคโลหิตจางโดยการจัดหากรดโฟลิกที่จำเป็นสำหรับการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง รักษาภาวะลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยเพิ่มผลของ 5-fluorouracil

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

การฉีด Leucovorin มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) และผงเพื่อผสมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (เข้าเส้นเลือด) หรือเข้ากล้ามเนื้อ เมื่อใช้การฉีดลิวโคโวรินเพื่อป้องกันผลร้ายของเมโรเทรกเซต หรือเพื่อรักษาอาการขนาดของเมโรเทรกเซตหรือยาที่คล้ายคลึงกัน มักจะได้รับทุก 6 ชั่วโมงจนกว่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการจะแสดงว่าไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป เมื่อใช้การฉีด leucovorin เพื่อรักษาภาวะโลหิตจาง มักให้วันละครั้ง เมื่อใช้การฉีดลิวโคโวรินเพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ มักจะให้วันละครั้งเป็นเวลา 5 วัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาที่อาจให้ซ้ำทุกๆ 4 ถึง 5 สัปดาห์

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้ใช้อื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ จันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดลิวโคโวริน

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ลิวโคโวริน, เลวเลอโคโวริน, กรดโฟลิก (โฟลิเชท, ในวิตามินหลายชนิด) หรือยาอื่นๆ
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาบางชนิดสำหรับอาการชักเช่น phenobarbital, phenytoin (Dilantin) และ

พริมิโดน (ไมโซลีน); และ trimethoprim-sulfamethoxazole (Bactrim, Septra) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นโรคโลหิตจาง (จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงต่ำ) ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามิน B12 หรือความสามารถในการดูดซึมวิตามิน B12 แพทย์ของคุณจะไม่กำหนดให้ฉีด leucovorin เพื่อรักษาโรคโลหิตจางชนิดนี้
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยมีของเหลวสะสมในช่องอกหรือบริเวณท้อง มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังสมองหรือระบบประสาท หรือโรคไต
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดลิโวโคโวริน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- อาการชัก
- เป็นลม
- ท้องเสีย
- ผื่น
- ลมพิษ
- อาการคัน
- หายใจลำบากหรือคลื่นลำบาก

การฉีด Leucovorin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดลิโวโคโวริน

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรมำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- Wellcovorin® IV

ชื่อของเรา

- ปัจฉัย Citrovorum
- กรดโฟลิค
- 5-formyl เตตระไฮโดรโฟเลต

¶-สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 02/11/2012

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS® ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ © ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเธสดา, แมริแลนด์ สจวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022