

TITLE - LINAGLIPTIN + METFORMIN / JENTADUETO TRAJENTA DUO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medicines Org UK

Jentaduetto® 2.5 mg / 850 mg film kaplı tabletler **Jentaduetto® 2.5 mg / 1.000 mg film kaplı tabletler** linagliptin/metformin hidroklorür

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.

- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
- Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
- Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var?:

1. Jentaduetto nedir ve ne için kullanılır?
2. Jentaduetto'yu kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Jentaduetto nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Jentaduetto nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Jentaduetto nedir ve ne için kullanılır?

Tabletinizin adı Jentaduetto. Linagliptin ve metformin olmak üzere iki farklı aktif madde içerir.

- Linagliptin, DPP-4 inhibitörleri (dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri) adı verilen bir ilaç sınıfına aittir.
- Metformin, biguanidler adı verilen bir ilaç sınıfına aittir.

Jentaduetto nasıl çalışır?

İki aktif madde, 'tip 2 diyabetes mellitus' adı verilen diyabetli yetişkin hastalarda kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için birlikte çalışır. Diyet ve egzersizle birlikte bu ilaç, yemekten sonra insülin düzeylerini ve etkilerini iyileştirmeye yardımcı olur ve vücudunuzun ürettiği şeker miktarını düşürür.

Bu ilaç tek başına veya sülfonilüreler, empagliflozin veya insülin gibi diyabet için bazı diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Tip 2 diyabet nedir?

Tip 2 diyabet, vücudunuzun yeterince insülin üretmediği ve vücudunuzun ürettiği insülinin gerektiği gibi çalışmadığı bir durumdur. Vücudunuz da çok fazla şeker üretebilir. Bu olduğunda, kanda şeker (glikoz) birikir. Bu, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük ve amputasyon gibi ciddi tıbbi sorunlara yol açabilir.

2. Jentaduetto'yu kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Jentaduetto'yu kullanmayınız.

- linagliptin veya metformin veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir).
- Böbrek fonksiyonunuzu ciddi şekilde azalttıysanız.

- Şiddetli hiperglisemi (yüksek kan şekeri), mide bulantısı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, laktik asidoz (aşağıdaki "Laktik asidoz riski" bölümüne bakınız) veya ketoasidoz ile birlikte kontrol altına alınamayan diyabetiniz varsa. Ketoasidoz, 'keton cisimcikleri' adı verilen maddelerin kanda biriktiği ve diyabetik prekomaya yol açabilen bir durumdur. Semptomlar arasında mide ağrısı, hızlı ve derin nefes alma, uyku hali veya nefesinizde olağandışı bir meyve kokusu oluşması sayılabilir.
- Eğer daha önce diyabetik bir koma geçirdiyse.
- Akciğerinizi veya bronş sisteminizi veya böbreğinizi etkileyen bir enfeksiyon gibi ciddi bir enfeksiyonunuz varsa. Şiddetli enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu da sizi laktik asidoz riskine sokabilir (bkz. "Uyarılar ve önlemler").
- Vücudunuzdan çok fazla su kaybettiyse (dehidratasyon), örneğin uzun süreli veya şiddetli ishal nedeniyle veya arka arkaya birkaç kez kustuyorsa. Dehidratasyon, sizi laktik asidoz riskine sokabilecek böbrek sorunlarına yol açabilir (bkz. "Uyarılar ve önlemler").
- Akut kalp yetmezliği tedavisi görüyorsanız veya yakın zamanda kalp krizi geçirdiyse, dolaşımınızla ilgili ciddi sorunlarınız varsa (şok gibi) veya solunum güçlüğü çekiyorsanız. Bu, sizi laktik asidoz riski altına sokabilecek dokuya oksijen tedarikinde yetersizliğe yol açabilir (bkz. "Uyarılar ve önlemler").
- Karaciğer problemlerinizi varsa.
- Her gün veya sadece ara sıra aşırı derecede alkol alıyorsanız ('Alkollü Jentaducto' bölümüne bakınız).

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse Jentaducto'yu kullanmayınız. Emin değilseniz, bu ilacı almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uyarılar ve önlemler

Jentaducto'yu almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

- Tip 1 diyabetiniz varsa (vücudunuz hiç insülin üretmiyorsa). Jentaducto bu durumu tedavi etmek için kullanılmamalıdır.
- İnsülin veya 'sülfonilüre' olarak bilinen bir anti-diyabetik ilaç alıyorsanız, düşük kan şekerinden (hipoglisemi) kaçınmak için her ikisini de Jentaducto ile birlikte aldığınızda doktorunuz insülin veya sülfonilüre dozunuzu azaltmak isteyebilir.
- Pankreas hastalığınız varsa veya olduysa.

Kalıcı, şiddetli karın ağrısı gibi akut pankreatit semptomlarınız varsa, doktorunuza danışmalısınız.

Deride kabarma ile karşılaşırsanız, bu büllöz pemfigoid adı verilen bir durumun işareti olabilir. Doktorunuz Jentaducto'yu durdurmanızı isteyebilir.

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, Jentaducto'yu almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

Diyabetik cilt problemleri diyabetin yaygın bir komplikasyonudur. Doktorunuz veya hemşireniz tarafından verilen cilt ve ayak bakımı önerilerine uymanız önerilir.

Laktik asidoz riski.

Metformin bileşeni nedeniyle Jentaducto, özellikle böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa, laktik asidoz adı verilen çok nadir fakat çok ciddi bir komplikasyona neden olabilir. Kontrolsüz diyabet, ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık veya alkol alımı, dehidratasyon (aşağıdaki daha fazla bilgiye bakınız), karaciğer sorunları ve vücudun bir bölümünün oksijen arzının azaldığı herhangi bir tıbbi durum ile laktik asidoz gelişme riski de artar (Akut şiddetli kalp hastalığı gibi).

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, daha fazla talimat için doktorunuzla konuşun.

Dehidratasyon ile ilişkili olabilecek bir durumunuz varsa Jentaducto'yu kısa süreliğine kullanmayı bırakın.(Şiddetli kusma, ishal, ateş, sıcağa maruz kalma veya normalden daha az sıvı içme gibi önemli vücut sıvıları kaybı). Daha fazla talimat için doktorunuzla konuşun.

Laktik asidoz semptomlarından bazılarını yaşıyorsanız, Jentaduetu'yu kullanmayı bırakın ve derhal bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun., çünkü bu durum komaya neden olabilir.

Laktik asidoz belirtileri şunları içerir:

- kusma
- mide ağrısı (karın ağrısı)
- kas krampları
- şiddetli yorgunlukla birlikte genel olarak iyi olmama hissi
- nefes almakta zorlanma
- düşük vücut ısısı ve kalp atışı

Laktik asidoz tıbbi bir acil durumdur ve hastanede tedavi edilmelidir.

Büyük bir ameliyat geçirmeniz gerekiyorsa, işlem sırasında ve işlemden sonra bir süre Jentaduetu almayı bırakmalısınız. Jentaduetu ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Jentaduetu ile tedavi sırasında, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez veya yaşlıysanız ve/veya böbrek fonksiyonunuz kötüleşiyorsa daha sık kontrol edecektir.

Çocuklar ve ergenler

Bu ilacın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılması önerilmez.

Diğer ilaçlar ve Jentaduetu

Örneğin bir röntgen veya tarama sırasında kan dolaşımınıza iyot içeren bir kontrast madde enjeksiyonu yaptırmanız gerekiyorsa, enjeksiyondan önce veya enjeksiyon sırasında Jentaduetu'yu almayı bırakmalısınız. Jentaduetu ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Daha sık kan şekeri ve böbrek fonksiyon testlerine ihtiyacınız olabilir veya doktorunuzun Jentaduetu dozunu ayarlaması gerekebilir. Aşağıdakilerden bahsetmek özellikle önemlidir:

- idrar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler).
- ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksib gibi NSAID ve COX-2 inhibitörleri).
- Yüksek kan basıncının tedavisi için bazı ilaçlar (ACE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri).
- Özellikle böbrek fonksiyonunuzda azalma varsa, kanınızdaki metformin miktarını değiştirebilecek ilaçlar (verapamil, rifampisin, simetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, isavukonazol, crizotinib, olaparib gibi).
- karbamazepin, fenobarbital veya fenitoin. Bunlar, nöbetleri (nöbetleri) veya kronik ağrıyı kontrol etmek için kullanılabilir.
- rifampisin. Bu, tüberküloz gibi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir.
- Astım ve artrit gibi iltihap içeren hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler).
- bronşiyal astım tedavisi için bronkodilatörler (β -sempatomimetikler).
- alkol içeren ilaçlar.

Alkollü Jentaduetu

Jentaduetu alırken aşırı alkol alımından kaçının çünkü bu laktik asidoz riskini artırabilir (bkz. "Uyarılar ve önlemler" bölümü).

Hamilelik ve emzirme

Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz Jentaduetu'yu kullanmamalısınız. Bu ilacın doğmamış çocuğa zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.

Metformin küçük miktarlarda insan sütüne geçer. Linagliptinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu ilacı alırken emzirmek istiyorsanız doktorunuzla konuşun.

Araç ve makine kullanma

Jentaduetu'nun araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

Bununla birlikte, Jentaduetu'yu sülfonilüreler adı verilen ilaçlarla veya insülinle birlikte almak, kan şekeri düzeyinin çok düşük olmasına (hipoglisemi) neden olabilir, bu da araç ve makine kullanma ya da güvenli dayanak olmadan çalışma yeteneğinizi etkileyebilir.

3. Jentaduetu nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ne kadar alınır

Alacağınız Jentaduetu miktarı, durumunuza ve halihazırda aldığınız metformin ve/veya linagliptin ve metformin tabletlerinin dozuna bağlı olarak değişir. Doktorunuz size tam olarak bu ilacın dozunu söyleyecektir.

Bu ilaç nasıl alınır

- Doktorunuz tarafından reçete edilen dozda ağızdan günde iki kez bir tablet.
- mide rahatsızlığı olasılığını azaltmak için yemeklerle birlikte.

Önerilen maksimum günlük 5 mg linagliptin ve 2.000 mg metformin hidroklorür dozunu aşmamalısınız.

Jentaduetu'yu doktorunuz reçete ettiği sürece almaya devam edin, böylece kan şekerinizi kontrol etmeye devam edebilirsiniz. Doktorunuz bu ilacı başka bir oral anti-diyabetik ilaç veya insülin ile birlikte reçete edebilir. Sağlığınız için en iyi sonuçları elde etmek için tüm ilaçları doktorunuzun önerdiği şekilde almayı unutmayın.

Jentaduetu ile tedavi sırasında diyetinize devam etmeli ve karbonhidrat alımınızın gün içine eşit dağılmasına özen göstermelisiniz. Fazla kilonuz varsa, enerji kısıtlı diyetinize talimat verildiği şekilde devam edin. Bu ilacın tek başına anormal derecede düşük kan şekere (hipoglisemi) neden olması olası değildir. Jentaduetu bir sülfonilüre ilacı veya insülin ile birlikte kullanıldığında kan şekeri düşebilir ve doktorunuz sülfonilüre veya insülininizin dozunu azaltabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Jentaduetu kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Jentaduetu tablet alırsanız, laktik asidoz yaşayabilirsiniz. Laktik asidozun semptomları, kendini çok hasta hissetme veya çok hasta olma, kusma, kas krampları ile birlikte karın ağrısı, şiddetli yorgunluk ile birlikte genel bir iyi olmama hissi ve nefes almada zorluk gibi spesifik değildir. Diğer semptomlar vücut ısısında ve kalp atışında azalmadır. **Bu size olursa, laktik asidoz komaya yol açabileceğinden, acil hastanede tedavi görmeniz gerekebilir. Bu ilacı hemen almayı bırakın ve hemen bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun (bkz. Bölüm 2). İlaç paketini yanınıza alın.**

Jentaduetu'yu kullanmayı unutursanız

Bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırılan dozu atlayın. Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Asla aynı anda (sabah veya akşam) iki doz almayınız.

Jentaduetu'yu kullanmayı bırakırsanız

Doktorunuz size bırakmanızı söyleyene kadar Jentaduetu'yu almaya devam edin. Bu, kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olmak içindir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Bazı belirtiler acil tıbbi müdahale gerektirir

Aşağıdaki düşük kan şekeri (hipoglisemi) semptomlarını yaşarsanız, Jentaduetu'yu kullanmayı bırakmalı ve hemen doktorunuzu görmelisiniz: titreme, terleme, kaygı, bulanık görme, dudaklarda karıncalanma, solgunluk, ruh hali değişikliği veya kafa karışıklığı. Hipoglisemi (sıklık çok yaygın (10 kişide 1'den fazlasını etkileyebilir)), Jentaduetu artı sülfonilüre kombinasyonu ve Jentaduetu artı insülin kombinasyonu için tanımlanmış bir yan etkidir.

Jentaduetu çok nadir (10.000'de 1 kullanıcıyı etkileyebilir), ancak laktik asidoz adı verilen çok ciddi bir yan etkiye neden olabilir (bkz. 'Uyarılar ve önlemler' bölümü). Bu olursa, yapmalısınız **Jentaduetu'yu kullanmayı bırakın ve hemen bir doktor veya en yakın hastane ile iletişime geçin.** laktik asidoz komaya yol açabileceğinden.

Bazı hastalarda pankreas iltihabı görülmüştür (pankreatit; sıklığı nadirdir, 1000 kişiden 1'ini etkileyebilir).

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, Jentaduetu'yu kullanmayı DURDURUN ve hemen bir doktora başvurun:

- Karında (mide bölgesinde) şiddetli ve kalıcı ağrı, sırtınıza kadar ulaşabilir, ayrıca mide bulantısı ve kusma, pankreas iltihabının (pankreatit) belirtisi olabilir.

Jentaduetu'nun diğer yan etkileri şunlardır:

Bazı hastalarda, hırıltı ve nefes darlığı (bronşiyal hiperreaktivite; sıklık yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini etkileyebilir) dahil olmak üzere ciddi olabilen alerjik reaksiyonlar (seyrek sıklık) görülmüştür. Bazı hastalarda döküntü (yaygın olmayan), kurdeşen (ürtiker; seyrek görülen) ve yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda nefes alma veya yutma güçlüğüne neden olabilen şişlik (anjioödem; seyrek olarak) görülmüştür. Yukarıda bahsedilen hastalık belirtilerinden herhangi birini yaşarsanız, Jentaduetu'yu kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın. Doktorunuz alerjik reaksiyonunuzu tedavi etmek için bir ilaç ve diyabetiniz için farklı bir ilaç reçete edebilir.

Jentaduetu alırken bazı hastalarda aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:

- Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir): ishal, kan enzimlerinde artış (lipaz artışı), hasta hissetme (bulantı)
- Yaygın olmayan: burun veya boğaz iltihabı (nazofarenjit), öksürük, iştahsızlık (iştah azalması), hasta olma (kusma), kan enzimlerinde artış (amilaz artışı), kaşıntı (kaşıntı)
- Seyrek: deride kabarma (büllöz pemfigoid)

Jentaduetu'yu insülin ile birlikte alırken bazı hastalar aşağıdaki yan etkileri yaşamıştır:

- Yaygın olmayan: Karaciğer fonksiyon bozuklukları, kabızlık

Jentaduetu için tarif edilmeyen, tek başına metformin alırken yan etkiler:

- Çok yaygın: Karın ağrısı
- Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir): metalik bir tat (tat bozukluğu).
- Çok seyrek (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir): B vitamininde azalma²düzeyleri, hepatit (karaciğerinizle ilgili bir sorun), ciltte kızarıklık olarak cilt reaksiyonu (eritem).

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki yaşıyorsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan da bildirebilirsiniz (aşağıdaki ayrıntılara bakın). Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Sarı Kart Şeması

Web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcard veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kartını arayın

5. Jentaduetto nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

EXP'den sonra bu ilacı blister, şişe ve karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Bu ilaç herhangi bir özel sıcaklıkta saklama koşulları gerektirmez.

Kabarcık: Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Şişe: Nemden korumak için şişeyi sıkıca kapalı tutun.

Ambalaj hasarlıysa veya kurcalanma belirtileri gösteriyorsa bu ilacı kullanmayın.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınıza eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Jentaduetto'nun içeriği

- Aktif maddeler linagliptin ve metformin hidroklorürdür.
- Her Jentaduetto 2.5 mg/850 mg film kaplı tablet, 2.5 mg linagliptin ve 850 mg metformin hidroklorür içerir.
- Her Jentaduetto 2.5 mg/1.000 mg film kaplı tablet, 2.5 mg linagliptin ve 1.000 mg metformin hidroklorür içerir.
- Diğer maddeler şunlardır:
 - Tablet çekirdeği: arginin, kopovidon, magnezyum stearat, mısır nişastası, silika, koloidal susuz.
 - Film kaplama: hipromelloz, titanyum dioksit (E171), talk, propilen glikol. Jentaduetto 2.5 mg/850 mg film kaplı tabletler ayrıca demir oksit kırmızısı (E172) ve demir oksit sarısı (E172) içerir.

Jentaduetto 2.5 mg/1.000 mg film kaplı tabletler ayrıca kırmızı demir oksit (E172) içerir.

Jentaduetto neye benziyor ve paketin içeriği

Jentaduetto 2.5 mg/850 mg oval, bikonveks, açık turuncu, film kaplı tabletlerdir (tabletler). Bir tarafında "D2/850", diğer tarafında ise Boehringer Ingelheim logosu işlenmiştir.

Jentaduetto 2.5 mg/1.000 mg oval, bikonveks açık pembe film kaplı tabletlerdir (tabletler). Bir tarafında "D2/1000", diğer tarafında ise Boehringer Ingelheim logosu işlenmiştir.

Jentaduetto, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 ve 120 ile delikli birim dozlu blisterlerde mevcuttur. x 1 film kaplı tablet ve aşağıdakileri içeren çoklu ambalajlar:

120 x 1 (2 paket 60 x 1), 180 x 1 (2 paket 90 x 1), 180 x 1 (3 paket 60 x 1) ve 200 x 1 (2 paket 100 x 1) film kaplı tabletler.

Jentaducto ayrıca plastik vidalı kapaklı ve silika jel kurutuculu plastik şişelerde de mevcuttur. Şişeler 14, 60 veya 180 film kaplı tablet içerir.

Ülkenizde tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Almanya

Üretici firma

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Almanya

Boehringer Ingelheim Hellas Tek Üye SA 5th
km Paiania – Markopoulo
Koropi Attiki, 19441

Yunanistan

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstrasse 1
84529 Göğüs Dekoltesi
Almanya

Bu ilala ilgili herhangi bir bilgi iin ltfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisiyle iletiřime gein:

Birleřik Krallık

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Bu brořur en son 02/2022'de revize edilmiřtir.

*Ek Bilgi: Boehringer
Ingelheim logosu*