Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

عنوانURL لهذه الصفحة: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611003.html

حقنLiraglutide

تنطقباسم (lir 'a gloo' tide)

تحذيرهام:

قديزيد حقن Liraglutide من خطر الإصابة بأورام الغدة الدرقية ، بما في ذلك سرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC ؛ نوعمن سرطان الغدة الدرقية). أصيبت حيوانات المختبر التي أعُطيت الليرلوتيد بأورام ، لكن من غير المعروف ما إذا كانهذا الدواء يزيد من خطر الإصابة بالأورام لدى البشر. أخبر طبيبك إذا كنت أنت أو أي شخص في عائلتك مصاباً أو سبقأن أصبت بـ MTC أو متلازمة الورم الصماوي المتعدد من النوع 2 (MEN 2 ؛ حالة تسبب أوراماً في أكثر من غدة فيالجسم). إذا كان الأمر كذلك ، فمن المحتمل أن يخبرك طبيبك بعدم استخدام حقن ليراجلوتيد. إذا واجهت أياً من الأعراضالتالية ، فاتصل بطبيبك على الفور: تورم أو تورم في الرقبة ؛ بحة في الصوت؛ صعوبة في البلع أو ضيق في التنفس.

احتفظبجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. قد يطلب طبيبك اختبارات معينة للتحقق من استجابة جسمك لحقن الليراجلوتيد.

سيعطيكطبيبك أو الصيدلي ورقة معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة (دليل الدواء) عندما تبدأ العلاج بحقناليراجلوتيد وفي كل مرة تقوم فيها بإعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك. اقرأ المعلومات بعناية واسأل طبيبكأو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة. يمكنك أيضاً زيارة موقع إدارة الغذاء والدواء (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm[أو موقع الشركة المصنعة للحصول على دليل الدواء.

تحدثإلى طبيبك حول مخاطر استخدام حقن ليراجلوتيد.

لماذاوصف هذا الدواء؟

يتماستخدام حقن (Victoza(Liraglutide مع نظام غذائي وبرنامج تمارين للتحكم في مستويات السكر في الدم لدى البالغينوالأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق المصابين بداء السكري من النوع 2 (حالة لا يستخدم فيها الجسم الأنسولينبشكل طبيعي وبالتالي لا يستطيع التحكم في كمية السكر في الدم) عندما لا تتحكم الأدوية الأخرى في المستويات بشكلجيد بما فيه الكفاية. يستخدم حقن (Victoza(Liraglutide أيضاً لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاةلدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية. لا يتم استخدام حقن (Victoza(Liraglutide لعلاج مرض السكري من النوع 1 (الحالة التي يكون فيها الجسم

لاينتج الأنسولين وبالتالي لا يمكنه التحكم في كمية السكر في الدم) أو الحماض الكيتوني السكري (حالة خطيرة قد تتطور إذا لميتم علاج ارتفاع نسبة السكر في الدم) عند البالغين. يتم استخدام حقن)Saxenda(Liraglutide جنباً إلى جنب مع نظام غذائيمنخفض السعرات الحرارية وخطة تمارين لمساعدة بعض البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق والذينيزنون 132 رطلاً(60 كجم) أو أكثر والذين يعانون من السمنة أو الذين يعانون من زيادة الوزن والوزن- المشاكل الطبية المتعلقةبإنقاص الوزن وعدم اكتسابه مرة أخرى. لا يستخدم حقن)Saxenda(Liraglutide لعلاج مرض السكري من النوع 2.يوجد حقن Liraglutide في فئة من الأدوية تسمى محاكيات incretin. وهو يعمل عن طريق مساعدة البنكرياس على إفرازالكمية المناسبة من الأنسولين عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة. يساعد الأنسولين على نقل السكر من الدمإلى أنسجة الجسم الأخرى حيث يتم استخدامه للطاقة. يؤدي حقن Liraglutide أيضاً إلى إبطاء إفراغ المعدة وقد يقلل الشهيةويسبب فقدان الوزن.

بمرورالوقت ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم أن يصابوا بمضاعفات خطيرة أوتهدد الحياة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى وتلف الأعصاب ومشاكل العين. قد يساعد استخدامالأدوية ، وإجراء تغييرات في نمط الحياة (مثل النظام الغذائي ، والتمارين الرياضية ، والإقلاع عن التدخين) ، وفحصنسبة السكر في الدم بانتظام في إدارة مرض السكري وتحسين صحتك. قد يقلل هذا العلاج أيضاً من فرص الإصابة بنوبةقلبية أو سكتة دماغية أو غيرها من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري مثل الفشل الكلوي وتلف الأعصاب (خدر أو برودةالساقين أو القدمين ؛ انخفاض القدرة الجنسية لدى الرجال والنساء) ، مشاكل في العين ، بما في ذلك التغييرات أو فقدانالبصر أو أمراض اللثة. سيتحدث معك طبيبك ومقدمو الرعاية الصحية الآخرون حول أفضل طريقة لإدارة مرض السكريالخاص بك.

فكيفيستعمل هذا الدواء؟

يأتيحقن Liraglutide كمحلول (سائل) في قلم جرعات مملوء مسبقاً للحقن تحت الجلد (تحت الجلد) في معدتك أو فخذكأو ذراعك العلوي. عادة ما يتم حقنها مرة واحدة في اليوم مع أو بدون طعام. استخدم حقن الليراجلوتيد في نفس الوقتتقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرحأي جزء لا تفهمه. استخدم حقن الليراجلوتيد تماماً وفقاً للتوجيهات. لا تستخدم أكثر أو أقل منه أو تستخدمه أكثر مما وصفهطبيبك.

منالمحتمل أن يبدأ طبيبك بجرعة منخفضة من حقن ليراجلوتيد ويزيد جرعتك بعد أسبوع واحد.

يتحكمحقن)Victoza(Liraglutide في مرض السكري ولكنه لا يعالجه. استمر في استخدام حقن ليراجلوتيد حتى لو كنت تشعرجيداً. لا تتوقف عن استخدام حقن ليراجلوتيد دون التحدث مع طبيبك.

إذاكنت بالغاً تستخدم حقن الليراجلوتيد (ساكسندا) لفقدان الوزن ولم تفقد قدراً معيناً من الوزن بعد 16 أسبوعاً من العلاج ، فمنغير المحتمل أن تستفيد من استخدام هذا الدواء. إذا كنت تبلغ من العمر 12 عاماً أو أكبر باستخدام حقن الليراجلوتايد (ساكسندا) ولم تفقد قدراً معيناً من الوزن بعد 12 أسبوعاً من جرعة الصيانة ، فمن غير المحتمل أن تستفيد من استخدام هذا الدواء.قد يخبرك طبيبك بالتوقف عن استخدام حقن ليراجلوتايد (ساكسندا) إذا لم تفقد وزنك الكافي خلال الأسابيع الأولى من العلاج.

سوفتحتاج إلى شراء الإبر بشكل منفصل. اسأل طبيبك أو الصيدلي عن نوع الإبر التي ستحتاجها لحقن الدواء. تأكد من قراءةوفهم تعليمات الشركة المصنعة لحقن الليرلوتيد باستخدام القلم. تأكد أيضاً من أنك تعرف كيف ومتى تقوم بإعداد قلمجديد ، وماذا تفعل إذا أسقطت قلمك. إذا كنت أعمى أو لديك ضعف في البصر ولا يمكنك قراءة الجرعة

العدادعلى القلم ، لا تستخدم هذا القلم دون مساعدة. اطلب من طبيبك أو الصيدلي أن يوضح لك كيفية استخدام القلم. اتبع التعليماتبعناية.

انظردائماً إلى محلول liraglutide الخاص بك قبل حقنه. يجب أن يكون واضحاً وعديم اللون وخالياً من الجزيئات. لا تستخدماللیرلوتید إذا كان ملوناً ، أو عكراً ، أو سميكاً ، أو يحتوي على جزيئات صلبة ، أو إذا انقضى تاريخ انتهاء الصلاحيةعلى الزجاجة.

لاتقم أبداً بإعادة استخدام الإبر ولا تشارك الإبر أو الأقلام أبداً. احرص دائماً على إزالة الإبرة مباشرة بعد حقن جرعتك. تخلص منالإبر في وعاء مقاوم للثقب. اسأل طبيبك أو الصيدلي عن كيفية التخلص من الحاوية المقاومة للثقب.

اطلبمن الصيدلي أو الطبيب الحصول على نسخة من معلومات الشركة المصنعة للمريض.

هناكاستخدامات لهذا الدواء

يمكنوصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعةالاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبلاستخدام حقن ليراجلوتيد ،

- أخبرطبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الليراجلوتيد أو أي أدوية أخرى أو أي من مكونات حقن الليرلوتيد. اسألالصيدلي أو تحقق من دليل الأدوية للحصول على قائمة بالمكونات.

- أخبرطبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبيةالتي تتناولها أو تخطط لتناولها. من المهم بشكل خاص أن تخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها عن طريق الفملأن الليرلوتيد قد يغير طريقة امتصاص جسمك لهذه الأدوية. أخبر طبيبك أيضاً عن مقلدات الإنكريتين الأخرى مثل ألبيجلوتيد(تانزيوم ؛ لم يعد متاحاً في الولايات المتحدة) دولاجلوتايد (تروليسيتي) أو إكسيناتيد (بيدوريون ، بييتا) أو ليكسيسيناتيد(أدليكسين ، في سوليكوا) ، أو سيماجلوتايد (أوزيمبيك) ؛ الأنسولين. أو الأدوية الفموية لمرض السكري ، مثلالسلفونيل يوريا ، بما في ذلك كلوربروباميد ، جليمبيريد (أماريل ، في دويتاكت) ، غليبيزيد (جلوكوترول) ، غليبوريد (ديابيتا ،جلينياز) ، تولازاميد ، وتولبوتاميد.

- أخبرطبيبك إذا كنت تشرب أو شربت كميات كبيرة من الكحول في أي وقت مضى ، إذا كنت قد عانيت من الاكتئاب أو سبقلك التفكير في الانتحار أو محاولة الانتحار ، وتغيرات في السلوك ، والتهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) ؛ مشاكل شديدةفي المعدة ، بما في ذلك خزل المعدة (تباطؤ حركة الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة) ، مشاكل في هضم الطعام ؛ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية (الدهون) في الدم. حصوات في المرارة (رواسب صلبة تتشكل في المرارة) ؛ أو أمراضالمرارة والكلى أو الكبد. أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت قد عانيت مؤخراً من الإسهال أو الغثيان أو القيء أو إذا كنت لا تستطيعشرب السوائل عن طريق الفم ، مما قد يسبب الجفاف (فقدان كمية كبيرة من سوائل الجسم).

- أخبرطبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو مرضعة. إذا كنت حاملاً ، يجب ألا تستخدم حقن ليراجلوتايد (ساكسندا) لفقدانالوزن. إذا أصبحت حاملاً أثناء استخدام حقن الليراجلوتيد (فيكتوزا) ، فاتصل بطبيبك.

- اسألطبيبك عما يجب أن تفعله إذا مرضت ، أو أصبت بعدوى أو حمى ، أو تعرضت لضغط غير عادي ، أو تعرضت للإصابة.يمكن أن تؤثر هذه الحالات على نسبة السكر في الدم وكمية الليراجلوتيد التي قد تحتاجها.

قبعةتعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

تأكدمن اتباع جميع التمارين والتوصيات الغذائية التي قدمها طبيبك أو اختصاصي التغذية.

قبعةيجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

احقنالجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان وقت الجرعة التالية تقريباً ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعاتالمعتاد. لا تحقن جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة. إذا نسيت استخدام حقن ليراجلوتيد لمدة 3 أيام أو أكثر ، فاتصلبطبيبك.

الآثارالجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قديسبب هذا الدواء تغيرات في نسبة السكر في الدم. يجب أن تعرف أعراض انخفاض السكر في الدموارتفاعه وماذا تفعل إذا كانت لديك هذه الأعراض.

قديسبب حقن Liraglutide آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدةأو لا تختفي:

- صداعالراس
- إمساك
- حرقةمن المعدة
- سيلانالأنف أو العطس أو السعال
- تعب
- صعوبةفي التبول أو ألم أو حرقان عند التبول
- طفحجلدي أو احمرار في موقع الحقن

بعضالآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أياً من هذه الأعراض أو تلك المذكورة في قسمالتحذير الهام أو التحذيرات الخاصة ، فتوقف عن استخدام حقن الليرلوتيد واتصل بطبيبك علىالفور:

- ألممستمر يبدأ في الجزء العلوي الأيسر أو منتصف المعدة ولكنه قد ينتشر إلى الظهر
- اكتئابجديد أو متفاقم
- التفكيرفي إيذاء نفسك أو قتلها
- تغيراتغير عادية في المزاج أو السلوك
- التقيؤ
- غثيان
- إسهال
- برازبلون الطين
- عيونصفراء أو الجلد
- توطيدالقلب
- الإغماءأو الشعور بالدوار
- تورمفي العين أو الوجه أو الفم أو اللسان أو الحلق
- متسرع

- متلهف،متشوق
- صعوبةفي التنفس أو البلع

قديسبب حقن Liraglutide آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء استخدام هذا الدواء.

إذاكنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرةعبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
([http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[) أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبعةيجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظبهذا الدواء في الحاوية التي دخل فيها وبعيداً عن متناول الأطفال. احفظه بعيداً عن الضوء والحرارة. قم بتخزين أقلام liraglutide غيرالمستخدمة في الثلاجة (36 درجة فهرنهايت إلى 46 درجة فهرنهايت [2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية]) ولكن لا تضعها بالقرب منعنصر تبريد الثلاجة. بمجرد استخدام قلم liraglutide ، قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة (59 درجة فهرنهايت إلى 86 درجة فهرنهايت [15 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية]) أو في الثلاجة. لا تجمد. لا تستخدم الليرلوتيد إذا تم تجميده أو تعرضه لدرجات حرارة أعلى من 86 درجةفهرنهايت (30 درجة مئوية). احتفظ بغطاء قلم liraglutide عندما لا يكون قيد الاستخدام.

عندالسفر ، تأكد من إبقاء أقلام الليرلوتيد جافة وفي درجة حرارة تتراوح بين 59 درجة فهرنهايت إلى 86 درجة فهرنهايت (15 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية).

قمبتدوين تاريخ استخدامك لقلم liraglutide لأول مرة ، وتخلص من القلم بعد 30 يوماً ، حتى إذا كان هناك بعض المحلولالمتبقي في القلم.

منالمهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريماتوالبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار منالتسمم ، قم دائماً بإغلاق أغطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم.[http://www.upandaway.org]http://www.upandaway.org

يجبالتخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين منتناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المرحاض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويتك هي منخلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف علىبرامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء ([http://goo.gl/c4Rm4p]http://goo.gl/c4Rm4p) لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

نحالة طارئة / جرعة زائدة

فيحالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنتعلى[https://www.poisonhelp.org/help]https://www.poisonhelp.org/help. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ،أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قدتشمل أعراض الجرعة الزائدة ما يلي:

- غثيانشديد
- قيءشديد

قبعةمعلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

إذاكنت تستخدم حقن)Victoza(liraglutide لعلاج مرض السكري ، فيجب فحص نسبة السكر في الدم والهيموغلوبينالغليكوزيلاتي (HbA1c) بانتظام لتحديد استجابتك لهذا الدواء. سيخبرك طبيبك أيضاً بكيفية التحقق مناستجابتك لحقن الليراجلوتيد عن طريق قياس مستويات السكر في الدم في المنزل. اتبع هذه التعليمات بعناية.

إذاكنت تستخدم حقن الليراجلوتيد (ساكسندا) للتحكم في الوزن ، فسيتم فحص معدل ضربات القلب والوزن بانتظام أثناء العلاج.

لاتدع أي شخص يستخدم الدواء الخاص بك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

منالمهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلىأي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرةتزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماءراند

- ساكسندا®
- فيكتوزا®
- Xultophy®(كمنتج تركيبي يحتوي على الأنسولين ديجلوديك وليراجلوتيد)

آخرمراجعة - 15/02/2021

تعلمكيفية الاستشهاد بهذه الصفحة

إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة.الازدواجية ، 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland. للاستخدامالتجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبةالوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهدالوطنية للصحة

آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022