Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611003.html

利拉鲁肽注射液

发音为 (lir'' a gloo' 潮)

重要警告：

利拉鲁肽注射液可能会增加您患甲状腺肿瘤的风险，包括甲状腺髓样癌（MTC；一种甲状腺癌）。给予利拉鲁肽的实验动物出现了肿瘤，但尚不清楚这种药物是否会增加人类患肿瘤的风险。如果您或您家中的任何人患有或曾经患有 MTC 或多发性内分泌肿瘤综合征 2 型（MEN 2；导致体内多个腺体出现肿瘤的疾病），请告诉您的医生。如果是这样，您的医生可能会告诉您不要使用利拉鲁肽注射液。如果您出现以下任何症状，请立即就医： 颈部肿块或肿胀；嘶哑; 吞咽困难；或呼吸急促。

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些测试，以检查您的身体对利拉鲁肽注射液的反应。

当您开始使用利拉鲁肽注射液进行治疗以及每次重新配药时，您的医生或药剂师都会为您提供制造商的患者信息表（药物指南）。仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。您也可以访问美国食品和药物管理局 (FDA) 网站

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 或制造商的网站获取用药指南。

与您的医生讨论使用利拉鲁肽注射液的风险。

为什么要开这种药?

利拉鲁肽注射液 (Victoza) 与饮食和锻炼计划一起使用，以控制成人和 10 岁及以上患有 2 型糖尿病（身体不能正常使用胰岛素，因此无法控制摄入量）的儿童的血糖水平。血液中的糖分）当其他药物不能很好地控制水平时。利拉鲁肽注射液 (Victoza) 还用于降低患有 2 型糖尿病和心脏和血管疾病的成人心脏病发作、中风或死亡的风险。利拉鲁肽注射液 (Victoza) 不用于治疗 1 型糖尿病（其中身体

不产生胰岛素，因此无法控制血液中的糖含量）或成人糖尿病酮症酸中毒（如果不治疗高血糖可能会发生的严重疾病）。利拉鲁肽注射液 (Saxenda) 与低热量饮食和锻炼计划一起使用，以帮助体重 132 磅（60 公斤）或以上、肥胖或超重且体重超过 132 磅（60 公斤）的某些成年人和 12 岁及以上儿童相关的医疗问题，以减轻体重并防止体重反弹。利拉鲁肽注射液（Saxenda）不用于治疗 2 型糖尿病。利拉鲁肽注射液属于一类称为肠促胰岛素模拟物的药物。它通过帮助胰腺在血糖水平高时释放适量的胰岛素而起作用。胰岛素有助于将糖从血液中转移到其他身体组织中，在那里它被用作能量。利拉鲁肽注射液还会减缓胃排空，可能会降低食欲并导致体重减轻。

随着时间的推移，患有糖尿病和高血糖的人可能会出现严重或危及生命的并发症，包括心脏病、中风、肾脏问题、神经损伤和眼部问题。使用药物、改变生活方式（例如饮食、锻炼、戒烟）以及定期检查血糖可能有助于控制糖尿病并改善健康。这种疗法还可以降低您患心脏病、中风或其他糖尿病相关并发症的机会，例如肾衰竭、神经损伤（麻木、腿或脚冰冷；男性和女性的性能力下降）、眼部问题，包括变化或视力丧失，或牙龈疾病。您的医生和其他医疗保健提供者将与您讨论管理糖尿病的最佳方法。

这个药应该怎么用？

利拉鲁肽注射液以预填充剂量笔中的溶液（液体）形式在您的胃、大腿或上臂皮下（皮下）注射。它通常每天注射一次，有或没有食物。每天大约在同一时间使用利拉鲁肽注射液。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示使用利拉鲁肽注射液。不要使用或多或少地使用它，或者使用它比医生规定的更频繁。

您的医生可能会开始给您注射低剂量的利拉鲁肽，并在 1 周后增加您的剂量。

利拉鲁肽注射液（Victoza）控制糖尿病，但不能治愈它。即使您感觉良好，也要继续使用利拉鲁肽注射液。不要在未咨询医生的情况下停止使用利拉鲁肽注射液。

如果您是使用利拉鲁肽注射液 (Saxenda) 减肥的成年人，并且在治疗 16 周后您没有减轻一定的体重，那么您不太可能从使用这种药物中受益。如果您是 12 岁及以上使用利拉鲁肽注射液 (Saxenda) 的儿童，并且在维持剂量 12 周后您没有减轻一定的体重，那么您不太可能从使用这种药物中受益。如果您在治疗的前几周没有减轻足够的体重，您的医生可能会告诉您停止使用利拉鲁肽注射液 (Saxenda)。

您需要单独购买针头。询问您的医生或药剂师注射药物所需的针头类型。请务必阅读并理解制造商关于使用注射笔注射利拉鲁肽的说明。还要确保您知道如何以及何时设置新笔，以及如果您的笔掉了怎么办。如果您是盲人或视力不佳且无法读取剂量

计数器上的笔，不要在没有帮助的情况下使用这支笔。请您的医生或药剂师向您展示如何使用笔。仔细遵循指示。

在注射之前，请务必查看您的利拉鲁肽溶液。它应该是透明的、无色的、无颗粒的。如果利拉鲁肽有颜色、浑浊、变稠或含有固体颗粒，或者瓶子上的有效期已过，请勿使用。

切勿重复使用针头，切勿共用针头或笔。注射剂量后，请务必立即取出针头。将针头丢弃在防刺穿容器中。询问您的医生或药剂师如何处理防刺穿容器。

向您的药剂师或医生索取患者的制造商信息副本。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在使用利拉鲁肽注射液之前，

- 如果您对利拉鲁肽、任何其他药物或利拉鲁肽注射液中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。请咨询您的药剂师或查看药物指南以获取成分列表。

- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。告诉您的医生您口服的所有药物尤为重要，因为利拉鲁肽可能会改变您的身体吸收这些药物的方式。还要告诉您的医生其他肠促胰岛素模拟物，例如阿必鲁肽（Tanzeum；在美国不再可用）度拉鲁肽（Trulicity）、艾塞那肽（Bydureon、Byetta）、利西拉肽（Adlyxin，在 Soliqua）或索马鲁肽（Ozempic）；胰岛素; 或用于糖尿病的口服药物，例如磺脲类药物，包括氯磺丙脲、格列美脲（Amaryl，在 Duetact 中）、格列吡嗪（Glucotrol）、格列本脲（DiaBeta，Glynase）、妥拉唑胺和甲苯磺丁脲。

- 如果您饮酒或曾经大量饮酒，如果您曾经或曾经患有抑郁症、想过或企图自杀、行为改变、胰腺炎（胰腺发炎），请告诉您的医生；严重的胃病，包括胃轻瘫（食物从胃到小肠的运动减慢），消化食物的问题；血液中甘油三酯（脂肪）含量高；胆结石（胆囊中形成的固体沉积物）；或胆囊、肾脏或肝脏疾病。如果您最近有腹泻、恶心或呕吐，或者您不能口服液体，请告诉您的医生，这可能会导致脱水（大量体液流失）。

- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您怀孕了，则不应使用利拉鲁肽注射液（Saxenda）来减肥。如果您在使用利拉鲁肽注射液 (Victoza) 时怀孕，请致电您的医生。

- 如果您生病、感染或发烧、经历异常压力或受伤，请咨询您的医生该怎么做。这些情况会影响您的血糖和您可能需要的利拉鲁肽量。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

请务必遵循您的医生或营养师提出的所有运动和饮食建议。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即注射错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要注射双倍剂量以弥补错过的剂量。如果您忘记使用利拉鲁肽注射液 3 天或更长时间，请致电您的医生。

这种药物会引起副作用吗？

这种药物可能会导致您的血糖发生变化。您应该知道低血糖和高血糖的症状以及如果您有这些症状该怎么办。

利拉鲁肽注射液可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 头痛
- 便秘
- 胃灼热
- 流鼻涕、打喷嚏或咳嗽
- 疲倦
- 排尿困难或排尿疼痛或灼痛
- 注射部位皮疹或发红

一些副作用可能很严重。如果您遇到这些症状或重要警告或特殊注意事项部分中列出的症状，请停止使用利拉鲁肽注射液并立即致电您的医生：

- 从左上角或胃中部开始的持续疼痛，但可能会扩散到背部
- 新的或恶化的抑郁症
- 考虑伤害或杀死自己
- 情绪或行为的异常变化
- 呕吐
- 恶心
- 腹泻
- 粘土色凳子
- 黄色的眼睛或皮肤
- 心跳加速
- 昏厥或感到头晕
- 眼睛、面部、嘴巴、舌头或喉咙肿胀
- 皮疹

- 瘙痒
- 呼吸或吞咽困难

利拉鲁肽注射液可能会引起其他副作用。如果您在使用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进入的容器中，并放在儿童接触不到的地方。将其存放在远离光和热的地方。将未使用的利拉鲁肽笔存放在冰箱中（36°F 至 46°F [2°C 至 8°C]），但不要将它们放在冰箱冷却元件附近。使用利拉鲁肽笔后，将其储存在室温（59°F 至 86°F [15°C 至 30°C]）或冰箱中。不要冻结。如果利拉鲁肽已被冷冻或暴露于 86°F (30°C) 以上的温度，请勿使用。不使用时，将盖子放在利拉鲁肽笔上。

旅行时，确保利拉鲁肽笔保持干燥，温度在 59°F 至 86°F（15°C 至 30°C）之间。

记下您第一次使用利拉鲁肽笔的日期，并在 30 天后丢弃笔，即使笔中还有一些溶液。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括以下内容：

- 严重恶心
- 剧烈呕吐

我应该知道其他信息吗？

如果您使用利拉鲁肽 (Victoza) 注射剂治疗糖尿病，应定期检查您的血糖和糖化血红蛋白 (HbA1c) 以确定您对这种药物的反应。您的医生还将告诉您如何通过在家中测量血糖水平来检查您对利拉鲁肽注射液的反应。仔细遵循这些指示。

如果您使用利拉鲁肽（Saxenda）注射液进行体重管理，治疗期间将定期检查您的心率和体重。

不要让其他人使用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 萨克森达®
- 维克托萨®
- 狂热®（作为包含德谷胰岛素和利拉鲁肽的组合产品）

最后修订 - 2021 年 2 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日