

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Injeção de Plerixafor

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609018.html>

Injeção de Plerixafor

pronunciado como (pler ix' a fore)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de plerixafor é usada junto com um medicamento de fator estimulante de colônia de granulócitos (G-CSF), como filgrastim (Neupogen) ou pegfilgrastim (Neulasta) para preparar o sangue para um transplante autólogo de células-tronco (procedimento no qual certas células sanguíneas são removidas do corpo e depois devolvido ao corpo após quimioterapia e/ou radioterapia) em pacientes com linfoma não-Hodgkin (LNH; câncer que começa em um tipo de glóbulos brancos que normalmente combate a infecção) ou mieloma múltiplo (um tipo de câncer do osso medula). A injeção de plerixafor está em uma classe de medicamentos chamados mobilizadores de células-tronco hematopoéticas. Funciona fazendo com que certas células sanguíneas se movam da medula óssea para o sangue, para que possam ser removidas para transplante.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de plerixafor vem como um líquido a ser injetado por via subcutânea (sob a pele) por um médico ou enfermeiro em um centro médico. Geralmente é injetado uma vez ao dia, 11 horas antes da remoção das células sanguíneas, por até 4 dias seguidos. O seu tratamento com a injeção de plerixafor começará depois de ter recebido uma medicação G-CSF uma vez por dia durante 4 dias e continuará a receber a medicação G-CSF durante o tratamento com a injeção de plerixafor.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de receber a injeção de plerixafor,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à injeção de plerixafor ou a qualquer outro medicamento.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- Informe o seu médico se você tem ou já teve leucemia (câncer que começa nos glóbulos brancos), um número anormalmente alto de neutrófilos (um tipo de célula sanguínea) ou doença renal.
- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você deve usar controle de natalidade para evitar a gravidez durante o tratamento com injeção de plerixafor. Converse com seu médico

sobre métodos de controle de natalidade que funcionarão para você. Se engravidar enquanto estiver a receber injeção de plerixafor, contacte o seu médico. A injeção de plerixafor pode prejudicar o feto.

- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a receber injeção de plerixafor.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A injeção de plerixafor pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- náusea
- vômito
- dor de estômago
- diarreia
- gás
- tontura
- dor de cabeça
- cansaço excessivo
- dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo
- dor nas articulações
- dor, vermelhidão, dureza, inchaço, irritação, comichão, nódos negros, hemorragia, dormência, formigueiro ou erupção cutânea no local onde a injeção de plerixafor foi injetada

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

- dor na parte superior esquerda do estômago ou no ombro
- hematomas ou sangramentos fáceis
- inchaço ao redor dos olhos
- dificuldade para respirar
- urticária
- desmaio

A injeção de plerixafor pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao receber este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir:

- náusea
- vômito
- dor de estômago
- diarreia
- gás
- tontura ou vertigem
- desmaio

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns exames laboratoriais para verificar a resposta do seu corpo à injeção de plerixafor.

Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre a injeção de plerixafor.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Mozobil®

Última revisão - 01/05/2009

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS® Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação

para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022