Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609018.html

Inyección de plerixafor

pronunciado como (pler ix' a fore)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de plerixafor se usa junto con un factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) como filgrastim (Neupogen) o pegfilgrastim (Neulasta) para preparar la sangre para un trasplante autólogo de células madre (procedimiento en el que se extraen ciertas células sanguíneas del cuerpo y luego regresó al cuerpo después de la quimioterapia y/o radiación) en pacientes con linfoma no Hodgkin (LNH; cáncer que comienza en un tipo de glóbulos blancos que normalmente combate las infecciones) o mieloma múltiple (un tipo de cáncer del hueso médula). La inyección de plerixafor pertenece a una clase de medicamentos llamados movilizadores de células madre hematopoyéticas. Funciona haciendo que ciertas células sanguíneas pasen de la médula ósea a la sangre para que puedan extraerse para el trasplante.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de plerixafor viene en forma de líquido para ser inyectado por vía subcutánea (debajo de la piel) por un médico o enfermera en un centro médico. Por lo general, se inyecta una vez al día, 11 horas antes de la extracción de glóbulos, hasta por 4 días seguidos. Su tratamiento con plerixafor inyectable comenzará después de que haya recibido un medicamento G-CSF una vez al día durante 4 días y continuará recibiendo el medicamento G-CSF durante su tratamiento con plerixafor inyectable.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir la inyección de plerixafor,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la inyección de plerixafor oa cualquier otro medicamento.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido leucemia (cáncer que comienza en los glóbulos blancos), una cantidad anormalmente alta de neutrófilos (un tipo de glóbulo) o enfermedad renal.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Debe usar un método anticonceptivo para evitar el embarazo durante su tratamiento con la inyección de plerixafor. Hable con su médico

sobre los métodos anticonceptivos que funcionarán para usted. Si queda embarazada mientras recibe la inyección de plerixafor, llame a su médico. La inyección de plerixafor puede dañar al feto.

- Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está recibiendo la inyección de plerixafor.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de plerixafor puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- náuseas
- vómitos
- dolor de estómago
- Diarrea
- gas
- mareo
- dolor de cabeza
- cansancio excesivo
- dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido
- dolor en las articulaciones
- dolor, enrojecimiento, dureza, hinchazón, irritación, picazón, moretones, sangrado, entumecimiento, hormigueo o sarpullido en el lugar donde se inyectó la inyección de plerixafor

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato:

- dolor en la parte superior izquierda del estómago o en el hombro
- moretones o sangrado fácil
- hinchazón alrededor de los ojos
- respiración dificultosa
- urticaria
- desmayo

La inyección de plerixafor puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras recibe este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono (1-800-332-1088).

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

- náuseas
- vómitos
- dolor de estómago
- Diarrea
- gas
- mareos o aturdimiento
- desmayo

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la inyección de plerixafor.

Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre la inyección de plerixafor.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Mozobil®

Última revisión - 05/01/2009

Aprende a citar esta página

Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación

para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022