

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602015.html>

לופנאביר וריטונביר

מבוטא כ (ri toe' na veer) (loe pin' a veer)

הודעה:

טרם הוקם. יש מדענים שמאמינים כי תרופות אלו שימשו לטיפול בזיהומים ויראליים דומים ל-COVID-19-לבד או עם תרופות אחרות. השימוש בלופינאביר וריטונביר לטיפול ב (COVID-19) נחקרים כעת במספר מחקרים קליניים מתמשכים לטיפול במחלת נגיף הקורונה Lopinavir i-ritonavir 2019

Lopinavir i-ritonavir ב לטיפול ב COVID-19-צריכים להילקח רק בהנחיית רופא לטיפול ב Lopinavir i-ritonavir.

היי האם נרשמה תרופה זו?

השילוב של lopinavir ו-ritonavir משמש עם תרופות אחרות לטיפול בזיהום בנגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV). Lopinavir ו-ritonavir הם בקבוצה של תרופות הנקראות מעכבי פרוטאז. הם פועלים על ידי הפחתת כמות ה-HIV בדם. כאשר לופינאביר וריטונביר נלקחים יחד, ריטונביר עוזר גם להגדיל את כמות lopinavir בגוף כך שתרופה תהיה השפעה גדולה יותר. למרות שלופינאביר וריטונביר לא ירפאו HIV, תרופות אלו עשויות להפחית את הסיכוי שלך לפתח תסמונת כשל חיסוני נרכש (איידיס) ומחלות הקשורות ל-HIV כגון זיהומים חמורים או סרטן. נטילת תרופות אלו יחד עם תרגול סקס בטוח יותר וביצוע שינויים אחרים באורח החיים עשויים להפחית את הסיכון להעברת נגיף ה-HIV לאנשים אחרים.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

השילוב של lopinavir ו-ritonavir מגיע כטבליה ותמיסה (נוזל) לנטילה דרך הפה. זה נלקח בדרך כלל פעמיים ביום, אך עשוי להילקח פעם ביום על ידי מבוגרים מסוימים. יש ליטול את התמיסה עם אוכל. ניתן ליטול את הטבליות עם או בלי אוכל. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח lopinavir ו-ritonavir בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא.

בלוע את הטבליות בשלמותן; אין לפצל, ללעוס או לכתוש אותם.

(מדרול), מומטזון (בדולרה). פרדניזון (Rayos), וטריאמצינולון; תרופות אנטי-ויראליות אחרות כגון abacavir (Ziagen), ב (Epsicom, Trizivir, אחרות); atazanavir (Reyataz, ב Evotaz), efavirenz, Rescriptor (Sustiva) delavirdine, ב (Atripla-Crixivan), maraviroc) Selzentry, (nelfinavir) Viracept, (nevirapine) Virmune, (ritonavir) Norvir, Kaletra, (tenofovir) Viread, (Atripla, ב Truvada), (Invirase, saquinavir) Aptivus, (tipranavir) וזידובודין (Retrovir, ב Combivir, ב Mycobutin) (rifabutin); Seroquel; (quetiapine); סלמטרול (סרוונט, ב Advair); סילדנפיל (ויאגרה); (Adcirca, Cialis) (tadalafil); וורדנפיל (לויטרה). אם אתה נוטל תמיסת הפה, ספר גם לרופא שלך אם אתה נוטל דיסולפירם (אנטאבוס) או מטרונידזול (Flagyl, בנובסה, בונדאזול).

- אם אתה נוטל דינזון, קח אותו שעה אחת לפני או שתיים לאחר נטילת תמיסת לופינאוויר וריטונאביר עם האוכל. אם אתה נוטל טבליות lopinavir ו-ritonavir, אתה יכול לקחת אותן על בטן ריקה במקביל לנטילת דינזון.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או היה לך אי פעם מרווח QT ממושך (בעיית לב נדירה שעלולה לגרום לקצב לב לא סדיר, התעלפות או מוות פתאומי), דופק לא סדיר, רמה נמוכה של אשלגן בדם, המופיליה, כולסטרול גבוה או טריגליצרידים (שומן) בדם, דלקת לבלב (נפיחות של הלב), או מחלת לב או כבד.
- עליך לדעת כי lopinavir ו-ritonavir עשויים להפחית את היעילות של אמצעי מניעה הורמונליים (גלולות למניעת הריון, מדבקות, טבעות או זריקות). שוחח עם הרופא שלך על שימוש באמצעי מניעה אחר.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן נטילת lopinavir ו-ritonavir, התקשר לרופא שלך. אין להניק אם אתה נגוע ב-HIV או אם אתה נוטל לופינאוויר וריטונאביר.
- עליך לדעת שמרכיבים מסוימים בתמיסת lopinavir ו-ritonavir עלולים לגרום לתופעות לוואי חמורות ומסכנות חיים אצל תינוקות שזה עתה נולדו. אין לתת תמיסת פומי לופנאביר וריטונאביר לתינוקות מלאים מתחת לגיל 14 ימים או לפגים מתחת לגיל 14 ימים לאחר תאריך היעד המקורי שלהם, אלא אם רופא סבור שיש סיבה טובה לכך שהתינוק יקבל את התרופה הנכונה. לאחר הלידה. אם הרופא של תינוק בוחר לתת לתינוק תמיסת lopinavir ו-ritonavir מיד לאחר הלידה, תינוק יהיה במעקב קפדני לאיתור סימנים של תופעות לוואי חמורות. התקשר מיד לרופא של תינוק אם תינוק ישנוני מאוד או שיש לו שינויים בנשימה במהלך הטיפול שלו עם lopinavir ו-ritonavir תמיסת הפה.
- עליך להיות מודע לכך ששומן הגוף שלך עשוי לעלות או לעבור לאזורים שונים בגופך, כגון הגב העליון, הצוואר ("גבנון תאו"), השדיים וסביב הבטן. ייתכן שתבחין באובדן שומן בגוף מהפנים, הרגליים והזרועות שלך.
- עליך לדעת שאתה עלול לחוות היפרגליקמיה (עלייה ברמת הסוכר בדם שלך) בזמן שאתה נוטל תרופה זו, גם אם אין לך עדיין סוכרת. ספר לרופא מיד אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים בזמן שאתה נוטל lopinavir ו-ritonavir: צמא קיצוני, הטלת שתן תכופה, רעב קיצוני, ראייה מטושטשת או חולשה. חשוב מאוד להתקשר לרופא שלך ברגע שיש לך אחד מהתסמינים הללו, מכיוון שסוכר גבוה בדם שאינו מטופל עלול לגרום למצב חמור הנקרא קטואצידוזיס. קטואצידוזיס עלול להפוך לסכנת חיים אם היא לא מטופלת בשלב מוקדם. תסמינים של קטואצידוזיס כוללים: יובש בפה, בחילות והקאות, קוצר נשימה, נשימה עם ריח פירותי וירידה בהכרה.
- עליך לדעת שבזמן שאתה נוטל תרופות לטיפול בזיהום ב-HIV, המערכת החיסונית שלך עלולה להתחזק ולהתחיל להילחם בזיהומים אחרים שכבר היו בגופך. זה עלול לגרום לך לפתח תסמינים של זיהומים אלה. אם יש לך תסמינים חדשים או מחמירים לאחר התחלת טיפול עם lopinavir ו-ritonavir, הקפד לספר לרופא שלך.

האם עלי לפעול לפי הוראות תזונתיות מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

תופעות לוואי של תרופה זו יכולה לגרום?

עלולים לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף Lopinavir 1-ritonavir

- חולשה
- שלשול
- גז
- צרבת
- ירידה במשקל
- כאב ראש
- קושי להירדם או להישאר ישן
- כאב שרירים
- חוסר תחושה, צריבה או עקצוץ בידיים או ברגליים
- כאבי בטן, בחילות והקאות

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא מיד או קבל טיפול רפואי חירום:

- בחילה
- הקאה
- כאב בטן
- עייפות קיצונית
- אובדן תיאבון
- כאב בחלק הימני העליון של הבטן
- הצהבה של העור או העיניים
- עור מגרד
- סחרחורת
- סחרחורת
- התעלפות
- פעימות לב לא סדירות

- שלפוחיות
- פריחה

עלולים לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה 1-ritonavir.
Lopinavir

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן את הטבליות בטמפרטורת החדר והגן עליהן מפני לחות עודפת. עדיף לשמור את הטבליות במיכל שבו הגיעו; אם אתה חייב להוציא אותם מהמיכל, עליך להשתמש בהם תוך שבועיים. אתה יכול לשמור את תמיסת הפה במקרר עד תאריך התפוגה המודפס על התווית, או שאתה יכול לאחסן אותה בטמפרטורת החדר עד חודשיים.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. <http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכנית החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>]) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>]. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

חשוב במיוחד לקבל עזרה רפואית מיד אם ילד שותה יותר מהמינון הרגיל של התמיסה. התמיסה מכילה כמות גדולה של אלכוהול ומרכיבים אחרים שעלולים להזיק מאוד לילד.

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מעבדה מסוימות כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך ל-Lopinavir-1-ritonavir.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד של מוצרים משולבים

- קלטר® (מכיל לופנאביר, ריטונביר)

עדכון אחרון - 15/01/2021

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022