

[Дом](#) → [Лекарства, травы и добавки](#) → Лопинавир и Ритонавир

Source : U.S. National Library of Medicine

URL этой страницы: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602015.html>

Лопинавир и Ритонавир

произносится как (loe pin' a veer) (ri toe' na veer)

Уведомление:

Лопинавир и ритонавир в настоящее время изучаются в нескольких текущих клинических исследованиях по лечению коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) либо отдельно, либо в сочетании с другими лекарствами. Использование лопинавира и ритонавира для лечения COVID-19 еще не установлено. Некоторые ученые полны надежд, потому что эти лекарства использовались для лечения подобных вирусных инфекций.

Лопинавир и ритонавир следует принимать **ТОЛЬКО** по назначению врача для лечения COVID-19.

зачем назначают это лекарство?

Комбинация лопинавира и ритонавира используется с другими лекарствами для лечения инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Лопинавир и ритонавир относятся к классу препаратов, называемых ингибиторами протеазы. Они работают, уменьшая количество ВИЧ в крови. При совместном приеме лопинавира и ритонавира ритонавир также помогает увеличить количество лопинавира в организме, чтобы лекарство имело больший эффект. Хотя лопинавир и ритонавир не лечат ВИЧ, эти лекарства могут снизить вероятность развития синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) и связанных с ВИЧ заболеваний, таких как серьезные инфекции или рак. Прием этих лекарств вместе с более безопасным сексом и другими изменениями в образе жизни может снизить риск передачи вируса ВИЧ другим людям.

Как следует использовать это лекарство?

Комбинация лопинавира и ритонавира выпускается в виде таблеток и раствора (жидкости) для приема внутрь. Обычно его принимают два раза в день, но некоторые взрослые могут принимать один раз в день. Раствор необходимо принимать во время еды. Таблетки можно принимать независимо от приема пищи. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте лопинавир и ритонавир строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте таблетки целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Если вы используете раствор, хорошо встряхивайте его перед каждым использованием, чтобы равномерно смешать лекарство. Используйте мерную ложку или чашку для измерения правильного количества жидкости для каждой дозы, а не обычную бытовую ложку.

Продолжайте принимать лопинавир и ритонавир, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием лопинавира и ритонавира, не посоветовавшись с врачом. Если вы пропустите дозы, примете меньше предписанного количества или прекратите прием лопинавира и ритонавира, ваше состояние может стать более трудным для лечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ЛЕКАРСТВА

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать лопинавир и ритонавир,

- сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на лопинавир, ритонавир (норвир), любые другие лекарства или какие-либо ингредиенты лопинавира и ритонавира в таблетках или растворе. Попросите у фармацевта список ингредиентов.
- сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих препаратов: альфузозин (уруксатрал); апалутамид (Эрлеада); цизаприд (пропульсид) (недоступен в США); колхицин (Colcrys, Mitigare) у людей с заболеваниями почек или печени; дронедарон (Мултак); элбасвир и grazoprevir (Zepatier); лекарства от спорыньи, такие как дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), эрготамин (Ergomar, в Safergot, в Migergot) и метилэргоновин (Methergine); ломитапид (юкстапид); ловастатин (Алтопрев); луразидон (латуда); мидазолам принимают внутрь (Versed); пимозид (Орап); ранолозин (Ранекса); рифампин (Римактан, Рифадин, Рифамат, Рифатер); силденафил (только торговая марка Revatio, используемая при заболеваниях легких); симвастатин (Зокор, Виторин); Зверобой; или триазолам (Halcion).
- Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые добавки вы принимаете. Обязательно упомяните любой из следующих препаратов: антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин, джантовен) и ривароксабан (ксарелто); противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Онмел, Споранокс), изавуконазол (Кресемба), кетоконазол (Низорал) и вориконазол (Вифенд); атоваквон (Мепрон, в Малароне); бедаквилин (Сиртуро); бета-блокаторы; бозентан (траклир); бупропион (Веллбутрин, Зибан и др.); блокаторы кальциевых каналов, такие как фелодипин, никардипин (Карден) и нифедипин (Адалат, Афедитаб CR, Прокардия); препараты для снижения уровня холестерина, такие как аторвастатин (Lipitor, в Caduet) и розувастатин (Crestor); кларитромицин (биаксин, в превпаке); дигоксин (ланоксин); элаголикс (Орилисса); фентанил (Actiq, Duragesic, Onsolis, др.); фосампренавир (Лексива); некоторые лекарства от рака, такие как абемациклиб (Verzenio), дазатиниб (Sprycel), энкорафениб (Braftovi), ибрутиниб (Imbruvica), ивозидениб (Tibsovo), нератиниб (Nerlynx), нилотиниб (Tasigna), венетоклакс (Venclexta), винбластин и винкристин; некоторые лекарства от нерегулярного сердцебиения, такие как амиодарон (Cordarone, Nexterone, Pacerone), бепридил (больше не доступен в США; Vascor), лидокаин (Lidoderm; в Хулосаине с эпинефрином) и хинидин (в Nuedexta); некоторые лекарства от вируса гепатита С (HCV), такие как боцепревир (Victrelis; больше не доступен в США); глекапревир и пибрентасвир (Мавирет); симепревир (больше не доступен в США; Olysio); софосбувир, велпатасвир и воксилапревир (Sovaldi, Erclusa, Vosevi); и паритапревир, ритонавир, омбитасвир, и/или дасабувир (Викейра Пак); некоторые лекарства от судорог, такие как карбамазепин (Equetro, Tegreto, Teril, другие), ламотриджин (Lamictal), фенобарбитал, фенитоин (Dilantin, Phenytek) и вальпроат; лекарства, подавляющие иммунную систему, такие как циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун), сиролимус (Рапамун) и такролимус (Астаграф, Програф); метадон (долофин, метадоза); пероральные или ингаляционные стероиды, такие как бетаметазон, будесонид (Пульмикорт), циклесонид (Альвеско, Омнарис), дексаметазон, флутиказон (Флоназе, Фловент, в Advair), метилпреднизолон Неорал, Сандиммун, сиролимус (Рапамун) и такролимус (Астаграф, Програф); метадон (долофин, метадоза); пероральные или ингаляционные стероиды, такие как бетаметазон, будесонид (Пульмикорт), циклесонид (Альвеско, Омнарис), дексаметазон, флутиказон (Флоназе, Фловент, в Advair), метилпреднизолон Неорал, Сандиммун, сиролимус (Рапамун) и такролимус (Астаграф, Програф); метадон (долофин, метадоза); пероральные или ингаляционные стероиды, такие как бетаметазон, будесонид (Пульмикорт), циклесонид (Альвеско, Омнарис), дексаметазон, флутиказон (Флоназе, Фловент, в Advair), метилпреднизолон

(Медрол), мометазон (в Дулере), преднизолон (Rayos) и триамцинолон; другие противовирусные препараты, такие как абакавир (Зиаген, Эпзиком, Тризивир и др.); атазанавир (Реатаз, в Эвотазе), делавирдин (Рескриптор), эфавиренз (Сустива, в Атрипла), индинавир (Криксиван), маравирок (Селзентри), нелфинавир (Вирасепт), невирапин (Вирамун), ритонавир (Норвир, в Калетре), тенофовир (Виреад, Атрипла, Трувада), типранавир (Аптивус), саквинавир (Инвираза) и зидовудин (Ретровир, Комбивир, Тризивир); кветиапин (сероквель); рифабутин (микобутин); салметерол (Серевент, в Advair); силденафил (Виагра); тадалафил (Адцирка, Сиалис); тразодон; и варденафил (левитра). Если вы принимаете пероральный раствор, также сообщите своему врачу, если вы принимаете дисульфирам (Антабус) или метронидазол (Флагил, Нувесса, Вандазол).

- если вы принимаете диданозин, принимайте его за 1 час до или через 2 часа после приема раствора лопинавира и ритонавира во время еды. Если вы принимаете таблетки лопинавира и ритонавира, вы можете принимать их натощак одновременно с приемом диданозина.
- сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был удлиненный интервал QT (редкая проблема с сердцем, которая может вызвать нерегулярное сердцебиение, обмороки или внезапную смерть), нерегулярное сердцебиение, низкий уровень калия в крови, гемофилия, высокий уровень холестерина или триглицериды (жиры) в крови, панкреатит (отек поджелудочной железы), заболевания сердца или печени.
- Вам следует знать, что лопинавир и ритонавир могут снижать эффективность гормональных контрацептивов (противозачаточных таблеток, пластырей, колец или инъекций). Поговорите со своим врачом об использовании другой формы контроля над рождаемостью.
- Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели, принимая лопинавир и ритонавир, позвоните своему врачу. Вы не должны кормить грудью, если вы инфицированы ВИЧ или если вы принимаете лопинавир и ритонавир.
- Вы должны знать, что некоторые ингредиенты раствора лопинавира и ритонавира могут вызывать серьезные и опасные для жизни побочные эффекты у новорожденных. Пероральный раствор лопинавира и ритонавира не следует давать доношенным детям в возрасте до 14 дней или недоношенным детям в возрасте до 14 дней после первоначального срока родов, если только врач не считает, что у ребенка есть веская причина для правильного приема лекарства. после рождения. Если врач вашего ребенка решит дать вашему ребенку раствор лопинавира и ритонавира сразу после рождения, ваш ребенок будет тщательно контролироваться на наличие признаков серьезных побочных эффектов. Немедленно позвоните врачу вашего ребенка, если ваш ребенок очень сонный или у него есть изменения в дыхании во время его или ее лечения пероральным раствором лопинавира и ритонавира.
- Вы должны знать, что жировые отложения могут увеличиваться или перемещаться в различные области вашего тела, такие как верхняя часть спины, шея («буйволиный горб»), грудь и область вокруг живота. Вы можете заметить потерю жира на лице, ногах и руках.
- Вы должны знать, что у вас может возникнуть гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), пока вы принимаете это лекарство, даже если у вас еще нет диабета. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов во время приема лопинавира и ритонавира: сильная жажда, частое мочеиспускание, сильный голод, помутнение зрения или слабость. Очень важно позвонить своему врачу, как только у вас появятся какие-либо из этих симптомов, потому что высокий уровень сахара в крови, который не лечится, может вызвать серьезное состояние, называемое кетоацидозом. Кетоацидоз может стать опасным для жизни, если его не лечить на ранней стадии. Симптомы кетоацидоза включают: сухость во рту, тошноту и рвоту, одышку, запах изо рта с фруктовым запахом и снижение сознания.
- вы должны знать, что пока вы принимаете лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, ваша иммунная система может окрепнуть и начать бороться с другими инфекциями, которые уже были в вашем организме. Это может привести к развитию симптомов этих инфекций. Если у вас появились новые или ухудшающиеся симптомы после начала лечения лопинавиром и ритонавиром, обязательно сообщите об этом своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Лопинавир и ритонавир могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

- слабость
- диарея
- газ
- изжога
- потеря веса
- Головная боль
- трудности с засыпанием или сном
- боли в мышцах
- онемение, жжение или покалывание в руках или ногах
- боль в животе, тошнота и рвота

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

- тошнота
- рвота
- боль в животе
- крайняя усталость
- потеря аппетита
- боль в верхней правой части живота
- пожелтение кожи или глаз
- зудящая кожа
- головокружение
- головокружение
- обморок
- аритмия

- волдыри
- СЫПЬ

Лопинавир и ритонавир могут вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните таблетки при комнатной температуре и защищайте их от избыточной влаги. Лучше всего хранить таблетки в той упаковке, в которой они были доставлены; если вы должны вынуть их из контейнера, вы должны использовать их в течение 2 недель. Вы можете хранить пероральный раствор в холодильнике до истечения срока годности, указанного на этикетке, или хранить его при комнатной температуре до 2 месяцев.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и досягаемости.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной утилизации лекарственных средств (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) для получения дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

п экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в Интернете по адресу <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Особенно важно немедленно обратиться за медицинской помощью, если ребенок выпивает больше обычной дозы раствора. Раствор содержит большое количество спирта и других ингредиентов, которые могут быть очень вредными для ребенка.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы, чтобы проверить реакцию вашего организма на лопинавир и ритонавир.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

случайные названия комбинированных продуктов

- Калетра®(содержащие лопинавир, ритонавир)

Последняя редакция — 15.01.2021

[Научитесь цитировать эту страницу](#)



[Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Инс. Отказ от ответственности](#)

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.