

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602015.html>

لوبينا فيروريتونافير تنطق (ri toe' na veer) (loe pin 'a veer)

يلاحظ:

تجري دراسة Lopinavir و ritonavir حالياً في العديد من الدراسات السريرية المستمرة لعلاج مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) إما بمفرده أو مع أدوية أخرى. لم يتم بعد إثبات استخدام لوبينا فيروريتونافير لعلاج COVID-19. يأمل بعض العلماء لأن هذه الأدوية قد استخدمت لعلاج عدوى فيروسية مماثلة.

يجب تناول لوبينا فيروريتونافير فقط تحت إشراف الطبيب لعلاج COVID-19.

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم مزيج لوبينا فيروريتونافير مع أدوية أخرى لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV). يقع Lopinavir و ritonavir في فئة من الأدوية تسمى مثبطات الأنزيم البروتيني. إنهم يعملون عن طريق تقليل كمية فيروس نقص المناعة البشرية في الدم. عندما يتم تناول لوبينا فيروريتونافير معاً ، يساعد ريتونافير أيضاً على زيادة كمية لوبينا فيروريتونافير في الجسم بحيث يكون للدواء تأثير أكبر. على الرغم من أن لوبينا فيروريتونافير لن يعالجوا فيروس نقص المناعة البشرية ، إلا أن هذه الأدوية قد تقلل من فرصتك في الإصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية مثل العدوى الخطيرة أو السرطان. قد يؤدي تناول هذه الأدوية جنباً إلى جنب مع ممارسة الجنس الآمن وإجراء تغييرات أخرى على نمط الحياة إلى تقليل خطر نقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى أشخاص آخرين.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي مزيج لوبينا فيروريتونافير كجهاز لوجي ومحلول (سائل) يؤخذ عن طريق الفم. عادة ما يتم تناوله مرتين في اليوم ، ولكن يمكن تناوله مرة واحدة في اليوم من قبل بعض البالغين. يجب أن يؤخذ الحل مع الطعام. يمكن تناول الأقراص مع الطعام أو بدونه. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ lopinavir و ritonavir تماماً حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

ابتلاع الأقراص كاملة. لا تقسمها أو تمضغها أو تسحقها.

إذا كنت تستخدم المحلول ، قم برجه جيداً قبل كل استخدام لخلط الدواء بالتساوي. استخدم ملعقة أو كوب قياس الجرعات لقياس الكمية الصحيحة من السائل لكل جرعة ، وليس ملعقة منزلية عادية.

استمرفي تناول lopinavir و ritonavir حتى لو كنت تشعر جيداً. لا تتوقف عن تناول لوبينافير وريتونايفير دون التحدث مع طبيبك. إذا فاتتك جرعات ، أو تناولت أقل من الكمية الموصوفة ، أو توقفت عن تناول لوبينافير وريتونايفير ، فقد تصبح حالتك أكثر صعوبة في العلاج.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل تناول lopinavir و ritonavir ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه لوبينافير أو ريتونايفير (نورفير) أو أي أدوية أخرى أو أي من المكونات الموجودة في أقراص أو محلول لوبينافير وريتونايفير. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية: الفوزوسين (أوروكساترال) ؛ أبلوتاميد (إريدا) ؛ سيسابريد (Propulsid) (غير متوفر في الولايات المتحدة) ؛ الكولشيسين (Colcrys ، Mitigare) في الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو الكبد. درونيدارون (ملتق) ؛ الباسفير وجرازوبريفير (زيباتير) ؛ أدوية الإرعوت مثل ثنائي هيدروإرغوتامين (DHE 45 ، ميغرانا) ، الإرعوتامين (إرغومار ، في كافيرغوت ، في ميجرجوت) ، وميثيلجرونوفين (ميثيرجين) ؛ لوميتايد (جوكستايد) ؛ لوفاستاتين (ألتوبريف) ؛ لوراسيدون (لاتودا) ؛ الميدازولام يؤخذ عن طريق الفم (Versed) ؛ بيموزيد (أوراب) ؛ رانولازين (رانكسا) ؛ ريفامبين (ريماكتان ، ريفادين ، في ريفامات ، في ريفاتر) ؛ سيلدينافيل (فقط ماركة Revatio المستخدمة لأمراض الرئة) ؛ سيمفاستاتين (زوكور ، في فيتورين) ؛ نبتة سانت جون ؛ أو تريازولام (هالسيون).
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: مضادات التخثر (مميعات الدم) مثل الوارفارين (كومادين ، جانتوفين) وريفاروكسابان (زارلتو) ؛ مضادات الفطريات مثل إيتراكونازول (أونميل ، سبورونوكس) ، إيزافونكونازول (كريسمبا) ، كيتوكونازول (نيزورال) ، وفوريكونازول (فيفند) ؛ أتوفاكون (مبيرون ، في مالارون) ؛ بيداكوليلين (سيرتور) ؛ حاصرات بيتا. بوسنتان (تراكلير) ؛ بوبروبيون (ويلبوترين ، زيبان ، وغيرهما) ؛ حاصرات قنوات الكالسيوم مثل فيلوديبين ، نيكارديبين (كاردين) ، ونيفيديبين (أدالات ، أفيديتاب سي آر ، بروكارديا) ؛ أدوية متابعة الكوليسترول مثل أتورفاستاتين (ليبيتور ، في كادويت) ، وروسيفوستاتين (كريستور) ؛ كلاريتروميسين (بياكسين ، في بريفباك) ؛ الديدجوكسين (لانوكسين) ؛ elagolix (أوريليسا) ؛ الفنتانيل (أكتيك ، دوريجسبك ، أنسوليس ، آخرون) ؛ فوسامبرينافير (ليكسيفا) ؛ أدوية معينة للسرطان مثل أيماسيكليب (فيرزينو) وداساتينيب (سبريسيل) وإنكورافينيب (برافتوفي) وإيبروتينيب (إمبروفيكسا) وإيفوسيدنيب (تيسوفو) ونيراتينيب (نيرلينكس) ونيلوتينيب (تاسينيكسا) وفينيرستوكلاكس وفينكاستين. ؛ بعض الأدوية لعدم انتظام ضربات القلب مثل الأميودارون (كوردارون ، نيكسترون ، باسيرون) ، بيريديل (لم يعد متوفرًا في الولايات المتحدة ؛ فاسكور) ، ليدوكائين (ليدوديرم ؛ في زيلاكائين مع إينفيرين) ، وكينيدين (في نويديكستا) ؛ أدوية معينة لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV) مثل بوسبريفير (فيكتربليس ؛ لم تعد متوفرة في الولايات المتحدة) ؛ جليكابريفير وبيرناتاسفير (مافيريت) ؛ سيمبريفير (لم يعد متوفرًا في الولايات المتحدة ؛ أوليسيو) ؛ سوفوسوفير وفيلباتاسفير وفوكسيلابريفير (سوفالدي ، إيكولوس ، فوسيفي) ؛ و paritaprevir ، ريتونايفير ، أومببتاسفير ، و / أو داسابوفير (فيكيرا باك) ؛ بعض الأدوية للنوبات مثل كاربامازيبين (إكوترو ، تجريتل ، تيريل ، أخرى) ، لاموتريجين (لاميكثال) ، الفينوباربيتال ، الفينيتوين (ديلاتين) ، فينيتيك ، وقالبروات ؛ الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي مثل السيكلوسبورين (جينجراف ، نيورال ، سانديمون) ، سيروليموس (راباميون) ، وتاكروليموس (أستاغراف ، بروغراف) ؛ الميثادون (دولوفين ، ميثادوز) ؛ المنشطات عن طريق الفم أو الاستنشاق مثل بيتاميثازون ، بوديزونيد (بولميكورت) ، سيكليسونيد (ألفيسكو ، أومناريس) ، ديكساميثازون ، فلوتيكاسون (فلوناز ، فلوفينت ، في أدفير) ، ميثيل برينديزولون (Neoral و Sandimmune) و Rapamune (sirolimus و Astagraf و Prograf) ؛ الميثادون (دولوفين ، ميثادوز) ؛ المنشطات عن طريق الفم أو الاستنشاق مثل بيتاميثازون ، بوديزونيد (بولميكورت) ، سيكليسونيد (ألفيسكو ، أومناريس) ، ديكساميثازون ، بوديزونيد (بولميكورت) ، سيكليسونيد (ألفيسكو ، أومناريس) ، ديكساميثازون ، بوديزونيد (بولميكورت) ، فلوتيكاسون (فلوناز ، فلوفينت ، في أدفير) ، ميثيل برينديزولون (Neoral و Sandimmune) و Rapamune (sirolimus و Astagraf و Prograf) ؛ الميثادون (دولوفين ، ميثادوز) ؛ المنشطات عن طريق الفم أو الاستنشاق مثل بيتاميثازون ، بوديزونيد (بولميكورت) ، سيكليسونيد (ألفيسكو ، أومناريس) ، ديكساميثازون ، فلوتيكاسون (فلوناز ، فلوفينت ، في أدفير) ، ميثيل برينديزولون

(ميدرون) ، موميتازون (في دوليرا). بريدنيزون (رايوس) ، وتريامسينولون ؛ الأدوية الأخرى المضادة للفيروسات مثل أباكافير (زياجين ، في إبيزكوم ، في تريزيفير ، وغيرهما) ؛ أتازانافير (ريانا) ، في إيفوتاز ، ديلافيردين (ريسكربتور) ، إيفافيرينز (سوستيفا ، في أتريلا) ، إندينافير (كريكسيفان) ، مارافيروك (سيلزنتري) ، نلفينافير (فيراسبت) ، نيفيرابين (فيراموني) ، ريتونوفير(نورفير) (Viread ، في Atripla ، في Truvada) ، و (Aptivus) (tipranavir ، و saquinavir) ، و Retrovir) zidovudine ، في Combivir ، في Trizivir) ؛ كيوثياين (سيروكويل) ؛ ريفابوتين (ميكوبوتين) ؛ سالميتيرول (Serevent ، في Advair) ؛ سيلدينافيل (الفياجرا) ؛ تادالافيل (أديسركا ، سياليس) ؛ ترازودون. وفاردينافيل (ليفيترا). إذا كنت تتناول المحلول الفموي ، أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت تتناول ديسفلرام (Antabuse) أو ميترونيدازول (فلاجيل) ، في نوفيسا ، في فاندازول).

- إذا كنت تتناول ديدانوزين ، فتناوله قبل ساعة واحدة أو بعد ساعتين من تناول محلول لوبينافير وريتونافير مع الطعام. إذا كنت تتناول أقراص lopinavir و ritonavir ، فيمكنك تناولها على معدة فارغة في نفس الوقت الذي تتناول فيه ديدانوزين.
- أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من فترة QT طويلة الأمد (مشكلة قلبية نادرة قد تسبب عدم انتظام ضربات القلب أو الإغماء أو الموت المفاجئ) أو عدم انتظام ضربات القلب أو انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم أو الهيموفيليا أو ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية (الدهون) في الدم ، التهاب البنكرياس (تورم البنكرياس) ، أو أمراض القلب أو الكبد.
- يجب أن تعلم أن لوبينافير وريتونافير قد يقللان من فعالية موانع الحمل الهرمونية (حبوب منع الحمل ، اللصقات ، الحلقات ، أو الحقن). تحدث إلى طبيبك حول استخدام شكل آخر من وسائل منع الحمل.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول لوبينافير وريتونافير ، فاتصل بطبيبك. يجب عدم الإرضاع إذا كنت مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية أو إذا كنت تتناول لوبينافير وريتونافير.
- يجب أن تعلم أن بعض المكونات في محلول لوبينافير وريتونافير قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة ومهددة للحياة عند الأطفال حديثي الولادة. لا ينبغي إعطاء محلول Lopinavir و ritonavir عن طريق الفم للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن 14 يوماً أو الأطفال الخدج الذين تقل أعمارهم عن 14 يوماً بعد تاريخ الاستحقاق الأصلي ، ما لم يعتقد الطبيب أن هناك سبباً وجيهاً لتلقي الطفل الدواء بشكل صحيح بعد الولادة. إذا اختار طبيب طفلك إعطاء طفلك محلول لوبينافير وريتونافير فور ولادته ، فسيتم مراقبة طفلك بعناية بحثاً عن علامات الآثار الجانبية الخطيرة. اتصل بطبيب طفلك على الفور إذا كان طفلك يشعر بالنعاس الشديد أو لديه تغيرات في التنفس أثناء علاجه بمحلول لوبينافير وريتونافير عن طريق الفم.
- يجب أن تدرك أن دهون جسمك قد تزداد أو تنتقل إلى مناطق مختلفة من جسمك ، مثل أعلى ظهرك ورقبتك ("حبة الجاموس") والثديين وحول معدتك. قد تلاحظ فقدان دهون الجسم من وجهك وساقيك وذراعيك.
- يجب أن تعلم أنك قد تعاني من ارتفاع السكر في الدم (زيادة في نسبة السكر في الدم) أثناء تناول هذا الدواء ، حتى لو لم تكن مصاباً بالسكري بالفعل. أخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي من الأعراض التالية أثناء تناولك لوبينافير وريتونافير: العطش الشديد ، كثرة التبول ، الجوع الشديد ، عدم وضوح الرؤية ، أو الضعف. من المهم جداً الاتصال بطبيبك بمجرد ظهور أي من هذه الأعراض ، لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم التي لا يتم علاجها يمكن أن يسبب حالة خطيرة تسمى الحمض الكيتوني. قد يصبح الحمض الكيتوني مهدداً للحياة إذا لم يتم علاجه في مرحلة مبكرة. تشمل أعراض الحمض الكيتوني: جفاف الفم ، والغثيان والقيء ، وضيق التنفس ، والتنفس برائحة الفواكه ، وانخفاض الوعي.
- يجب أن تعلم أنه أثناء تناول الأدوية لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ، قد يزداد جهازك المناعي قوة ويبدأ في محاربة الالتهابات الأخرى التي كانت موجودة بالفعل في جسمك. قد يتسبب هذا في ظهور أعراض تلك الالتهابات. إذا كانت لديك أعراض جديدة أو تزداد سوءاً بعد بدء العلاج باستخدام لوبينافير وريتونافير ، فتأكد من إخبار طبيبك.

قبة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبة يجب أن أفعالها إذا نسيت جرعة؟

خذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان وقت الجرعة التالية تقريباً ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب Lopinavir و ritonavir آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- ضعف
- إسهال
- غاز
- حرقنة من المعدة
- فقدان الوزن
- صداع الراس
- صعوبة في النوم أو البقاء نائماً
- ألم عضلي
- خدر أو حرقان أو وخز في اليدين أو القدمين
- آلام المعدة والغثيان والقيء

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور أو احصل على علاج طبي طارئ:

- غثيان
- التقيؤ
- آلام في المعدة
- التعب الشديد
- فقدان الشهية
- ألم في الجزء العلوي الأيمن من المعدة
- اصفرار الجلد أو العينين
- حكة في الجلد
- دوخة
- دوام
- إغماء
- عدم انتظام ضربات القلب

• بثور

• متسرع

قد يسبب Lopinavir و ritonavir آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزين الأقراص في درجة حرارة الغرفة وحمايتها من الرطوبة الزائدة. من الأفضل الاحتفاظ بالأقراص في الحاوية التي أتت بها ؛ إذا كان لا بد من إخراجها من الحاوية ، يجب عليك استخدامها في غضون أسبوعين. يمكنك الاحتفاظ بالمحلول الفموي في الثلاجة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الملصق ، أو يمكنك تخزينه في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى شهرين.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أعطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم.
[http://www.upandaway.org] [http://www.upandaway.org]

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [http://goo.gl/c4Rm4p] [http://goo.gl/c4Rm4p] لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] [https://www.poisonhelp.org/help] إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

من المهم بشكل خاص الحصول على مساعدة طبية على الفور إذا كان الطفل يشرب أكثر من الجرعة المعتادة من المحلول. يحتوي المحلول على كمية كبيرة من الكحول ومكونات أخرى قد تكون ضارة جداً بالطفل.

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك بعض الفحوصات المخبرية للتحقق من استجابة جسمك للوبينا فيروريتونا فير.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند للمنتجات المركبة

• كاليترا® (تحتوي على Lopinavir و Ritonavir)

آخر مراجعة - 15/01/2021

[تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة](#)



[إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيدالة النظام الصحي](#)

AHFS® معلومات الدواء المريض™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيدالة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022