

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 洛匹那韦和利托那韦

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602015.html>

洛匹那韦和利托那韦

发音为 (loe pin' a veer) (ri toe' na veer)

注意:

洛匹那韦和利托那韦目前正在几项正在进行的临床研究中进行研究, 以单独或与其他药物一起治疗 2019 年冠状病毒病 (COVID-19)。尚未确定使用洛匹那韦和利托那韦治疗 COVID-19。一些科学家抱有希望, 因为这些药物已被用于治疗类似的病毒感染。

洛匹那韦和利托那韦只能在医生指导下服用以治疗 COVID-19。

为什么要开这种药?

洛匹那韦和利托那韦的组合与其他药物一起用于治疗人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染。洛匹那韦和利托那韦属于一类称为蛋白酶抑制剂的药物。它们通过减少血液中的艾滋病毒含量来发挥作用。当洛匹那韦和利托那韦一起服用时, 利托那韦还有助于增加体内洛匹那韦的含量, 使用药效果更大。尽管洛匹那韦和利托那韦不能治愈 HIV, 但這些药物可能会降低您患上获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 和 HIV 相关疾病 (如严重感染或癌症) 的机会。服用这些药物以及进行更安全的性行为 and 改变其他生活方式可能会降低将 HIV 病毒传播给其他人的风险。

这个药应该怎么用?

洛匹那韦和利托那韦的组合以片剂和口服溶液 (液体) 的形式出现。它通常每天服用两次, 但某些成年人可能每天服用一次。该溶液必须与食物一起服用。片剂可以在有或没有食物的情况下服用。仔细遵循处方标签上的说明, 并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用洛匹那韦和利托那韦。不要多吃或少吃, 也不要比医生开的更频繁。

吞下整个药片; 不要分裂、咀嚼或压碎它们。

如果您正在使用该溶液,请在每次使用前充分摇匀以使药物混合均匀。使用剂量测量勺子或杯子来测量每次剂量的正确液体量,而不是普通的家用勺子。

即使您感觉良好,也要继续服用洛匹那韦和利托那韦。不要在未咨询医生的情况下停止服用洛匹那韦和利托那韦。如果您错过剂量、服用少于规定量或停止服用洛匹那韦和利托那韦,您的病情可能会变得更难治疗。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途;向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用洛匹那韦和利托那韦之前,

- 如果您对洛匹那韦、利托那韦(Norvir)、任何其他药物或洛匹那韦和利托那韦片剂或溶液中的任何成分过敏,请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 如果您正在服用以下任何药物,请告诉您的医生:阿夫唑嗪(Uroxatral);阿帕鲁胺(Erleada);西沙必利(Propulsid)(在美国不可用);肾病或肝病患者的秋水仙碱(Colcrys, Mitigare);决奈达隆(Multaq);elbasvir和grazoprevir(Zepatier);麦角药物,例如二氢麦角胺(DHE 45, Migranal)、麦角胺(Ergomar, in Cafergot, in Migergot)和甲基麦角新碱(Methergine);洛米他派(Juxtapid);洛伐他汀(Altoprev);鲁拉西酮(Latuda);口服咪达唑仑(Versed);匹莫齐特(Orap);雷诺嗪(Ranexa);利福平(Rimactane, Rifadin, 在Rifamate, 在Rifater);西地那非(仅用于肺部疾病的Revatio品牌);辛伐他汀(Zocor, 在Vytorin);圣约翰草;或三唑仑(Halcion)。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用的其他处方药和非处方药、维生素和营养补充剂。请务必提及以下任何一项:抗凝剂(“血液稀释剂”),例如华法林(Coumadin, Jantoven)和利伐沙班(Xarelto);抗真菌药,如伊曲康唑(Onmel, Sporanox)、艾沙康唑(Cresemba)、酮康唑(Nizoral)和伏立康唑(Vfend);atovaquone(Mepron, 在马拉隆);贝达喹啉(Sirturo); β 受体阻滞剂;波生坦(示踪剂);安非他酮(Wellbutrin, Zyban, 其他);钙通道阻滞剂,例如非洛地平、尼卡地平(Cardene)和硝苯地平(Adalat, Afeditab CR, Procardia);降胆固醇药物,例如阿托伐他汀(立普妥, 在Caduet)和瑞舒伐他汀(Crestor);克拉霉素(Biaxin, 在Prevpac);地高辛(Lanoxin);恶拉戈利(奥里利萨);芬太尼(Actiq, Duragesic, Onsolis等);福沙那韦(Lexiva);某些癌症药物,例如abemaciclib(Verzenio)、dasatinib(Sprycel)、encorafenib(Braftovi)、ibrutinib(Imbruvica)、ivosidenib(Tibsovo)、neratinib(Nerlynx)、nilotinib(Tasigna)、venetoclax(Venclexta)、长春碱和长春新碱;某些治疗心律不齐的药物,例如胺碘酮(Cordarone、Nexterone、Pacerone)、bepridil(美国不再提供;Vascor)、利多卡因(Lidoderm;在Xylocaine和肾上腺素中)和奎尼丁(在Nuedexta);某些丙型肝炎病毒(HCV)药物,例如boceprevir(Victrelis;在美国不再提供);glecaprevir和pibrentasvir(Mavyret);simeprevir(美国不再提供;Olysio);sofosbuvir、velpatasvir和voxilaprevir(Sovaldi、Eplclusa、Vosevi);和paritaprevir,利托那韦,ombitasvir,和/或达沙布韦(Viekira Pak);某些用于癫痫发作的药物,例如卡马西平(Equetrol、Tegretol、Teril等)、拉莫三嗪(Lamictal)、苯巴比妥、苯妥英(Dilantin、Phenytek)和丙戊酸盐;抑制免疫系统的药物,如环孢素(Gengraf、Neoral、Sandimmune)、西罗莫司(Rapamune)和他克莫司(Astagraf、Prograf);美沙酮(多洛芬,美沙酮);口服或吸入类固醇,例如倍他米松、布地奈德(Pulmicort)、环索奈德(Alvesco、Omnaris)、地塞米松、氟替卡松(Flonase、Flovent、Advair)、甲基强的松龙 Neoral, Sandimmune)、西罗莫司(Rapamune)和他克莫司(Astagraf, Prograf);美沙酮(多洛芬,美沙酮);口服或吸入类固醇,如倍他米松、布地奈德(Pulmicort)、环索奈德(Alvesco、Omnaris)、地塞米松、氟替卡松(Flonase、Flovent、Advair)、甲基强的松龙 Neoral, Sandimmune)、西罗莫司(Rapamune)和他克莫司(Astagraf, Prograf);美沙酮(多洛芬,美沙酮);口服或吸入类固醇,如倍他米松、布地奈德(Pulmicort)、环索奈德(Alvesco、Omnaris)、地塞米松、氟替卡松(Flonase、Flovent、Advair)、甲基强的松龙

(Medrol) , 莫米松 (在 Dulera) 。泼尼松 (Rayos) 和曲安西龙; 其他抗病毒药物, 例如阿巴卡韦 (Ziagen, 在 Epzicom, 在 Trizivir, 其他); 阿扎那韦 (Reyataz, 在 Evotaz) 、地拉韦定 (Rescriptor) 、依非韦伦 (Sustiva, 在 Atripla) 、茚地那韦 (Crixivan) 、马拉韦罗 (Selzentry) 、奈非那韦 (Viracept) 、奈韦拉平 (Viramune) 、利托那韦 (Norvir, 在 Kaletra) 、替诺福韦 (Viread, 在 Atripla, 在 Truvada) 、替拉那韦 (Aptivus) 、沙奎那韦 (Invirase) 和齐多夫定 (Retrovir, 在 Combivir, 在 Trizivir) ; 喹硫平 (Seroquel) ; 利福布汀 (Mycobutin) ; 沙美特罗 (Serevent, 在 Advair) ; 西地那非 (伟哥) ; 他达拉非 (Adcirca, Cialis) ; 曲唑酮; 和伐地那非 (艾力达) 。如果您正在服用口服溶液, 请告诉您的医生您是否正在服用双硫仑 (Antabuse) 或甲硝唑 (Flagyl, 在 Nuessa, 在万达唑) 。

- 如果您正在服用去羟肌苷, 请在随餐服用洛匹那韦和利托那韦溶液之前 1 小时或之后 2 小时服用。如果您正在服用洛匹那韦和利托那韦片剂, 您可以在服用去羟肌苷的同时空腹服用。
- 如果您有或曾经有过 QT 间期延长 (一种罕见的心脏病, 可能导致心律不齐、昏厥或猝死)、心律不齐、血液中钾含量低、血友病、高胆固醇或血液中的甘油三酯 (脂肪)、胰腺炎 (胰腺肿胀) 或心脏或肝脏疾病。
- 您应该知道洛匹那韦和利托那韦可能会降低激素避孕药 (避孕药、贴片、避孕环或注射剂) 的有效性。与您的医生讨论使用另一种避孕方式。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳, 请告诉您的医生。如果您在服用洛匹那韦和利托那韦时怀孕, 请致电您的医生。如果您感染 HIV 或正在服用洛匹那韦和利托那韦, 则不应进行母乳喂养。
- 您应该知道, 洛匹那韦和利托那韦溶液中的某些成分可能会对新生儿造成严重且危及生命的副作用。洛匹那韦和利托那韦口服液不应给予小于 14 天的足月婴儿或超过原预产期 14 天的早产儿, 除非医生认为婴儿有充分的理由接受正确的药物治疗出生后。如果您的宝宝的医生选择在您的宝宝出生后立即给予洛匹那韦和利托那韦溶液, 则会仔细监测您的宝宝是否有严重副作用的迹象。如果您的宝宝在使用洛匹那韦和利托那韦口服液治疗期间非常困倦或呼吸发生变化, 请立即致电您宝宝的医生。
- 您应该意识到您的身体脂肪可能会增加或移动到您身体的不同部位, 例如您的上背部、颈部 (“水牛驼峰”) 、乳房和腹部周围。您可能会注意到脸部、腿部和手臂的体脂减少。
- 您应该知道, 即使您还没有患糖尿病, 您在服用这种药物时也可能出现高血糖症 (血糖升高) 。如果您在服用洛匹那韦和利托那韦时出现以下任何症状, 请立即告诉您的医生: 极度口渴、尿频、极度饥饿、视力模糊或虚弱。一旦出现任何这些症状, 立即就医是非常重要的, 因为未经治疗的高血糖会导致称为酮症酸中毒的严重疾病。如果不及早治疗, 酮症酸中毒可能会危及生命。酮症酸中毒的症状包括: 口干、恶心和呕吐、呼吸急促、呼吸有水果味和意识下降。
- 您应该知道, 当您服用治疗 HIV 感染的药物时, 您的免疫系统可能会变得更强大, 并开始对抗已经存在于您体内的其他感染。这可能会导致您出现这些感染的症状。如果您在开始使用洛匹那韦和利托那韦治疗后出现新的或恶化的症状, 请务必告诉您的医生。

我应该遵循特殊的饮食说明吗?

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

洛匹那韦和利托那韦可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 弱点
- 腹泻
- 气体
- 胃灼热
- 减肥
- 头痛
- 难以入睡或保持睡眠
- 肌肉疼痛
- 手或脚麻木、灼痛或刺痛
- 胃痛、恶心和呕吐

一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 恶心
- 呕吐
- 肚子痛
- 极度疲倦
- 食欲不振
- 胃右上方疼痛
- 皮肤或眼睛发黄
- 皮肤发痒
- 头晕
- 头晕目眩
- 昏厥
- 心律不齐

- 水泡
- 皮疹

洛匹那韦和利托那韦可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您出现严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将药片存放在室温下并保护它们免受过多水分的影响。最好将药片放在它们进来的容器中；如果您必须将它们从容器中取出，则应在 2 周内使用它们。您可以将口服溶液保存在冰箱中，直到标签上打印的有效期，或者您可以将其在室温下保存长达 2 个月。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

如果孩子喝的溶液量超过通常剂量，立即获得医疗帮助尤为重要。该溶液含有大量酒精和其他可能对儿童非常有害的成分。

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会下令进行某些实验室测试，以检查您的身体对洛匹那韦和利托那韦的反应。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

组合产品的名称

- 克力芝®（含洛匹那韦、利托那韦）

最后修订 - 2021 年 1 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日