



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : New Zealand Medicines Authority

# 75 IU® LUVERIS

*Lutropinalfa )rch(*

## מידע על רפואת צריכה

- יש לך דימום נרתיקי או רחמי לא מוסבר
- יש לך סרטן של השחלות, הרחם או השדיים
- יש לך גידולים של בלוטת יותרת המוח או ההיפותלמוס.

**אם אינך בטוח אם תנאים אלה חלים עליך, או שאתה מודאג ממשוה ברשימה זו, ספר לרופא שלך.**

**אין להשתמש בתרופה לאחר חלוף תאריך התפוגה (חודש/שנה) על האריזה, או אם האריזה קרועה או מראה סימני חבלה.**

אם פג תוקף התרופה שלך או שהיא פגומה, החזר אותה לרוקח או למרפאה שלך לסילוק.

**אם אינך בטוח אם עליך להתחיל להשתמש ב-Luveris, דבר עם הרופא שלך.**

## לפני שתחיל להשתמש בו

הרופא שלך יעריך אותך ואת אי הפוריות של בן הזוג שלך. זה עשוי לכלול בדיקות למצבים רפואיים אחרים, שעלולים להפריע ליכולתך להיכנס להריון. במידת הצורך, ניתן לטפל במצבים רפואיים אחרים לפני התחלת טיפולי פוריות, כולל Luveris.

**ספר לרופא שלך אם אתה מניקה.**

אין להשתמש ב-Luveris בזמן הנקה.

**ספר לרופא שלך אם יש לך אלרגיות כלשהן למזונות, צבעים, חומרים משמרים או כל תרופה אחרת.**

**ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממצבים רפואיים כלשהם, במיוחד את הדברים הבאים:**

- גיל המעבר בטרם עת

התפתחות של זקיקים הנמצאים בשחלות, המבנים מבשילים את הביציות (ביציות). לאחר מכן, טיפול במנה בודדת של גונדוטרופינים כוריוניים אנושיים (hCG), מה שמוביל לשחרור ביצית מהזקיק (ביוץ).

**שאל את הרופא שלך אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הסיבה ל-Luveris נרשמה עבורך.**

ייתכן שהרופא שלך רשם את זה מסיבה אחרת.

זמין רק על פי מרשם רופא Luveris

אינו יוצר הרגל Luveris.

## לפני שנותנים לך לובריס

### כשסור להשתמש בו

אין להשתמש ב-Luveris אם:

- יש לך היסטוריה של אלרגיה לגונדוטרופינים או לאחד מהמרכיבים המפורטים בסוף העלון.
- תסמינים של תגובה אלרגית עשויים לכלול:
- קוצר נשימה
- צפצופים או קשיי נשימה
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או חלקים אחרים בגוף
- פריחה, גירוד או כוורות על העור. אין להשתמש ב-Luveris אם:

את בהריון

את מניקה

השחלות שלך מוגדלות

יש לך ציסטה שחלתית לא מוסברת

## מה יש בעלון זה

עלון זה עונה על כמה שאלות נפוצות על Luveris.

הוא אינו מכיל את כל המידע הזמין.

זה לא בא במקום שיחה עם הרופא או הרוקח.

לכל התרופות יש יתרונות וסיכונים. הרופא שלך שקל את הסיכונים שאתה משתמש ב-Luveris מול היתרונות שצפויים להיות לו עבורך.

**אם יש לך חששות לגבי השימוש בתרופה זו, שאל את הרופא, האחיות או הרוקח.**

**שמור מידע זה עם התרופה שלך.**

ייתכן שתצטרך לקרוא אותו שוב מאוחר יותר.

## למה משמש Luveris

אשר דומה במהותו להורמון המצוי באופן טבעי בבני אדם, אך הוא מיוצר באמצעות ביוטכנולוגיה. הוא שייך למשפחת ההורמונים הנקראים גונדוטרופינים, המעורבים בשליטה תקינה של רבייה (LH) (רקומביננטי luteinising היא תרופה המכילה לוטרופין אלפא, הורמון Luveris

כדי לגרום ל GONAL-f הידוע גם בשם המותג) FSH) מיועדת לטיפול בנשים שהוכח כי הן מייצרות רמות נמוכות מאוד של חלק מההורמונים המעורבים במחזור הרבייה הטבעי. התרופה משמשת יחד עם הורמון נוסף הנקרא Luveris מוגר זקיק Luveris

- הפרעות בבלוטות יותרת הכליה
- הפרעות בבלוטת התריס
- רמות פרולקטין גבוהות בדם
- גידולי שרירנים ברחם שיהפכו את ההריון לבלתי אפשרי

• אם עברת גיל המעבר

• מחלת כליות

• מחלת כבד

• לך או למשפחתך יש גורמי סיכון מוגברים לפתח קרישי דם, למשל שבץ מוחי, התקפי לב

• פורפיריה או היסטוריה משפחתית של פורפיריה.

טיפול ב-Luveris עשוי להגביר את הסיכון לפתח מצב הנקרא תסמונת גירוי יתר שחלתי (OHSS). זה כאשר השחלות מגיבות יתר על המידה לטיפול ההורמונלי והופכות לגדולות יותר.

התסמין השכיח ביותר הוא כאבי בטן תחתונה. במהלך הגירוי הרופא שלך יעקוב אחר הטיפול שלך באמצעות אולטרסאונד ובדיקות דם כדי לעזור לקבוע אם אתה צפוי לפתח OHSS. במידת הצורך, הרופא שלך יעכב או יבטל את הזרקת Luveris שלך. ייתכן גם שימליץ לך להימנע מיחסי מין

קיום יחסי מין או השתמש בשיטות מחסום עד סוף המחזור אם זה קורה.

בהשוואה להתעברות טבעית, התדירות של הריונות ולידות מרובי עוברים גדלה בחולים המקבלים טיפול זה. ה רובם הם תאומים. הרופא שלך יעקוב אחר התגובה השחלתית שלך כדי למזער את הסיכוי להריונות מרובי עוברים, בגלל הסיכונים הגדולים יותר שהם נושאים לאמהות ולתינוקות.

בהשוואה להתעברות טבעית, תדירות אובדן הריון גבוהה יותר בחולים העוברים טיפולים להמרצת צמיחת זקיקים עבור השראת ביוץ.

ייתכן סיכון מוגבר מעט למומים מולדים בנשים המשתמשות בטכנולוגיות רבייה מסייעות. ייתכן שזה נובע מגידול

גיל האם, גורמים גנטיים, הריונות מרובי עוברים או ההליכים. לא נשללה השפעה של תרופות המשמשות להשראת ביוץ.

### שוחח עם הרופא שלך על כל החששות שלך לפני ביצוע הטיפול או לפני שתתחיל להשתמש ב-Luveris.

### נטילת תרופות אחרות

#### ספר לרופא שלך אם אתה נוטל תרופות אחרות, כולל:

- כל תרופות המרשם
- כל התרופות, הוויטמינים, תוספי הצמחים או הטיפולים הטבעיים שאתה קונה ללא מרשם מבית המרקחת שלך, סופרמרקט, נטורופת או חנות טבע.

תרופות מסוימות עשויות להיות מושפעות מ-Luveris או עשויות להשפיע על יעילותה.

לרופא או לרוקח שלך יש מידע נוסף על תרופות שיש להיזהר בהן או להימנע מהן בזמן השימוש ב-Luveris.

### כיצד ניתן לוורים

#### בצע את כל ההנחיות שניתנו לך על ידי הרופא או הרוקח בהירות.

הם עשויים להיות שונים מהמידע הכלול בעלון זה.

יש להתחיל את הטיפול ב-Luveris תחת פיקוחו של רופא מומחה מנוסה בטיפולי פוריות.

(GONALf) follitropinalfa, ניתן כקורס של זריקות תת עוריות יומיות ( מתחת לעור) במקביל לתרופה אחרת Luveris

#### כמה להזריק

הרופא שלך יגיד לך כמה Luveris להשתמש ומתי להזריק אותו.

מומלץ שהטיפול ב-Luveris יתחיל ב-IU75-

מדי יום יחד עם IU 75 עד 150 f-IUGONAL אך הרופא שלך עשוי להתאים את המינון של Luveris או f-GONAL בהתאם לתגובה האישית שלך לטיפול. תוצאות קליניות הראו שהמינון היעיל המינימלי של Luveris הוא IU 37.5.

כל בקבוקון מיועד לשימוש חד פעמי במטופל אחד בלבד. השלך כל שאריות.

### איך להזריק

ניתנת כזריקה תת עורית (מתחת לעור) באזור הבטן התחתונה או הירך, כל יום בדרך כלל למשך עד 3 שבועות Luveris

מיועד להזריק על ירך או על ידי בן הזוג שלך Luveris

לחלופין, הרופא או האחיות עשויים לתת לך את הזריקות הללו.

אם הרופא או האחיות שלך מחליטים שאתה יכול לתת את הזריקות בעצמך, הרופא או האחיות ילמדו אותך את טכניקת ההזרקה.

### אל תזריק לעצמך עד שאתה בטוח כיצד לעשות זאת.

### קרא בעיון את הוראות השימוש המצורפות בחבילה לפני תחילת ההזרקות.

ייתכן שבן זוגך יוכשר לתת את הזריקה בבית.

### איפה להזריק

ניתנת בדרך כלל באזור הבטן התחתונה (למעט סביב הטבור וקו המותניים) או בחלק הקדמי של הירך Luveris

### אין להזריק לאזורים שבהם אתה מרגיש גושים, קשרים מוצקים, דיכאון, כאב או שינוי צבע.

### שוחח עם הרופא שלך אם אתה מוצא משהו חריג בעת ההזרקה.

### אם שכחת להזריק לזכריס

אם שכחת זריקה או אינך בטוח מה לעשות, פנה מיד לרופא או לאחות לקבלת ייעוץ.

### אין להזריק מנה כפולה בכל יום.

שאל את הרופא שלך אם אתה לא בטוח מה לעשות או אם אתה מתקשה לזכור להזריק את התרופה שלך.

### אם הזרקת יותר מדי

פנה מיד לרופא שלך או למרכז מידע רעלים (באוסטרליה טלפון 131 126. בניו זילנד טלפון 0800 764 766) אם אתה חושש שנתת לעצמך יותר מדי או שמישהו אחר הזריק

עצמם עם לובריס.

## בזמן שאתה משתמש ב Luveris-

הרופא שלך יעקוב בקפידה אחר התגובה שלך באמצעות אולטרסאונד ובדיקות דם לפני ובמהלך הטיפול ב Luveris-

### דברים שאתה חייב לעשות

פנה לרופא שלך באופן קבוע.

הרופא שלך יעקוב אחריו מקרוב לאורך כל הטיפול.

ספר לרופא שלך מיד אם אתה נכנס להריון בזמן השימוש ב-Luveris.

אם אתה עומד להתחיל להשתמש בתרופה חדשה כלשהי, ספר לרופא ולרוקח שאתה משתמש ב-Luveris.

אם אתה מתכנן לעבור ניתוח, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה משתמש ב-Luveris.

ספר לכל הרופאים, רופאי השיניים והרוקחים המטפלים בך שאתה משתמש ב-Luveris.

### דברים שאסור לעשות

אם אתה מזריק עצמי אל תעשה:

- הפסק להשתמש ב-Luveris מבלי ליידע את הרופא שלך.
- שנה את המינון אלא אם כן הרופא שלך אומר לך לעשות זאת. שינוי המינון שלך מבלי ליעץ לרופא שלך יכול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי לא רצויות או למנוע

שהתרופה לא תפעל כראוי.

- תן תרופה זו לכל אחד אחר, גם אם הסימפטומים שלו נראים דומים לשלך או אם יש להם אותו מצב כמוך.

### דברים שצריך להיזהר מהם

היזהר בנהיגה או הפעלת מכונות עד שתדע כיצד Luveris משפיע עליך.

## תופעות לוואי

ספר לרופא שלך בהקדם האפשרי אם אתה לא מרגיש טוב בזמן נטילת Luveris.

לכל התרופות יכולות להיות תופעות לוואי. לפעמים הם רציניים, רוב הזמן הם לא.

אל תיבהל מרשימה זו של תופעות לוואי אפשריות.

ייתכן שלא תחוה אף אחד מהם.

שאל את הרופא או הרוקח שלך לענות על כל שאלה שיש לך.

ספר לרופא שלך מיד, או גש למדור תאונות וחירום בבית החולים הקרוב אליך אם אתה חווה אחד מהמחלות הבא:

- סימנים של תגובות אלרגיות כולל: נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או חלקים אחרים בגוף; קוצר נשימה, צפצופים או קשיי נשימה; פריחה חמורה בעור, גירוד או כוורות
- דימום נרתיקי
- דלקת, נפיחות או כאב ברגליים

- סימנים של OHSS חמור כגון כאבי בטן תחתונה חמורים, כאבי אגן עזים, בחילות, הקאות, שלשולים ואחריו עלייה מהירה במשקל, מופחתת כמויות שתן וקוצר נשימה

- סימני אזהרה לשבץ או התקף לב

- סימני אזהרה של קרישי דם (כגון כאב, חום, אדמומיות, חוסר תחושה או עקצוץ בזרוע או ברגל).

ספר לרופא שלך אם אתה מבחין באחד מהדברים הבאים והם מדאיגים אותך:

- כאב ראש
- בחילות, הקאות, שלשולים, אי נוחות בבטן או כאבי בטן
- ציטטות בשחלות, כאבי חזה וכאבי אגן
- תגובות מקומיות באתר ההזרקה, כגון כאב, אדמומיות או נפיחות.

הריון חוץ רחמי (עובר מושתל מחוץ לרחם) עלול להתרחש, במיוחד אצל נשים עם היסטוריה של מחלת חצוצרות קודמת.

ספר לרופא שלך אם אתה מבחין במשהו אחר שגורם לך להרגיש לא טוב.

תופעות לוואי אחרות שאינן מופיעות לעיל עשויות להופיע גם אצל חלק מהמטופלים.

## לאחר השימוש ב-Luveris-

### אחסון

לפני ההרכבה שמור את הבקבוקונים במקום קריר ויבש שבו הטמפרטורה נמוכה מ-25 מעלות צלזיוס.

אחסן באריזה המקורית כדי להגן מפני אור.

לאחר שאבקת Luveris מומסת עם הממס שסופק, יש להזריק אותה מיד. זאת בשל הממס שאינו מכיל

משמר. יש לזרוק כל פתרון שנשאר.

אין להשתמש בתמיסה המומסת אם היא מכילה חלקיקים או אינה צלולה.

אין להשתמש במוצר לאחר תאריך התפוגה המודפס על התווית. אל תשתמש ב-Luveris אם אתה מבחין בסימנים גלויים של הידרדרות או נזק למיכל.

אל תשתמש ב-Luveris על אף אחד אחר. זה לשימושך בלבד.


חשוב שהידיים והפריטים שבהם אתם משתמשים יהיו נקיים ככל האפשר.

## 2. הרכיבו את כל מה שצריך.

אנא שימו לב כי ספוגיות אלכוהול, מזרקים ומחטים אינם כלולים באריזה. מצא אזור נקי ופרש הכל:

- שתי ספוגיות אלכוהול,
- בקבוקון ממס אחד,
- בקבוקון אחד המכיל את המוצר התרופתי,
- מזרק אחד,
- מחט אחת גדולה לשיקום,
- מחט עדינה להזרקה תת עורית.


## 3. יצירת הממס:



הסר את מכסה המגן מבקבוקון הממס. חבר את המחט להרכבה (המחט הגדולה יותר) למזרק ושאו מעט אוויר לתוך המזרק על ידי משיכת הבוכנה עד לסימון של כ-1 מ"ל. לאחר מכן, הכנס את המחט לתוך הבקבוקון, דחוף את הבוכנה כדי להוציא את האוויר, הפוך את הבקבוקון ומשוך בעדינות את כל הממס.

הנח את המזרק בזירות על משטח העבודה והקפד לא לגעת במחט.

## 4. הכנת תמיסת ההזרקה:



הסר את מכסה המגן מבקבוקון האבקה של Luveris, הרם את המזרק שלך והזריק באיטיות את הממס לתוך הבקבוקון של Luveris. סובב בעדינות

B 11 Talavera Road סוויטה

1, ברמה 1, Pty Ltd

MerckHealthcare

לבירורים התקשרו: 1800 633 463

Macquarie Park NSW2113

אימייל:

medinfo.australia@merckgroup.com

**מסופק בניו זילנד על ידי Luveris**

לוגיטיקה של שירותי בריאות

אוקלנד, Airport Oaks

58 Richard Pearse Drive

לבירורים חייגו: 0800 426 252

אימייל:

medinfo.australia@merckgroup.com

## מספר רישום אוסטרלי

AUST R95042

עלון זה הוכן בפברואר 2020.

A012-0220

## הוראות עבור

להשתמש

## כיצד עליי לתת את 75 IU

Luveris

ניתן בהזרקה מתחת לעור. כל בקבוקון

מיועד לשימוש חד פעמי בלבד

Luveris

לפעמים הזריקה תינתן לך על ידי

רופא או אחות, או שאתה או בן זוגך

עשויים להיות מאומנים לתת את

הזריקה בבית.

אם אתה נותן לעצמך את Luveris, אנא

קרא בעיון את ההוראות הבאות:

עקוב אחר ההוראות שלהלן

לערבוב והזרקה של Luveris.

**1. שטפו ידיים.**

**אין לאחסן אותו או כל תרופה אחרת  
בחדר האמבטיה או ליד כיור.**

**אל תשאיר אותו במכונית.**

**שמור את התרופה במקום שבו ילדים לא  
יכולים להגיע אליה.**

ארון נעול בגובה של מטר וחצי מעל  
הקרקה הוא מקום טוב לאחסון  
תרופות.

## רשות

אם אתה מזריק לעצמך, עליך להשליך את  
כל החומרים החדים ליחידה לסילוק.

כל בקבוקון של תרופה מיועד  
לשימוש חד פעמי בלבד. יש לזרוק כל  
תרופה שנותרה לאחר ההזרקה.

**אם יש לך Luveris שפג תוקפו או  
שנשאר מהטיפול שלך, הפנה זאת  
למרפאה שלך.**

## תיאור מוצר

### כמו מה זה נראה

היא אבקה לבנה סטרילית בבקבוקון  
Luveris

כל בקבוקון של Luveris מכיל 75 IU  
לוטרופין אלפא.

זמין באריזות של בקבוקון אחד. כל  
חבילה מכילה גם בקבוקון של 1 מ"ל  
מים להזרקה Luveris

### רכיבים

**רכיב פעיל:**

• Lutropinalpha (rch)


**חומרים לא פעילים:**

- פוליסורבט 20
- דיהידראט נתרן פוספט
- די-בסיסי
- מונוהידראט נתרן פוספט
- חד-בסיסי
- מתיונין
- סוכרוז
- חומצה זרחתית
- נתרן הידרוקסידי.

## ספק


**מסופק באוסטרליה על ידי Luveris**

מבלי להסיר את המזרק. אל תנער.  
האבקה צריכה להתמוסס לתמיסה  
שקופה מיד. אין להשתמש אם הפתרון  
אינו ברור. ניתן להמיס עד 3 מיכלים של  
אבקה ב-1 מ"ל של ממש.




הפוך את הבקבוקון הפוך, משוך  
בעדינות את התמיסה חזרה לתוך  
המזרק.

### 5. הזרקה:



החלף את המחט למחט הדקה והסר  
בועות אוויר כלשהן: אם אתה רואה  
בועות אוויר במזרק, החזק את המזרק  
כשהמחט מופנית כלפי מעלה והקיפץ  
בעדינות את המזרק עד שכל האוויר  
נאסף בחלק העליון. דחוף בעדינות את  
הבוכנה עד שבועות האוויר נעלמו.



הזרקי מיד את התמיסה: הרופא או  
האחות שלך כבר ייעצו לך היכן להזריק  
(למשל בטן, החלק הקדמי של הירך).  
נגב את האזור הנבחר עם מקלון  
אלכוהול. צבוט בחוזקה את העור יחד  
והכנס את המחט בזווית של  $45^\circ$  עד  
 $90^\circ$  תוך שימוש בתנועה דמוית חץ.  
להזריק מתחת לעור, כפי שלימדו אותך.  
אין להזריק ישירות לווריד. הזרקו את  
התמיסה על ידי לחיצה עדינה על  
הבוכנה. הקדש כמה זמן שאתה צריך  
כדי להזריק את כל התמיסה.

משוך מיד את המחט ונקה את העור  
בעזרת ספוגית אלכוהול בתנועות  
סיבוביות.

### 6. השלך את כל הפריטים המשומשים:

לאחר שסיימתם את ההזרקה, השליכו  
מיד את כל המחטים ומיכלי הזכוכית  
הריקים במיכל חדים. יש להשליך כל  
תמיסה שאינה בשימוש.