Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682315.html

Mebendazol

uitgesproken als (me ben' da zole)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Mebendazol wordt gebruikt om verschillende soorten worminfecties te behandelen. Mebendazol (Vermox) wordt gebruikt voor de behandeling van rondworm- en zweepworminfecties. Mebendazol (Emverm) wordt gebruikt voor de behandeling van pinworm-, zweepworm-, rondworm- en haakworminfecties. Mebendazol zit in een klasse van medicijnen die anthelmintica worden genoemd. Het werkt door de wormen te doden.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Mebendazol wordt geleverd als een kauwtablet. Wanneer mebendazol (Emverm) wordt gebruikt voor de behandeling van zweepwormen, rondwormen en mijnwormen, wordt het gewoonlijk twee keer per dag ingenomen, 's morgens en' s avonds, gedurende 3 dagen. Wanneer mebendazol (Emverm) wordt gebruikt om pinworm te behandelen, wordt het meestal als een enkele (eenmalige) dosis ingenomen. Mebendazol (Vermox) wordt meestal ingenomen als een enkele (eenmalige) dosis. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem mebendazol precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Als u kauwtabletten van mebendazol (Emverm) gebruikt, mag u de tabletten kauwen, ze heel doorslikken of ze fijnmaken en door voedsel mengen.

U moet de kauwtabletten van mebendazol (Vermox) grondig kauwen; slik de tablet niet in zijn geheel door. Als u de tablet echter niet kunt kauwen, kunt u de tablet op een lepel plaatsen en een kleine hoeveelheid water (2 tot 3 ml) aan de tablet toevoegen met behulp van een doseerspuit. Na 2 minuten zal de tablet het water opnemen en een zachte massa worden die moet worden doorgeslikt.

Als uw toestand niet verbetert of verslechtert, neem dan contact op met uw arts.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Mebendazol wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door lintwormen. Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u mebendazol inneemt,

- vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor mebendazol, andere medicijnen of een van de bestanddelen van mebendazol kauwtabletten. Vraag uw apotheker om een lijst van de ingrediënten.
- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: cimetidine (Tagamet) of metronidazol (Flagyl, in Pyrera). Uw arts moet u mogelijk zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
- vertel het uw arts als u een maag- of leveraandoening heeft of ooit heeft gehad.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u mebendazol gebruikt, neem dan contact op met uw arts.
- u moet weten dat u naast uw behandeling met mebendazol ook maatregelen moet nemen om herinfectie en infectie van andere mensen te voorkomen. U moet uw handen en vingernagels vaak met zeep wassen, vooral voor het eten en na gebruik van het toilet. Praat met uw arts over andere maatregelen om herinfectie en verspreiding van de infectie naar anderen te voorkomen. Zorg ervoor dat u de instructies van uw arts zorgvuldig opvolgt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Mebendazol kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- diarree
- maagpijn, ongemak of zwelling
- misselijkheid
- braken
- verlies van eetlust

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag een medische spoedbehandeling:

- toevallen
- uitslag
- netelroos
- kortademigheid
- moeite met ademhalen of slikken
- koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie

Mebendazol kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

- diarree
- maagpijn, ongemak of zwelling
- misselijkheid
- braken

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om uw reactie op mebendazol te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Uw recept is waarschijnlijk niet navulbaar. Als u nog steeds symptomen van infectie heeft nadat u klaar bent met de mebendazol, neem dan contact op met uw arts.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Emverm®
- Vermox®

Laatst herzien - 15-06-2017

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022