Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682003.html

メゲストロール
（me jes'trol）と発音します

なぜこの薬が処方されているのですか？

メゲストロール錠は、進行性乳がんおよび進行性子宮内膜がん（子宮内膜に発生するがん）によって引き起こされる症状を緩和し、苦痛を軽減するために使用されます。メゲストロール懸濁液は、後天性免疫不全症候群（AIDS）患者の食欲不振、栄養失調、および重度の体重減少を治療するために使用されます。メゲストロールは、この状態をまだ発症していない患者の食欲不振および重度の体重減少を防ぐために使用されるべきではありません。メゲストロールは、ヒトホルモンのプロゲステロンの人工バージョンです。がんの成長に関与する女性ホルモンに影響を与えることにより、乳がんと子宮内膜がんを治療します。食欲を増進させることで体重増加を促進します。

わあ、この薬を使うべきですか？

メゲストロールは、錠剤、経口懸濁液（液体）、および濃縮経口懸濁液（Megace ES）として提供され、経口摂取できます。錠剤と懸濁液は通常、1日に数回服用します。濃縮懸濁液は通常1日1回服用します。毎日ほぼ同じ時間にメゲストロールを服用してください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにメゲストロールを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

毎回使用する前に液体をよく振って、薬剤を均一に混合します。

濃縮懸濁液は、通常の懸濁液とは異なる投与量で使用されます。医師に相談せずに、一方から他方に切り替えないでください。

医師に相談せずにメゲストロールの服用を中止しないでください。

この薬の用途

メゲストロールは、がん、前立腺肥大症（前立腺と呼ばれる男性の生殖腺の肥大）、子宮内膜増殖症（子宮の内側を覆う組織の種類が体の他の領域で成長する状態）の患者の栄養失調の治療にも使用されることがあります。子宮内膜増殖症（子宮内膜の異常増殖）。あなたの状態のためにこの薬を使用することのリスクについてあなたの医者に相談してください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

メゲストロールを服用する前に、

- メゲストロール、他の薬、またはメゲストロール錠、懸濁液、または濃縮懸濁液に含まれる不活性成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。不活性成分のリストについては、医師または薬剤師にご相談ください。
- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、および服用中または服用予定のハーブ製品を伝えてください。抗生物質、インジナビル（Crixivan）、およびワルファリン（Coumadin、Jantoven）に必ず言及してください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を調整するか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 体内のどこかに血栓、脳卒中、糖尿病、腎臓病、肝臓病があるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。メゲストロールを服用中に妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してください。メゲストロールは胎児に害を及ぼす可能性があります。メゲストロールを服用している間は授乳しないでください。
- 65歳以上の場合、メゲストロールを服用することのリスクと利点について医師に相談してください。高齢者は通常、食欲不振や体重減少を治療するためにメゲストロールを服用するべきではありません。
- メゲストロールは女性の通常の月経周期（期間）を妨げる可能性があることを知っておく必要があります。ただし、妊娠できないと思い込まないでください。妊娠を防ぐために避妊の信頼できる方法を使用してください。
- 治療中または治療直後に歯科手術を含む手術を受けている場合は、メゲストロールを服用していることを医師または歯科医に伝えてください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

メゲストロールは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- インポテンス
- 性的欲求の減少
- 予期しない膣からの出血
- 眠りにつくことや眠り続けることの難しさ
- ガス
- 発疹

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 吐き気
- 嘔吐
- めまい
- 弱点
- ぼやけた視界
- 極端な喉の渇き
- 頻尿
- 極端な空腹
- 下肢痛
- 呼吸困難
- 鋭く、押しつぶすような胸の痛みまたは胸の重さ
- 遅いまたは難しいスピーチ
- 腕や脚の脱力感やしびれ

メゲストロールは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた場合、

発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。

- 下痢
- 吐き気
- 胃痛
- 呼吸困難
- 咳
- エネルギーの欠乏
- 不安定な歩行
- 胸痛

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、メゲストロールに対する体の反応を確認するために、特定の臨床検査を命じることがあります。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- メガス®¶
- メガス®ES

¶-このブランドの製品はもう市場に出ていません。一般的な代替手段が利用できる場合があります。

最終改訂日-2019年12月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製

商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日