TITLE - MEGESTROL ACETATE / MEGACE
MEDICATION PATIENT INFORMATION
IN PORTUGUESE

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682003.html

Megestrol

pronunciado como (me jes' trol)

por que este medicamento é prescrito?

Os comprimidos de megestrol são usados para aliviar os sintomas e reduzir o sofrimento causado pelo câncer de mama avançado e câncer de endométrio avançado (câncer que começa no revestimento do útero). A suspensão de megestrol é usada para tratar a perda de apetite, desnutrição e perda de peso grave em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Megestrol não deve ser usado para prevenir perda de apetite e perda de peso severa em pacientes que ainda não desenvolveram esta condição. Megestrol é uma versão artificial do hormônio humano progesterona. Trata o câncer de mama e câncer de endométrio, afetando os hormônios femininos envolvidos no crescimento do câncer. Aumenta o ganho de peso aumentando o apetite.

como este medicamento deve ser usado?

Megestrol vem como um comprimido, uma suspensão oral (líquido) e uma suspensão oral concentrada (Megace ES) para tomar por via oral. Os comprimidos e a suspensão são geralmente tomados várias vezes ao dia. A suspensão concentrada é geralmente tomada uma vez por dia. Tome megestrol mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome megestrol exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Agite bem o líquido antes de cada uso para misturar o medicamento uniformemente.

A suspensão concentrada é utilizada em dosagens diferentes da suspensão regular. Não mude de um para o outro sem falar com o seu médico.

Não pare de tomar megestrol sem falar com o seu médico.

outros usos para este medicamento

O megestrol também é usado às vezes para tratar desnutrição em pacientes com câncer, hipertrofia prostática (aumento de uma glândula reprodutiva masculina chamada próstata), endometriose (condição na qual o tipo de tecido que reveste o útero cresce em outras áreas do corpo) e hiperplasia endometrial (crescimento excessivo do revestimento do útero). Converse com seu médico sobre os riscos de usar este medicamento para sua condição.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar megestrol,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao megestrol, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes inativos dos comprimidos, suspensão ou suspensão concentrada de megestrol. Peça ao seu médico ou farmacêutico uma lista dos ingredientes inativos.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar antibióticos, indinavir (Crixivan) e varfarina (Coumadin, Jantoven). Seu médico pode precisar ajustar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se você tem ou já teve um coágulo de sangue em qualquer parte do corpo, acidente vascular cerebral, diabetes ou doença renal ou hepática.
- informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar megestrol, contacte o seu médico imediatamente. Megestrol pode prejudicar o feto. Não amamente enquanto estiver a tomar megestrol.
- converse com seu médico sobre os riscos e benefícios de tomar megestrol se você tiver 65 anos de idade ou mais. Os adultos mais velhos geralmente não devem tomar megestrol para tratar a perda de apetite e perda de peso.
- você deve saber que megestrol pode interferir com o ciclo menstrual normal (período) em mulheres. No entanto, você não deve assumir que não pode engravidar. Use um método confiável de controle de natalidade para evitar a gravidez.
- se for submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, durante ou logo após o tratamento, informe o médico ou dentista que está a tomar megestrol.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Megestrol pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- impotência
- desejo sexual diminuído
- sangramento vaginal inesperado
- dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo
- gás
- irritação na pele

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

- náusea
- vômito
- tontura
- fraqueza
- visão embaçada
- sede extrema
- micção frequente
- fome extrema
- dor na perna
- dificuldade para respirar
- dor no peito aguda e esmagadora ou peso no peito
- fala lenta ou difícil
- fraqueza ou dormência de um braço ou perna

Megestrol pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima desmaiou,

teve uma convulsão, tem dificuldade para respirar ou não pode ser acordado, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

- diarréia
- náusea
- dor de estômago
- falta de ar
- tosse
- falta de energia
- caminhada instável
- dor no peito

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode pedir alguns exames de laboratório para verificar a resposta do seu corpo ao megestrol.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Megace®¶
- Megace®ES

¶-Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.

Última revisão - 15/12/2019

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação

para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022