

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Megestrol

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682003.html>

Megestrol pronunțat ca (me jes' trol)

de ce este prescris acest medicament?

Comprimatele de Megestrol sunt utilizate pentru ameliorarea simptomelor și reducerea suferinței cauzate de cancerul de sân în stadiu avansat și cancerul endometrial avansat (cancer care începe în mucoasa uterului). Suspensia de megestrol este utilizată pentru a trata pierderea poftei de mâncare, malnutriția și pierderea severă în greutate la pacienții cu sindrom de imunodeficiență dobândită (SIDA). Megestrol nu trebuie utilizat pentru a preveni pierderea poftei de mâncare și pierderea severă în greutate la pacienții care nu au dezvoltat încă această afecțiune. Megestrol este o versiune artificială a hormonului uman progesteron. Tratează cancerul de sân și cancerul endometrial prin afectarea hormonilor feminini implicați în creșterea cancerului. Crește creșterea în greutate prin creșterea apetitului.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Megestrol vine sub formă de tablete, suspensie orală (lichid) și suspensie orală concentrată (Megace ES) pentru administrare pe cale orală. Comprimatele și suspensia se iau de obicei de mai multe ori pe zi. Suspensia concentrată se ia de obicei o dată pe zi. Luați megestrol aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați megestrol exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Agitați bine lichidul înainte de fiecare utilizare pentru a amesteca medicamentul în mod uniform.

Suspensia concentrată este utilizată în doze diferite decât suspensia obișnuită. Nu treceți de la unul la altul fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Nu încetați să luați megestrol fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Megestrol este, de asemenea, uneori utilizat pentru a trata malnutriția la pacienții cu cancer, hipertrofie de prostată (mărirea unei glande reproducătoare masculine numită prostată), endometrioză (afecțiune în care tipul de țesut care căptușește uterul crește în alte zone ale corpului) și hiperplazie endometrială (creșterea excesivă a mucoasei uterului). Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua megestrol,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la megestrol, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele inactive din comprimatele, suspensiile sau suspensiile concentrate de megestrol. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru o listă a ingredientelor inactive.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați antibiotice, indinavir (Crixivan) și warfarină (Coumadin, Jantoven). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să ajusteze dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un cheag de sânge în orice parte a corpului, un accident vascular cerebral, diabet sau boli ale rinichilor sau ficatului.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați megestrol, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Megestrolul poate dăuna fătului. Nu alăptați în timp ce luați megestrol.
- discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile și beneficiile luării megestrol dacă aveți 65 de ani sau mai mult. Adulții în vârstă nu ar trebui să ia de obicei megestrol pentru a trata pierderea poftei de mâncare și pierderea în greutate.
- trebuie să știți că megestrolul poate interfera cu ciclul menstrual normal (perioada) la femei. Cu toate acestea, nu trebuie să presupuneți că nu puteți rămâne însărcinată. Utilizați o metodă fiabilă de control al nașterii pentru a preveni sarcina.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, în timpul sau la scurt timp după tratament, spuneți medicului sau stomatologului că luați megestrol.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Megestrol poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispere:

- impotență
- scăderea dorinței sexuale
- sângerare vaginală neașteptată
- dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit
- gaz
- eczemă

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:

- greață
- vărsături
- amețelă
- slăbiciune
- vedere încetățată
- sete extremă
- Urinare frecventă
- foame extremă
- dureri de picioare
- respirație dificilă
- durere toracică ascuțită, zdrobitoare sau greutate în piept
- vorbire lentă sau dificilă
- slăbiciune sau amorțelă a unui braț sau picior

Megestrol poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit,

a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezit, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

- diaree
- greață
- dureri de stomac
- dificultăți de respirație
- tuse
- lipsa de energie
- mers nesigur
- dureri în piept

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate comanda anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la megestrol.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Megace®[¶]
- Megace®ES

[¶]-Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.

Ultima revizuire - 15.12.2019

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022