TITLE - MEGESTROL ACETATE / MEGACE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SPANISH





<u>Casa</u> → <u>Medicamentos</u>, hierbas y suplementos → megestrol

Source: U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682003.html

megestrol

pronunciado como (me jes' trol)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Las tabletas de megestrol se usan para aliviar los síntomas y reducir el sufrimiento causado por el cáncer de mama avanzado y el cáncer de endometrio avanzado (cáncer que comienza en el revestimiento del útero). La suspensión de megestrol se usa para tratar la pérdida de apetito, la desnutrición y la pérdida de peso severa en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Megestrol no debe usarse para prevenir la pérdida de apetito y la pérdida de peso severa en pacientes que aún no han desarrollado esta afección. Megestrol es una versión artificial de la hormona humana progesterona. Trata el cáncer de mama y el cáncer de endometrio al afectar las hormonas femeninas involucradas en el crecimiento del cáncer. Aumenta el aumento de peso al aumentar el apetito.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

Megestrol viene en forma de tableta, suspensión oral (líquido) y suspensión oral concentrada (Megace ES) para tomar por vía oral. Las tabletas y la suspensión generalmente se toman varias veces al día. La suspensión concentrada generalmente se toma una vez al día. Tome megestrol aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome megestrol exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Agite bien el líquido antes de cada uso para mezclar el medicamento de manera uniforme.

La suspensión concentrada se usa en diferentes dosis que la suspensión normal. No cambie de uno a otro sin hablar con su médico.

No deje de tomar megestrol sin hablar con su médico.

Otros usos de este medicamento

El megestrol también se usa a veces para tratar la desnutrición en pacientes con cáncer, hipertrofia prostática (agrandamiento de una glándula reproductiva masculina llamada próstata), endometriosis (afección en la que el tipo de tejido que recubre el útero crece en otras áreas del cuerpo) y hiperplasia endometrial (crecimiento excesivo del revestimiento del útero). Hable con su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar megestrol,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al megestrol, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes inactivos de las tabletas, la suspensión o la suspensión concentrada de megestrol. Pídale a su médico o farmacéutico una lista de los ingredientes inactivos.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar los antibióticos, el indinavir (Crixivan) y la warfarina (Coumadin, Jantoven). Es posible que su médico necesite ajustar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido un coágulo de sangre en cualquier parte del cuerpo, un derrame cerebral, diabetes o enfermedad renal o hepática.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma megestrol, llame a su médico de inmediato. El megestrol puede dañar al feto. No amamante mientras esté tomando megestrol.
- Hable con su médico sobre los riesgos y beneficios de tomar megestrol si tiene 65 años o más. Los adultos mayores generalmente no deben tomar megestrol para tratar la pérdida de apetito y la pérdida de peso.
- Debe saber que el megestrol puede interferir con el ciclo menstrual normal (período) en las mujeres. Sin embargo, no debe asumir que no puede quedar embarazada. Use un método confiable de control de la natalidad para prevenir el embarazo.
- Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, durante o poco después de su tratamiento, informe a su médico o dentista que está tomando megestrol.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El megestrol puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- impotencia
- disminución del deseo sexual
- sangrado vaginal inesperado
- dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido
- gas
- erupción

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato:

- náuseas
- vómitos
- mareo
- debilidad
- visión borrosa
- sed extrema
- micción frecuente
- hambre extrema
- dolor de pierna
- respiración dificultosa
- dolor de pecho agudo y aplastante o pesadez en el pecho
- habla lenta o difícil
- debilidad o entumecimiento de un brazo o una pierna

El megestrol puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se ha derrumbado,

tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame de inmediato a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

- Diarrea
- náuseas
- dolor de estómago
- dificultad para respirar
- tos
- falta de energía
- caminar inestable
- Dolor de pecho

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo al megestrol.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Megace®¶
- Megace®ES
- ¶-Este producto de marca ya no está en el mercado. Es posible que haya alternativas genéricas disponibles.

Última revisión - 15/12/2019

Aprende a citar esta página



Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación

para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022