Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682003.html

Megestrol

uttalas som (jag jess troll)

hur är denna medicin utskriven?

Megestrol tabletter används för att lindra symtomen och minska det lidande som orsakas av avancerad bröstcancer och avancerad endometriecancer (cancer som börjar i livmoderns slemhinna). Megestrol suspension används för att behandla förlust av aptit, undernäring och allvarlig viktminskning hos patienter med förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Megestrol ska inte användas för att förhindra aptitlöshet och allvarlig viktminskning hos patienter som ännu inte har utvecklat detta tillstånd. Megestrol är en konstgjord version av det mänskliga hormonet progesteron. Det behandlar bröstcancer och endometriecancer genom att påverka kvinnliga hormoner som är involverade i cancertillväxt. Det ökar viktökningen genom att öka aptiten.

hur ska detta läkemedel användas?

Megestrol kommer som en tablett, en oral suspension (vätska) och en koncentrerad oral suspension (Megace ES) att ta genom munnen. Tabletterna och suspensionen tas vanligtvis flera gånger om dagen. Den koncentrerade suspensionen tas vanligtvis en gång om dagen. Ta megestrol vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta megestrol exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Skaka vätskan väl före varje användning för att blanda läkemedlet jämnt.

Den koncentrerade suspensionen används i andra doser än den vanliga suspensionen. Byt inte från den ena till den andra utan att prata med din läkare.

Sluta inte ta megestrol utan att prata med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Megestrol används också ibland för att behandla undernäring hos patienter med cancer, prostatahypertrofi (förstoring av en manlig reproduktionskörtel som kallas prostata), endometrios (tillstånd där den typ av vävnad som kantar livmodern växer i andra delar av kroppen) och endometriehyperplasi (överväxt av livmoderns slemhinna). Tala med din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar megestrol,

- Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot megestrol, andra läkemedel eller någon av de inaktiva ingredienserna i megestrol tabletter, suspension eller koncentrerad suspension. Fråga din läkare eller apotekspersonal om en lista över de inaktiva ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna antibiotika, indinavir (Crixivan) och warfarin (Coumadin, Jantoven). Din läkare kan behöva justera doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en blodpropp någonstans i kroppen, stroke, diabetes eller njur- eller leversjukdom.
- berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar megestrol, kontakta din läkare omedelbart. Megestrol kan skada fostret. Amma inte medan du tar megestrol.
- prata med din läkare om riskerna och fördelarna med att ta megestrol om du är 65 år eller äldre. Äldre vuxna ska vanligtvis inte ta megestrol för att behandla aptitlöshet och viktminskning.
- du bör veta att megestrol kan störa den normala menstruationscykeln (mens) hos kvinnor. Du ska dock inte utgå från att du inte kan bli gravid. Använd en pålitlig preventivmetod för att förhindra graviditet.
- om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, under eller strax efter din behandling, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar megestrol.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Megestrol kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- impotens
- minskad sexlust
- oväntad vaginal blödning
- svårt att somna eller att sova
- gas
- utslag

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din läkare omedelbart:

- illamående
- kräkningar
- yrsel
- svaghet
- suddig syn
- extrem törst
- regelbunden urination
- extrem hunger
- bensmärta
- svårt att andas
- skarp, förkrossande bröstsmärta eller tyngd i bröstet
- långsamt eller svårt tal
- svaghet eller domningar i en arm eller ett ben

Megestrol kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat,

haft ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

- diarre
- illamående
- magont
- andnöd
- hosta
- brist på energi
- ostadig gång
- bröstsmärta

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps svar på megestrol.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Megace®¶
- Megace®ES

¶-Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.

Senast reviderad - 12/15/2019

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering

för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022