Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682003.html

Megestrol

ออกเสียงว่า (ฉัน jes 'trol)

hy เป็นยานี้กำหนด?

ยาเม็ด Megestrol ใช้เพื่อบรรเทาอาการและบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดจากมะเร็งเต้านมขั้นสูงและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกขั้นสูง (มะเร็งที่เริ่มในเยื่อบุโพรงมดลูก) สารแขวนลอย Megestrol ใช้รักษาอาการเบื่ออาหาร ภาวะทุพโภชนาการ และการลดน้ำหนักอย่างรุนแรงในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ไม่ควรใช้ Megestrol เพื่อป้องกันการสูญเสียความกระหายและการลดน้ำหนักอย่างรุนแรงในผู้ป่วยที่ยังไม่เป็นโรคนี้ Megestrol เป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มนุษย์สร้างขึ้น รักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกโดยส่งผลต่อฮอร์โมนเพศหญิงที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของมะเร็ง จะเพิ่มน้ำหนักโดยเพิ่มความอยากอาหาร

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Megestrol มาในรูปแบบแท็บเล็ต, สารแขวนลอยในช่องปาก (ของเหลว) และสารแขวนลอยในช่องปากแบบเข้มข้น (Megace ES) ที่จะใช้ทางปาก ยาเม็ดและสารแขวนลอยมักใช้วันละหลายครั้ง การระงับแบบเข้มข้นมักใช้วันละครั้ง ทานเมสเตอรอลในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ megestrol ตรงตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

เขย่าของเหลวให้ดีก่อนใช้แต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสม่ำเสมอ

สารแขวนลอยเข้มข้นใช้ในปริมาณที่แตกต่างจากสารแขวนลอยปกติ อย่าเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

อย่าหยุดทานเมสเตอรอลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สำหรับยานี้

บางครั้งใช้ Megestrol เพื่อรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมากโต (การขยายตัวของต่อมลูกหมากของผู้ชายที่เรียกว่าต่อมลูกหมาก) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (เงื่อนไขที่ชนิดของเนื้อเยื่อที่เป็นเส้นของมดลูกเติบโตในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย) และ hyperplasia เยื่อบุโพรงมดลูก (overgrowth ของเยื่อบุมดลูก) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้สำหรับสภาพของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเมสเตอรอล

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เมเจสโทรล ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมที่ไม่ออกฤทธิ์ใดๆ ในยาเม็ดเมเจสโทรล สารแขวนลอย หรือสารแขวนลอยแบบเข้มข้น สอบถามรายการส่วนผสมที่ไม่ใช้งานจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาปฏิชีวนะ indinavir (Crixivan) และ warfarin (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องปรับขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวัง

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยมีลิ่มเลือดที่ส่วนใดในร่างกาย โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน หรือโรคไตหรือตับ
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานเมสเตอรอล ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Megestrol อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ อย่าให้นมลูกในขณะที่ทานเมเจสโทรล

- พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้เมสเตอรอลหากคุณอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุมักไม่ควรใช้เมเจสโทรลเพื่อรักษาอาการเบื่ออาหารและน้ำหนักลด
- คุณควรรู้ว่าเมเจสโทรลอาจรบกวนรอบประจำเดือน (ช่วงเวลา) ปกติในผู้หญิง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ใช้วิธีการคุมกำเนิดที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

- หากคุณกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการผ่าตัดทางทันตกรรม ในระหว่างหรือหลังการรักษา ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยาเมเจสโทรล

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Megestrol อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ความอ่อนแอ
- ความต้องการทางเพศลดลง
- เลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่คาดคิด
- นอนหลับยากหรือหลับยาก
- แก๊ส
- ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- อาการวิงเวียนศีรษะ
- ความอ่อนแอ
- มองเห็นภาพซ้อน
- กระหายน้ำมาก
- ปัสสาวะบ่อย
- หิวมาก
- ปวดขา
- หายใจลำบาก
- คมชัด เจ็บหน้าอกกดทับ หรือแน่นหน้าอก
- พูดช้าหรือพูดยาก
- ความอ่อนแรงหรือชาที่แขนหรือขา

Megestrol อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยานี้?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากเหยื่อล้มลง

มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

- ท้องเสีย
- คลื่นไส้
- อาการปวดท้อง
- หายใจถี่
- ไอ
- ขาดพลังงาน
- เดินไม่นิ่ง
- อาการเจ็บหน้าอก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อเมสโทรล

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- Megace®¶
- Megace®ES

¶-สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ

สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022