TITLE - MEGESTROL ACETATE / MEGACE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN CHINESE





家 →药物、草药和补充剂 → 甲地孕酮

Source: U.S. National Library of Medicine

本页网址: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682003.html

甲地孕酮

发音为 (me jes' trol)

为什么要开这种药?

甲地孕酮片用于缓解症状并减少晚期乳腺癌和晚期子宫内膜癌(始于子宫内膜的癌症)引起的痛苦。甲地孕酮混悬液用于治疗获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 患者的食欲不振、营养不良和严重体重减轻。对于尚未出现这种情况的患者,不应使用甲地孕酮来预防食欲不振和体重严重减轻。甲地孕酮是人类激素黄体酮的人造版本。它通过影响参与癌症生长的女性激素来治疗乳腺癌和子宫内膜癌。它通过增加食欲来增加体重。

这个药应该怎么用?

甲地孕酮以片剂、口服混悬液(液体)和浓缩口服混悬液(Megace ES)的形式口服。片剂和悬浮液通常每天服用数次。浓缩的悬浮液通常每天服用一次。每天大约在同一时间服用甲地孕酮。仔细遵循处方标签上的说明,并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用甲地孕酮。不要多吃或少吃,也不要比医生开的更频繁。

每次使用前充分摇匀药液,使药物混合均匀。

浓缩悬浮液的使用剂量与普通悬浮液不同。不要在未咨询医生的情况下从一种切换到另一种。

不要在未咨询医生的情况下停止服用甲地孕酮。

该药的其他用途

甲地孕酮有时也用于治疗癌症患者的营养不良、前列腺肥大(称为前列腺的男性生殖腺肿大)、子宫内膜异位症(子宫内衬的组织类型在身体其他部位生长的情况)和子宫内膜增生(子宫内膜过度生长)。与您的医生讨论使用这种药物治疗您的病情的风险。

22 年 4 月 15 日下午 2:32 甲地孕酮: Medline Plus 药物信息

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用甲地孕酮之前,

- 如果您对甲地孕酮、任何其他药物或甲地孕酮片剂、混悬液或浓缩混悬液中的任何非活性成分过敏,请告诉您的医生和药剂师。请向您的医生或药剂师索取非活性成分的清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。一定要提到抗生素、茚地那韦 (Crixivan) 和华法林 (Coumadin, Jantoven)。您的医生可能需要调整您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 如果您有或曾经在身体任何部位出现血栓、中风、糖尿病或肾脏或肝脏疾病,请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳,请告诉您的医生。如果您在服用甲地孕酮时怀孕,请立即致电您的医生。甲地孕酮可能会伤害胎儿。服用甲地孕酮时不要母乳喂养。
- 如果您 65 岁或以上,请与您的医生讨论服用甲地孕酮的风险和益处。老年人通常不应服用甲地孕酮 来治疗食欲不振和体重减轻。
- 您应该知道,甲地孕酮可能会干扰女性的正常月经周期(经期)。但是,您不应该假设您不会怀孕。使用可靠的避孕方法来预防怀孕。
- 如果您在治疗期间或治疗后不久接受手术,包括牙科手术,请告诉医生或牙医您正在服用甲地孕酮。

我应该遵循特殊的饮食说明吗?

除非您的医生另有说明,否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办?

记住后立即服用错过的剂量。但是,如果快到下一次服药的时间了,请跳过错过的服药并继续您的常规服药 计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗?

甲地孕酮可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失,请告诉您的医生:

- 阳痿
- 性欲下降
- 意外的阴道出血
- 难以入睡或保持睡眠
- 气体
- 皮疹

22 年 4 月 15 日下午 2:32 甲地孕酮: Medline Plus 药物信息

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状,请立即致电您的医生:

- 恶心
- 取計
- 头晕
- 弱点
- 模糊的视野
- 极度口渴
- 尿频
- 极度饥饿
- 腿痛
- 呼吸困难
- 胸部剧烈、剧烈的胸痛或沉重感
- 缓慢或困难的讲话
- 手臂或腿无力或麻木

甲地孕酮可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题,请致电您的医生。

我应该知道这种药物的储存和处置吗?

将这种药物放在它进来的容器中,紧紧关闭,并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下,远离过 多的热量和水分(不要放在浴室里)。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要,因为许多容器(例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器)不适合儿童使用,而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒,请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

不需要的药物应以特殊方式处理,以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是,您不应该将这种药物冲入马桶。相反,处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门,了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站(http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p])如果您无权访问回收计划,请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量,请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help[https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经倒下,

癫痫发作、呼吸困难或无法唤醒,请立即拨打911拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括以下内容:

- 腹泻
- 恶心
- 肚子痛
- 气促
- 咳嗽
- 能源短缺
- 走路不稳
- 胸痛

我应该知道其他信息吗?

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些实验室测试,以检查您的身体对甲地孕酮的反应。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药(非处方药)以及任何产品(如维生素、矿物质或其他膳食补充剂)的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时,您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 麦格西®¶
- 麦格西®ES
- ¶-该品牌产品已不再上市。可能有通用的替代品。

最后修订 - 2019年12月15日

了解如何引用此页面



美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有,2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022年3月25日