Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682220.html

メルファラン
（mel'fa lan）と発音します

重要な警告：

メルファランは、骨髄中の血球数を大幅に減少させる可能性があります。これは特定の症状を引き起こす可能性があり、深刻な感染症や出血を発症するリスクを高める可能性があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。発熱、喉の痛み、進行中の咳やうっ血、またはその他の感染症の兆候。異常な出血またはあざ; 血まみれまたは黒、タール状の便; 吐血; またはコーヒーかすに似た吐血または茶色の物質。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、治療前と治療中に定期的に臨床検査を行い、血球がこの薬の影響を受けているかどうかを確認します。

メルファランは、他の癌を発症するリスクを高める可能性があります。メルファランを服用するリスクについて医師に相談してください。

なぜこの薬が処方されているのですか？

メルファランは、多発性骨髄腫（骨髄のがんの一種）の治療に使用されます。メルファランは、特定の種類の卵巣がん（卵子が形成される女性の生殖器で発生するがん）の治療にも使用されます。メルファランは、アルキル化剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それはあなたの体の癌細胞の成長を止めるか遅くすることによって働きます。

わあ、この薬を使うべきですか？

メルファランは、口から摂取するための錠剤として提供されます。通常、空腹時に1日1回服用します。治療の長さは、服用している薬の種類、体がそれらにどれだけうまく反応するか、そしてあなたが持っている癌の種類によって異なります。毎日ほぼ同じ時間にメルファランを服用してください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにメルファランを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

治療に対する反応や経験する副作用によっては、医師が治療を遅らせるか、メルファランの投与量を調整する必要がある場合があります。治療中の気分について医師に相談してください。医師に相談せずにメルファランの服用をやめないでください。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

この薬の用途

メルファランは、乳がんの治療にも使用されることがあります。また、アミロイドーシス（異常なタンパク質が体内の組織や臓器に蓄積する病気）の治療にも使用されることがあります。あなたの状態のためにこの薬を使用することのリスクについてあなたの医者に相談してください。

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

メルファランを服用する前に、

- メルファラン、他の薬、またはメルファラン錠の成分にアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。カルムスチン（BICNU、BCNU）、シメチジン（タガメット）、シスプラチン（プラチノールAQ）、シクロスポリン（サンドイムン、ゲングラフ、ネオラル）、またはインターフェロンアルファ（イントロンA、インフェルゲン、アルフェロンN）のいずれかに必ず言及してください。
- 以前にメルファランを服用したことがあるが、癌が薬に反応しなかったかどうかを医師に伝えてください。あなたの医者はおそらくメルファランを服用しないようにあなたに言うでしょう。
- 最近放射線療法や他の化学療法を受けたかどうか、または腎臓病にかかったことがあるか、または受けたことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- メルファランは女性の通常の月経周期（期間）を妨げる可能性があり、男性の精子産生を一時的または恒久的に停止する可能性があることを知っておく必要があります。メルファランは不妊症（妊娠困難）を引き起こす可能性があります。ただし、妊娠できない、または他の人を妊娠できないと思い込まないでください。妊娠中または授乳中の女性は、この薬の服用を開始する前に医師に相談する必要があります。化学療法を受けている間、または治療後しばらくの間、子供を産むことを計画するべきではありません。（詳細については医師にご相談ください。）妊娠を防ぐために、信頼できる避妊方法を使用してください。メルファランは胎児に害を及ぼす可能性があります。
- 医師に相談せずに予防接種を受けないでください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

メルファランは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 吐き気
- 嘔吐
- 食欲または体重の減少
- 口と喉の痛み
- 月経を逃した（女の子と女性）
- 関節、筋肉、または背中の痛み

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載されている症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 発疹
- じんましん
- かゆみ
- 呼吸困難または嚥下困難
- 薄い肌
- 過度の倦怠感
- 失神
- 速い、不規則な、またはドキドキする心拍
- 皮膚や目の黄変
- 胃の右上部分の痛み
- 濃い色の尿
- 異常なしこりや腫瘤

メルファランは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。冷蔵庫に保管し、光を避けて保管してください。

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。

- 嘔吐
- 下痢
- 口と喉の痛み
- 黒、タール、または血便
- コーヒーかすのように見える血まみれの嘔吐物または嘔吐物
- 異常なあざや出血
- 喉の痛み、咳、発熱、またはその他の感染症の兆候

他の情報を知っておく必要がありますか？

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- アルケラン®タブレット

それらの名前

- フェニルアラニンマスタード

最終改訂日-2017年5月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省
国立衛生研究所
ページの最終更新日：2022年3月25日