Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682220.html

Melphalan

pronuntat ca (mel' fa lan)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Melphalan poate determina o scădere severă a numărului de celule sanguine din măduva osoasă. Acest lucru poate provoca anumite simptome și poate crește riscul de a dezvolta o infecție gravă sau sângerare. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: febră, durere în gât, tuse și congestie continuă sau alte semne de infecție; sângerare sau vânătăi neobișnuite; scaune sângeroase sau negre, gudronate; vărsături sângeroase; sau vărsături cu sânge sau material maro care seamănă cu zațul de cafea.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda teste de laborator în mod regulat înainte și în timpul tratamentului pentru a vedea dacă celulele din sânge sunt afectate de acest medicament.

Melphalan poate crește riscul de a dezvolta alte tipuri de cancer. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua melfalan.

de ce este prescris acest medicament?

Melphalan este utilizat pentru a trata mielomul multiplu (un tip de cancer al măduvei osoase). Melphalan este, de asemenea, utilizat pentru a trata un anumit tip de cancer ovarian (cancer care începe în organele reproducătoare feminine unde se formează ouăle). Melphalanul face parte dintr-o clasă de medicamente numite agenți de alchilare. Acționează prin oprirea sau încetinirea creșterii celulelor canceroase din corpul dumneavoastră.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Melphalan vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia pe stomacul gol o dată pe zi. Durata tratamentului depinde de tipurile de medicamente pe care le luați, de cât de bine răspunde organismul dumneavoastră la acestea și de tipul de cancer pe care îl aveți. Luați melphalan aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați melphalan exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă amâne tratamentul sau să vă ajusteze doza de melfalan în funcție de răspunsul dumneavoastră la tratament și de orice reacții adverse pe care le aveți. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cum vă simțiți în timpul tratamentului. Nu încetați să luați melfalan fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Melphalan este, de asemenea, uneori utilizat pentru a trata cancerul de sân. De asemenea, uneori este utilizat pentru a trata amiloidoza (o boală în care proteinele anormale se acumulează în țesuturi și organe din organism). Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua melfalan,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la melfalan, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele comprimatelor de melfalan. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: carmustină (BICNU, BCNU), cimetidină (Tagamet), cisplatină (Platinol AQ), ciclosporină (Sandimmune, Gengraf, Neoral) sau interferon alfa (Intron A, Infergen, Alferon N).
- spuneți medicului dumneavoastră dacă ați mai luat melfalan, dar cancerul dumneavoastră nu a răspuns la medicament. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați melfalan.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă ați primit recent radioterapie sau altă chimioterapie sau dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi.
- trebuie să știți că melfalanul poate interfera cu ciclul menstrual normal (perioada) la femei și poate opri temporar sau permanent producția de spermă la bărbați. Melphalan poate provoca infertilitate (dificultate la a rămâne gravidă); cu toate acestea, nu trebuie să presupuneți că nu puteți rămâne însărcinată sau că nu puteți lăsa pe altcineva însărcinată. Femeile care sunt însărcinate sau care alăptează ar trebui să-și spună medicilor înainte de a începe să ia acest medicament. Nu ar trebui să plănuiți să aveți copii în timp ce primiți chimioterapie sau pentru o perioadă după tratamente. (Discutați cu medicul dumneavoastră pentru mai multe detalii.) Utilizați o metodă fiabilă de control al nașterii pentru a preveni sarcina. Melphalan poate dăuna fătului.
- nu vă vaccinați fără să discutați cu medicul dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Melphalan poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

- greaţă
- vărsături
- pierderea poftei de mâncare sau în greutate
- răni în gură și gât
- pierderea menstruației (la fete și la femei)
- dureri articulare, musculare sau de spate

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

- eczemă
- urticarie
- mâncărime
- dificultăți de respirație sau de înghițire
- piele palida
- oboseala excesiva
- leșin
- bătăi ale inimii rapide, neregulate sau puternice
- îngălbenirea pielii sau a ochilor
- durere în partea dreaptă sus a stomacului
- urină de culoare închisă
- bulgări sau mase neobișnuite

Melphalan poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la frigider și ferit de lumină.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

- vărsături
- diaree
- răni în gură și gât
- scaune negre, gudronate sau sângeroase
- vărsături sângeroase sau material vărsat care arată ca zațul de cafea
- vânătăi sau sângerări neobișnuite
- durere în gât, tuse, febră sau alte semne de infecție

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Alkeran®Tablete

numele lor

- Mușchi cu fenilalanină

Ultima revizuire - 15.05.2017

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022