TITLE - MERCAPTOPURINE / PURINETHOL
MEDICATION PATIENT INFORMATION
IN PORTUGUESE

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682653.html

Mercaptopurina

pronunciado como (mer kap''toe pure' een)

por que este medicamento é prescrito?

A mercaptopurina é usada isoladamente ou com outros medicamentos quimioterápicos para tratar a leucemia linfocítica aguda (LLA; também chamada de leucemia linfoblástica aguda e leucemia linfática aguda; um tipo de câncer que começa nos glóbulos brancos). Mercaptopurina está em uma classe de medicamentos chamados antagonistas de purina. Funciona impedindo o crescimento de células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

Mercaptopurina vem como um comprimido e uma suspensão (líquido) para tomar por via oral. É usualmente tomado uma vez por dia. Tome mercaptopurina por volta do mesmo horário todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome mercaptopurina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Se você estiver tomando a suspensão, agite o frasco muito bem por 30 segundos antes de cada uso para misturar o medicamento uniformemente. É importante usar uma seringa oral (dispositivo de medição) para medir com precisão e tomar sua dose de mercaptopurina. Se não encontrar uma seringa oral com a sua medicação, peça ao seu farmacêutico para lhe dar uma. Depois de usar a seringa oral para tomar sua medicação, remova o êmbolo do resto do dispositivo de medição, lave ambas as partes com água morna e sabão e enxágue em água corrente. Deixe as peças secarem ao ar antes de remontá-las para o próximo uso.

Continue a tomar mercaptopurina mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar mercaptopurina sem falar com o seu médico

outros usos para este medicamento

A mercaptopurina também é usada às vezes para tratar certos outros tipos de câncer, doença de Crohn (uma condição na qual o corpo ataca o revestimento do trato digestivo causando dor, diarréia, perda de peso e febre) e colite ulcerativa (condição na qual as feridas se desenvolvem nos intestinos causando dor e diarreia). Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar mercaptopurina,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à mercaptopurina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos ou suspensão de mercaptopurina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: alopurinol (Lopurin, Zyloprim); aminossalicilatos tais como mesalamina (Apriso, Asacol, Canasa, Lialda, Delzicol, Pentasa, outros), olsalazina (Dipentum) e sulfassalazina (Azulfidina); anticoagulantes ("diluentes do sangue") tais como varfarina (Coumadin, Jantoven); doxorrubicina (Doxil); e trimetoprima e sulfametoxazol (Bactrim, Septra). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se já tomou mercaptopurina ou tioguanina para tratar o seu cancro. Seu médico pode dizer para você não tomar mercaptopurina se algum desses medicamentos não funcionou bem contra o câncer no passado.
- informe o seu médico se tiver algum tipo de infecção e se tem ou já teve doença hepática ou renal.
- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você deve usar controle de natalidade para evitar a gravidez durante o tratamento com mercaptopurina. Se engravidar enquanto estiver a tomar mercaptopurina, contacte o seu médico imediatamente. Mercaptopurina pode prejudicar o feto.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar mercaptopurina.
- não tome nenhuma vacina sem falar com o seu médico.
- você deve saber que o risco de desenvolver efeitos colaterais graves da mercaptopurina pode ser maior se você tiver um fator de risco genético (herdado). Seu médico pode solicitar exames antes ou durante o tratamento para verificar se você tem esse fator de risco.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A mercaptopurina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- náusea
- vômito
- escurecimento da pele

- perda de cabelo
- irritação na pele

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

- pele pálida
- fraqueza
- falta de ar
- dor de garganta, febre, calafrios ou outros sinais de infecção
- inchaço nas pernas, tornozelos ou pés
- hematomas ou sangramentos incomuns
- amarelecimento da pele ou dos olhos
- perda de apetite
- diarréia
- inchaço da área do estômago
- dor na parte superior direita do estômago

Tomar mercaptopurina pode aumentar o risco de desenvolver um novo câncer. Algumas pessoas que tomaram mercaptopurina para tratar a doença de Crohn ou colite ulcerativa desenvolveram linfoma hepatoesplênico de células T (HSTCL), uma forma muito grave de câncer que muitas vezes causa a morte em pouco tempo. Informe o seu médico se sentir algum dos seguintes sintomas: dor de estômago; febre; perda de peso inexplicável; suores noturnos ou hematomas ou sangramentos fáceis. Converse com seu médico sobre os riscos de tomar este medicamento.

A mercaptopurina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). A suspensão de mercaptopurina pode ser mantida à temperatura ambiente por até 6 semanas após a primeira abertura do frasco. Em seguida, descarte qualquer suspensão que sobrar após 6 semanas.

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em seu

comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir:

- perda de apetite
- náusea
- vômito
- diarréia
- pele pálida
- fraqueza
- falta de ar
- dor de garganta, febre, calafrios e outros sinais de infecção
- hematomas ou sangramentos incomuns

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns testes de laboratório para verificar a resposta do seu corpo à mercaptopurina.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Purinetol®
- Purixan®

outros nomes

- 6-MP

Última revisão - 15/08/2017

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022