Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Mayoclinic

**Mga Gamot at Supplement**

# Glipizide At Metformin (Oral na Ruta)

MAYO CLINIC

## Paglalarawan at Mga Pangalan ng Brand

Impormasyon sa gamot na ibinigay ng:IBM Micromedex

## US Brand Name

Metaglip**Mga paglalarawan**

Ang kumbinasyon ng Glipizide at Metformin ay ginagamit upang gamutin ang mataas na antas ng asukal sa dugo na sanhi ng isang uri ng diabetes mellitus o asukal sa diabetes na tinatawag na type 2 diabetes. Karaniwan, pagkatapos mong kumain, ang iyong pancreas ay naglalabas ng insulin upang matulungan ang iyong katawan na mag-imbak ng labis na asukal para magamit sa ibang pagkakataon. Ang prosesong ito ay nangyayari sa panahon ng normal na pagtunaw ng pagkain. Sa type 2 diabetes, ang iyong katawan ay hindi gumagana nang maayos upang iimbak ang labis na asukal at ang asukal ay nananatili sa iyong daluyan ng dugo. Ang talamak na mataas na asukal sa dugo ay maaaring humantong sa mga malubhang problema sa kalusugan sa hinaharap. Ang wastong diyeta ay ang unang hakbang sa pamamahala ng type 2 diabetes ngunit kadalasan ay kailangan ng mga gamot upang matulungan ang iyong katawan. Sa dalawang aksyon, ang kumbinasyon ng glipizide at metformin ay nakakatulong sa iyong katawan na makayanan ang mataas na asukal sa dugo. Pinasisigla ng Glipizide ang pagpapalabas ng insulin mula sa pancreas, na nagtuturo sa iyong katawan na mag-imbak ng asukal sa dugo. Ang Metformin ay may tatlong magkakaibang aksyon: pinapabagal nito ang pagsipsip ng asukal sa iyong maliit na bituka; pinipigilan din nito ang iyong atay mula sa pag-convert ng nakaimbak na asukal sa asukal sa dugo; at tinutulungan nito ang iyong katawan na gamitin ang iyong natural na insulin nang mas mahusay.

Ang gamot na ito ay makukuha lamang sa reseta ng iyong doktor.

Ang produktong ito ay magagamit sa mga sumusunod na form ng dosis:

- Tableta

# Bago Gamitin

Sa pagpapasya na gumamit ng gamot, ang mga panganib ng pag-inom ng gamot ay dapat na timbangin laban sa kabutihang magagawa nito. Isa itong desisyon na gagawin mo at ng iyong doktor. Para sa gamot na ito, dapat isaalang-alang ang mga sumusunod:

### Mga allergy

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang o allergic na reaksyon sa gamot na ito o anumang iba pang mga gamot. Sabihin din sa iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang iba pang uri ng allergy,

Feedback

tulad ng sa mga pagkain, tina, preservative, o hayop. Para sa mga produktong hindi reseta, basahin nang mabuti ang label o mga sangkap sa pakete.

## Pediatric

Ang mga pag-aaral sa gamot na ito ay ginawa lamang sa mga pasyenteng nasa hustong gulang, at walang partikular na impormasyon na naghahambing sa paggamit ng glipizide at metformin sa mga batang ginagamit sa ibang mga pangkat ng edad.

## Geriatric

Ang ilang mga matatanda ay maaaring mas sensitibo kaysa sa mga nakababatang nasa hustong gulang sa mga epekto ng mga gamot na ito. Ang mga unang palatandaan ng mababa o mataas na asukal sa dugo ay hindi madaling makita o hindi nangyayari sa mga matatanda. Ito ay maaaring tumaas ang posibilidad na magkaroon ng mababang asukal sa dugo sa panahon ng paggamot. Ang mga matatanda ay mas malamang na magkaroon ng mga problema na nauugnay sa edad at ang glipizide at metformin ay dapat gamitin nang maingat habang tumataas ang edad. Ang gamot na ito ay hindi dapat simulan sa mga nasa hustong gulang na higit sa 80 taong gulang maliban kung ang paggana ng bato ay hindi nabawasan.

# Pagpapasuso

Walang sapat na pag-aaral sa mga kababaihan para sa pagtukoy ng panganib sa sanggol kapag ginagamit ang gamot na ito sa panahon ng pagpapasuso. Timbangin ang mga potensyal na benepisyo laban sa mga potensyal na panganib bago inumin ang gamot na ito habang nagpapasuso.

### Interaksyon sa droga

Bagama't ang ilang partikular na gamot ay hindi dapat gamitin nang magkasama, sa ibang mga kaso, dalawang magkaibang gamot ang maaaring gamitin nang magkasama kahit na maaaring magkaroon ng interaksyon. Sa mga kasong ito, maaaring gusto ng iyong doktor na baguhin ang dosis, o maaaring kailanganin ang iba pang pag-iingat. Kapag umiinom ka ng gamot na ito, lalong mahalaga na malaman ng iyong healthcare professional kung umiinom ka ng alinman sa mga gamot na nakalista sa ibaba. Ang mga sumusunod na pakikipag-ugnayan ay pinili batay sa potensyal na kahalagahan ng mga ito at hindi lahat-lahat.

Ang paggamit ng gamot na ito sa alinman sa mga sumusunod na gamot ay hindi inirerekomenda. Maaaring magpasya ang iyong doktor na huwag kang gamutin ng gamot na ito o baguhin ang ilan sa iba pang mga gamot na iniinom mo.

- Acetrizoic Acid
- Diatrizoate
- Ethiodized Oil
- Iobenzamic Acid
- Iobitridol
- Iocarmic Acid
- Iocetamic Acid
- Iodamide
- Iodipamide
- Iodixanol
- Iodohippuric Acid
- Iodopyracet

Feedback

- Iodoxamic Acid
- Ioglicic Acid
- Ioglycamic Acid
- Iohexol
- Iomeprol
- Iopamidol
- Iopanoic Acid
- Iopentol
- Iophendylate
- Iopromide
- Iopronic Acid
- Ioseric Acid
- Iosimide
- Iotasul
- Iothalamate
- Iotrolan
- Iotroxic Acid
- Ioxaglate
- Ioxitalamic Acid
- Ipodate
- Metrizamide
- Metrizoic Acid
- Tyropanoate Sodium

Ang paggamit ng gamot na ito sa alinman sa mga sumusunod na gamot ay karaniwang hindi inirerekomenda, ngunit maaaring kailanganin sa ilang mga kaso. Kung ang parehong mga gamot ay inireseta nang magkasama, maaaring baguhin ng iyong doktor ang dosis o kung gaano kadalas mo ginagamit ang isa o pareho ng mga gamot.

- Acarbose
- Aspirin
- Balofloxacin
- Besifloxacin
- Bupropion
- Capmatinib
- Ceritinib
- Chloroquine
- Ciprofloxacin
- Dasabuvir
- Desmopressin

Feedback

- Disopyramide
- Dofetilide
- Dolutegravir
- Dulaglutide
- Enoxacin
- Entacapone
- Fexinidazole
- Fleroxacin
- Flumequine
- Gatifloxacin
- Gemifloxacin
- Hydroxychloroquine
- Ioversol
- Lanreotide
- Levofloxacin
- Levoketoconazole
- Lixisenatide
- Lomefloxacin
- Metreleptin
- Moxifloxacin
- Nadifloxacin
- Norfloxacin
- Octreotide
- Ofloxacin
- Ombitasvir
- Paritaprevir
- Pasireotide
- Pazufloxacin
- Pefloxacin
- Pioglitazone
- Porfimer
- Prufloxacin
- Rufloxacin
- Sitagliptin
- Sparfloxacin
- Tafenoquine
- Thioctic acid

Feedback

- Tosufloxacin
- Vandetanib

Ang paggamit ng gamot na ito sa alinman sa mga sumusunod na gamot ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng ilang mga side effect, ngunit ang paggamit ng parehong mga gamot ay maaaring ang pinakamahusay na paggamot para sa iyo. Kung ang parehong mga gamot ay inireseta nang magkasama, maaaring baguhin ng iyong doktor ang dosis o kung gaano kadalas mo ginagamit ang isa o pareho ng mga gamot.

- Acebutolol
- Aminolevulinic Acid
- Atenolol
- Betaxolol
- Bisoprolol
- Mapait na melon
- Carteolol
- Carvedilol
- Celiprolol
- Cimetidine
- Clarithromycin
- Colesevelam
- Cyclosporine
- Esmolol
- Fenugreek
- Furazolidone
- Gemfibrozil
- Glucomannan
- Guar Gum
- Iproniazid
- Isocarboxazid
- Labetalol
- Levobunolol
- Linezolid
- Asul na Methylene
- Metipranolol
- Metoprolol
- Moclobemide
- Nadolol
- Nebivolol
- Nialamide

Feedback

- Oxprenolol
- Patiromer
- Penbutolol
- Phenelzine
- Pindolol
- Practolol
- Procarbazine
- Propranolol
- Psyllium
- Ranitidine
- Ranolazine
- Rasagiline
- Rifampin
- Safinamide
- Saxagliptin
- Selegiline
- Sotalol
- Timolol
- Tranylcypromine
- Verapamil
- Voriconazole

### Iba pang Pakikipag-ugnayan

Ang ilang mga gamot ay hindi dapat gamitin sa o sa paligid ng oras ng pagkain o pagkain ng ilang uri ng pagkain dahil maaaring mangyari ang mga pakikipag-ugnayan. Ang paggamit ng alkohol o tabako sa ilang partikular na gamot ay maaari ding maging sanhi ng mga pakikipag-ugnayan. Ang mga sumusunod na pakikipag-ugnayan ay pinili batay sa potensyal na kahalagahan ng mga ito at hindi lahat-lahat.

Ang paggamit ng gamot na ito sa alinman sa mga sumusunod ay karaniwang hindi inirerekomenda, ngunit maaaring hindi maiiwasan sa ilang mga kaso. Kung ginamit nang magkasama, maaaring baguhin ng iyong doktor ang dosis o kung gaano kadalas mo ginagamit ang gamot na ito, o bigyan ka ng mga espesyal na tagubilin tungkol sa paggamit ng pagkain, alkohol, o tabako.

- Ethanol

### Iba pang mga Problemang Medikal

Ang pagkakaroon ng iba pang mga medikal na problema ay maaaring makaapekto sa paggamit ng gamot na ito. Tiyaking sasabihin mo sa iyong doktor kung mayroon kang anumang iba pang mga medikal na problema, lalo na:

- Acid sa dugo (acidosis o ketoacidosis) o
- Surgery (major)—Ang paggamit ng insulin ay pinakamainam upang makatulong na makontrol ang diabetes sa mga pasyenteng may ganitong mga kondisyon.

Feedback

- Pagkalason sa dugo o
- Dehydration (malubhang) o mga sakit
- sa puso o daluyan ng dugo o sakit sa
- bato o
- Sakit sa atay—Maaaring mangyari ang lactic acidosis sa mga kondisyong ito at mas malaki ang posibilidad na mangyari ito sa gamot na naglalaman ng metformin.
- Congestive Heart Failure—Glipizide at metformin ay hindi dapat gamitin sa mga pasyenteng may ganitong kondisyong medikal.
- Bato, puso, o iba pang mga problema na nangangailangan ng mga medikal na pagsusuri o eksaminasyon na gumagamit ng ilang partikular na gamot na tinatawag na contrast agent, na may mga x-ray na pagsusulit—Dahil ang gamot na ito ay naglalaman ng metformin, dapat payuhan ka ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom nito bago ka magkaroon ng anumang medikal na pagsusulit o diagnostic. mga pagsusuri na maaaring magdulot ng mas kaunting paglabas ng ihi kaysa karaniwan; maaari kang payuhan na simulan muli ang pag-inom ng gamot 48 oras pagkatapos ng mga pagsusulit o mga pagsusuri kung ang iyong kidney function ay nasuri at napag-alamang normal.
- Pagkalasing sa alak o
- Ang mabigat na ehersisyo na hindi sinasamahan ng sapat na pag-inom ng pagkain o
- Underactive adrenal gland, hindi maayos na nakontrol o
- Hindi aktibo ang pituitary gland, hindi maayos na kontrolado o
- kulang sa nutrisyon na kondisyon o
- Nanghihinang pisikal na kondisyon o
- Anumang iba pang kondisyon na nagdudulot ng mababang asukal sa dugo—Ang mga pasyente na may ganitong mga kondisyon ay maaaring mas malamang na magkaroon ng mababang asukal sa dugo habang umiinom ng gamot na naglalaman ng glipizide at metformin.
- Kakulangan sa bitamina B12—Ang kundisyong ito ay maaaring lumala ng gamot na ito.

### Tamang paggamit

Sundin nang mabuti ang espesyal na plano ng pagkain na ibinigay sa iyo ng iyong doktor. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng pagkontrol sa iyong kondisyon, at kinakailangan kung ang gamot ay gagana nang maayos. Gayundin, regular na mag-ehersisyo at suriin para sa asukal sa iyong dugo o ihi ayon sa itinuro.

Ang kumbinasyon ng glipizide at metformin ay dapat inumin kasama ng mga pagkain upang makatulong na mabawasan ang gastrointestinal side effect na maaaring mangyari sa panahon ng paggamot.

## Dosing

Magiiba ang dosis ng gamot na ito para sa iba't ibang pasyente. Sundin ang mga utos ng iyong doktor o ang mga direksyon sa label. Ang sumusunod na impormasyon ay kinabibilangan lamang ng mga karaniwang dosis ng gamot na ito. Kung iba ang iyong dosis, huwag itong baguhin maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na gawin ito.

Ang dami ng gamot na iniinom mo ay depende sa lakas ng gamot. Gayundin, ang bilang ng mga dosis na iniinom mo bawat araw, ang oras na pinapayagan sa pagitan ng mga dosis, at ang tagal ng oras ng pag-inom mo ng gamot ay depende sa medikal na problema kung saan mo ginagamit ang gamot.

Feedback

- Para sa oral dosage form (mga tablet):
  - Para sa type 2 diabetes:
    - Para sa unang beses na paggamot:
      - Matanda: Sa una, 2.5 milligrams (mg) ng glipizide at 250 milligrams (mg) ng metformin isang beses sa isang araw na may pagkain. Pagkatapos, maaaring taasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti bawat dalawang linggo hanggang sa makontrol ang iyong asukal sa dugo.
      - Mga Bata: Ang paggamit at dosis ay dapat matukoy ng iyong doktor.
    - Bilang pangalawang linya na therapy:
      - Oral, 2.5 milligrams (mg) ng glipizide at 500 milligrams (mg) ng metformin o 5 milligrams (mg) ng glipizide at 500 milligrams (mg) ng metformin dalawang beses sa isang araw, kasama ang mga pagkain sa umaga at gabi. Pagkatapos, maaaring taasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti hanggang sa makontrol ang iyong asukal sa dugo. Ang panimulang dosis ay hindi dapat lumampas sa pang-araw-araw na dosis ng glipizide o metformin na iniinom na.
      - Mga Bata: Ang paggamit at dosis ay dapat matukoy ng iyong doktor.
    - Para sa mga pasyenteng dati nang ginagamot ng sulfonylurea antidiabetic agent at/o metformin:
      - Matanda: Kapag inilipat ang mga pasyente mula sa isang sulfonylurea kasama ang metformin sa kumbinasyon ng glipizide at metformin, ang paunang dosis ay hindi dapat lumampas sa pang-araw-araw na dosis ng glipizide (o katumbas na dosis ng isa pang sulfonylurea) at metformin na iniinom.
      - Mga Bata: Ang paggamit at dosis ay dapat matukoy ng iyong doktor.

**Nakaligtaan ang Dosis**

Kung napalampas mo ang isang dosis ng gamot na ito, inumin ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at bumalik sa iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag magdoble ng dosis.

## Imbakan

Itago ang gamot sa saradong lalagyan sa temperatura ng kuwarto, malayo sa init, kahalumigmigan, at direktang liwanag. Panatilihin mula sa pagyeyelo.

### Iwasang maabot ng mga bata.

Huwag panatilihin ang lumang gamot o gamot na hindi na kailangan.

Tanungin ang iyong healthcare professional kung paano mo dapat itapon ang anumang gamot na hindi mo ginagamit.

## Mga pag-iingat

Gusto ng iyong doktor na suriin ang iyong pag-unlad sa mga regular na pagbisita, lalo na sa mga unang ilang linggo na iniinom mo ang gamot na ito.

Sa ilang partikular na kundisyon, ang sobrang glipizide at metformin ay maaaring magdulot ng lactic acidosis. Ang mga sintomas ng lactic acidosis ay malala at mabilis na lumilitaw at kadalasang nangyayari kapag ang iba pang mga problema sa kalusugan na hindi nauugnay sa gamot ay naroroon at napakalubha, tulad ng atake sa puso o pagkabigo sa bato. Ang mga sintomas ng lactic acidosis ay kinabibilangan ng abdominal o tiyan discomfort;

Feedback

nabawasan ang gana; pagtatae; mabilis, mababaw na paghinga; pangkalahatang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa; pananakit ng kalamnan o cramping; at hindi pangkaraniwang pagkaantok, pagkapagod, o panghihina.

Kung mangyari ang mga sintomas ng lactic acidosis, dapat kang humingi ng agarang tulong medikal.

Napakahalagang maingat na sundin ang anumang mga tagubilin mula sa iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa:

- Alkohol—Ang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng matinding mababang asukal sa dugo. Talakayin ito sa iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan.
- Iba pang mga gamot—Huwag uminom ng ibang mga gamot maliban kung napag-usapan na ang mga ito sa iyong doktor.
- Pagpapayo—Kailangang matutunan ng ibang miyembro ng pamilya kung paano maiwasan ang mga side effect o tumulong sa mga side effect kung mangyari ang mga ito. Gayundin, ang mga pasyenteng may diabetes ay maaaring mangailangan ng espesyal na pagpapayo tungkol sa mga pagbabago sa dosis ng gamot sa diabetes na maaaring mangyari dahil sa mga pagbabago sa pamumuhay, gaya ng mga pagbabago sa ehersisyo at diyeta. Higit pa rito, maaaring kailanganin ang pagpapayo sa pagpipigil sa pagbubuntis at pagbubuntis dahil sa mga problemang maaaring mangyari sa mga pasyenteng may diabetes sa panahon ng pagbubuntis.
- Paglalakbay—Magtago ng kamakailang reseta at ang iyong medikal na kasaysayan sa iyo. Maging handa para sa isang emergency gaya ng karaniwan mong ginagawa. Gumawa ng mga allowance para sa pagbabago ng mga time zone at panatilihin ang iyong mga oras ng pagkain na mas malapit hangga't maaari sa iyong karaniwang oras ng pagkain.

Sa kaso ng emerhensiya—Maaaring may panahon na kailangan mo ng pang-emerhensiyang tulong para sa isang problemang dulot ng iyong diabetes. Kailangan mong maging handa para sa mga emergency na ito. Magandang ideya na magsuot ng medical identification (ID) na bracelet o neck chain sa lahat ng oras. Gayundin, magdala ng ID card sa iyong wallet o pitaka na nagsasabing ikaw ay may diabetes at isang listahan ng lahat ng iyong mga gamot.

Ang mga sintomas ng hypoglycemia (mababang asukal sa dugo) ay kinabibilangan ng pagkabalisa; pagbabago ng pag-uugali na katulad ng pagiging lasing; malabong paningin; malamig na pawis; pagkalito; malamig, maputlang balat; kahirapan sa pag-iisip; antok; labis na gutom; mabilis na tibok ng puso; sakit ng ulo (patuloy); pagduduwal; nerbiyos; bangungot; hindi mapakali na pagtulog; panginginig; bulol magsalita; o hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan.

Ang kumbinasyon ng glipizide at metformin ay maaaring maging sanhi ng mababang asukal sa dugo. Gayunpaman, maaari rin itong mangyari kung maantala o hindi ka kumain o meryenda, umiinom ng alak, mag-ehersisyo nang higit kaysa karaniwan, hindi makakain dahil sa pagduduwal o pagsusuka, umiinom ng ilang gamot, o umiinom ng glipizide at metformin kasama ng ibang uri ng gamot sa diabetes. Ang mga sintomas ng mababang asukal sa dugo ay dapat tratuhin bago sila humantong sa pagkawala ng malay (paghimatay). Iba't ibang tao ang nararamdaman ng iba't ibang sintomas ng mababang asukal sa dugo. Mahalagang matutunan mo kung aling mga sintomas ng mababang asukal sa dugo ang karaniwan mong mayroon upang magamot mo ito nang mabilis.

Kung mangyari ang mga sintomas ng mababang asukal sa dugo, kumain ng glucose tablets o gel, corn syrup, honey, o sugar cubes; o uminom ng fruit juice, nondiet soft drink, o asukal na natunaw sa tubig. Gayundin, suriin ang iyong dugo para sa mababang asukal sa dugo. Ginagamit ang glucagon sa mga emerhensiyang sitwasyon kapag naganap ang malalang sintomas tulad ng mga seizure (kombulsyon) o kawalan ng malay. Magkaroon ng glucagon kit na magagamit, kasama ang isang hiringgilya o karayom, at alamin kung paano ito gamitin. Dapat ding malaman ng mga miyembro ng iyong sambahayan kung paano ito gamitin.

Kasama sa mga sintomas ng hyperglycemia (mataas na asukal sa dugo) ang malabong paningin; antok; tuyong bibig; namumula, tuyong balat; parang prutas na amoy ng hininga; nadagdagan ang pag-ihi (dalas at dami); ketones sa ihi; walang gana kumain; pagkaantok; sakit ng tiyan, pagduduwal, o pagsusuka; pagkapagod; problema sa paghinga (mabilis at malalim); kawalan ng malay; o hindi pangkaraniwang pagkauhaw.

Feedback

Maaaring mangyari ang mataas na asukal sa dugo kung hindi ka nag-eehersisyo gaya ng nakasanayan, may lagnat o impeksyon, hindi umiinom ng sapat o laktawan ang isang dosis ng iyong gamot sa diabetes, o kumain nang labis o hindi sumunod sa iyong plano sa pagkain.

Kung mangyari ang mga sintomas ng mataas na asukal sa dugo, suriin ang antas ng iyong asukal sa dugo at pagkatapos ay tawagan ang iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga tagubilin.

## Mga side effect

Kasama ng mga kinakailangang epekto nito, maaaring magdulot ang isang gamot ng ilang hindi gustong epekto. Bagama't hindi lahat ng mga side effect na ito ay maaaring mangyari, kung mangyari ang mga ito ay maaaring mangailangan sila ng medikal na atensyon.

Magtanong kaagad sa iyong doktor kung nangyari ang alinman sa mga sumusunod na side effect:

### Mas karaniwan

- Pagkabalisa
- malabong paningin
- panginginig
- malamig na pawis
- pagkawala ng malay
- pagkalito
- malamig na maputlang balat
- ubo
- depresyon
- pagkahilo
- mabilis na tibok ng puso
- lagnat
- sakit ng ulo
- nadagdagang gutom
- pagduduwal
- kaba
- mga bangungot
- mga seizure
- panginginig
- bulol magsalita
- pagbahin
- sakit sa lalamunan
- hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan

**Hindi pangkaraniwan**

- Pananakit ng pantog
- duguan o maulap na ihi

Feedback

- mahirap, nasusunog, o masakit na pag-ihi
- madalas na pagnanasang umihi
- sakit sa ibabang bahagi ng likod o tagiliran
- na kumakabog sa mga tainga mabagal ang
- tibok ng puso

**Bihira**

- Hindi komportable sa tiyan
- nabawasan ang gana
- pagtatae
- nanghihina na mga spells
- mabilis, mababaw na paghinga
- pangkalahatang pakiramdam ng
- discomfort pananakit ng kalamnan o
- cramping igsi ng paghinga
- pagkaantok

## Sintomas ng Overdose

- Hindi komportable sa tiyan
- pagkabalisa
- pagbabago ng pag-uugali, katulad ng paglalasing
- malabong paningin
- malamig na pawis
- pagkawala ng malay
- pagkalito
- malamig, maputlang balat
- nabawasan ang gana
- pagtatae
- kahirapan sa pag-
- concentrate ng antok
- labis na gutom
- mabilis na tibok ng puso
- mabilis, mababaw na paghinga pangkalahatang
- pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa sakit ng
- ulo
- pananakit ng kalamnan o cramping na
- pagduduwal
- kaba

Feedback

- mga bangungot
- hindi mapakali sa pagtulog
- mga seizure
- panginginig
- bulol magsalita
- hindi pangkaraniwang pagkaantok
- hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan

Ang ilang mga side effect ay maaaring mangyari na karaniwang hindi nangangailangan ng medikal na atensyon. Ang mga side effect na ito ay maaaring mawala sa panahon ng paggamot habang ang iyong katawan ay umaayon sa gamot. Gayundin, maaaring masabi sa iyo ng iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa mga paraan upang maiwasan o mabawasan ang ilan sa mga side effect na ito. Tingnan sa iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan kung ang alinman sa mga sumusunod na epekto ay nagpapatuloy o nakakaabala o kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga ito:

## Mas Karaniwan

- Sakit ng kalamnan o buto
- pananakit ng tiyan
- pagsusuka

Ang iba pang mga side effect na hindi nakalista ay maaari ding mangyari sa ilang mga pasyente. Kung mapapansin mo ang anumang iba pang mga epekto, suriin sa iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Tawagan ang iyong doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-FDA-1088.

Mga bahagi ng dokumentong ito na huling na-update: Abril 01, 2022

Orihinal na artikulo:https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/glipizide-and-metformin-oral-route/precautions/drg-20061984

Copyright © 2022 IBM Watson Health. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Ang impormasyon ay para lamang sa paggamit ng End User at hindi maaaring ibenta, muling ipamahagi o kung hindi man ay gamitin para sa mga layuning pangkomersyo.

---

Ang anumang paggamit ng site na ito ay bumubuo ng iyong kasunduan sa Mga Tuntunin at Kundisyon at Patakaran sa Privacy na naka-link sa ibaba.

Mga Tuntunin at Kundisyon

**Patakaran sa Privacy**

**Paunawa ng Mga Kasanayan sa Privacy**

Paunawa ng Walang Diskriminasyon

Ang Mayo Clinic ay isang hindi pangkalakal na organisasyon at nalikom mula sa Web advertising na tumulong sa pagsuporta sa aming misyon. Ang Mayo Clinic ay hindi nag-eendorso ng alinman sa mga third party na produkto at serbisyo na ina-advertise.

Patakaran sa advertising at sponsorship Mga pagkakataon sa advertising at sponsorship

Ang isang kopya ng mga materyal na ito ay maaaring muling i-print para sa hindi pangkomersyal na personal na paggamit lamang. Ang "Mayo," "Mayo Clinic," "MayoClinic.org," "Mayo Clinic Healthy Living," at ang triple-shield na logo ng Mayo Clinic ay mga trademark ng Mayo Foundation para sa Edukasyong Medikal at Pananaliksik.

Feedback

© 1998-2022 Mayo Foundation para sa Edukasyong Medikal at Pananaliksik (MFMER). Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Feedback