

# TITLE - SAXAGLIPTIN + METFORMIN / KOMBIGLYZE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

Disclaimer : Document presented by [www.911GlobalMeds.com](http://www.911GlobalMeds.com)



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

## แผ่นพับบรรทัดที่: ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย Komboglyze<sup>®</sup> ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 2.5 มก./1,000 มก.

แซ็กซากลลิปติน/เมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์

### อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญสำหรับคุณ

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม ให้ถามแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ
- ยานี้กำหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม
- หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

### มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้:

1. Komboglyze คืออะไรและใช้สำหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทานKomboglyze
3. วิธีการใช้ Komboglyze
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บ Komboglyze
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

## 1. Komboglyze คืออะไรและใช้สำหรับอะไร

ยานี้มีสารสองชนิดที่เรียกว่า:

แซ็กซากลลิปติน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยาที่เรียกว่า DPP-4 inhibitors (dipeptidyl peptidase-4 inhibitors) และเมตฟอร์มิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยาที่เรียกว่า biguanides

ทั้งสองอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านเบาหวานในช่องปาก

### Komboglyze ใช้สำหรับอะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคเบาหวานประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่า 'เบาหวานชนิดที่ 2'

### Komboglyze ทำงานอย่างไร

แซ็กซากลลิปตินและเมตฟอร์มินทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ พวกเขาเพิ่มระดับอินซูลินหลังอาหาร พวกเขาช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายของคุณสร้างขึ้น นอกจากนี้การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายแล้ว ยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วย ยานี้สามารถใช้คนเดียวหรือร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานอื่นๆ รวมทั้งอินซูลิน

เพื่อควบคุมโรคเบาหวานของคุณ คุณยังต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกาย แม้ว่า你会ใช้ยานี้อยู่ก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและการออกกำลังกายจากแพทย์หรือพยาบาลของคุณ

## 2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทานKomboglyze

### อย่าใช้Komboglyze

- หากคุณแพ้แซ็กซากลลิปติน เมตฟอร์มิน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6)
- หากคุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรง (แพ้ง่าย) กับยาอื่นที่คล้ายคลึงกันที่คุณใช้เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ  
อาการแพ้อย่างรุนแรงอาจรวมถึง:
  - ผื่น
  - รอยแดงบนผิวหนังของคุณ (ลมพิษ)

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

- ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และคอขาว ซึ่งอาจจะทำให้หายใจหรือกลืนลำบาก

- หากคุณมีอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้ยานี้และโทรหาแพทย์หรือพยาบาลทันที หากคุณเคยมีอาการโคมาจากเบาหวาน
- หากคุณเป็นเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอย่างรุนแรง (น้ำตาลในเลือดสูง) คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว กรดแลคติก (ดู "ความเสี่ยงของกรดแลคติก" ด้านล่าง) หรือภาวะกรดในเลือดสูง Ketoacidosis เป็นภาวะที่สารที่เรียกว่า 'ร่างกายของคีโตน' สะสมในเลือดและอาจนำไปสู่อาการโคมาในเบาหวานได้ อาการต่างๆ ได้แก่ ปวดท้อง หายใจเร็วและลึก ง่วงนอน หรือลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ผิดปกติ
- หากคุณมีอาการไตลดลงอย่างรุนแรงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตับ
- หากคุณเพิ่งมีอาการหัวใจวายหรือหากคุณมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิตหรือหายใจลำบากซึ่งอาจเป็นสัญญาณของปัญหาหัวใจ
- หากคุณมีการติดเชื้อรุนแรงหรือขาดน้ำ (สูญเสียน้ำมากจากร่างกาย); หากคุณกำลังให้นมบุตร (ดูเพิ่มเติมที่ "การตั้งครรภ์และให้นมบุตร");
- หากคุณดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก (ทุกวันหรือบางครั้งเท่านั้น) (โปรดดูหัวข้อ "Komboglyze with alcohol");

อย่าใช้ยานี้ถ้าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมีผลกับคุณ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

### **คำเตือนและข้อควรระวัง: ความ**

#### **เสี่ยงของกรดแลคติก**

Komboglyze อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่หายากมาก แต่ร้ายแรงมากที่เรียกว่ากรดแลคติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าไตของคุณทำงานไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติกเพิ่มขึ้นด้วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ การติดเชื้อร้ายแรง การอดอาหารหรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน ภาวะขาดน้ำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) ปัญหาเกี่ยวกับตับ และสภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่ส่วนใดของร่างกายมีปริมาณออกซิเจนลดลง (เช่น โรคหัวใจเฉียบพลันรุนแรง)

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

**หยุดใช้ Komboglyze เป็นเวลาสั้น ๆ หากคุณมีอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะขาดน้ำ**(สูญเสียของเหลวในร่างกายอย่างมีนัยสำคัญ) เช่น อาเจียนรุนแรง ท้องร่วง มีไข้ สัมผัสกับความร้อน หรือหากคุณดื่มน้ำน้อยกว่าปกติ พุดคุยกับแพทย์ของคุณสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

**หยุดใช้ Komboglyze และติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที หากคุณพบอาการบางอย่างของกรดแลคติก**เนื่องจากภาวะนี้อาจนำไปสู่อาการโคมาได้ อาการของกรดแลคติก ได้แก่:

- อาเจียน
- ปวดท้อง (ปวดท้อง)
- ปวดกล้ามเนื้อ
- รู้สึกไม่สบายตัวเมื่อออกกำลังกาย
- หายใจลำบาก
- อุณหภูมิร่างกายและการเต้นของหัวใจลดลง

กรดแลคติกเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

พุดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทานKomboglyze

- หากคุณมีโรคเบาหวานประเภท 1 (ร่างกายของคุณไม่ได้ผลิตอินซูลิน) ไม่ควรใช้ยานี้เพื่อรักษาสภาพนี้
- หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อน
- หากคุณกำลังใช้อินซูลินหรือยารักษาโรคเบาหวานที่รู้จักกันในชื่อ 'sulphonylurea' แพทย์ของคุณอาจต้องการลดปริมาณอินซูลินหรือซัลโฟนิลยูเรียเมื่อคุณรับประทานร่วมกับยานี้ เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำตาลในเลือดต่ำ
- หากคุณมีอาการแพ้ยาอื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดของคุณ
- หากคุณมีปัญหาหรือกายนยาที่สามารถลดการป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

- หากเคยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวหรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ในการพัฒนาภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น ปัญหาเกี่ยวกับไต แพทย์ของคุณจะแนะนำคุณถึงอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว คุณควรโทรหาแพทย์เภสัชกร หรือพยาบาลทันที หากคุณพบอาการเหล่านี้ อาการต่างๆ อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หายใจถี่เพิ่มขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเท้าบวม (อาการบวมที่เท้าที่เหยียบ)

หากคุณต้องการผ่าตัดใหญ่ คุณต้องหยุดใช้ Komboglyze ในระหว่างและช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังการทำหัตถการ แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อคุณต้องหยุดและเมื่อใดที่จะเริ่มการรักษาด้วย Komboglyze

แผลที่ผิวหนังจากเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของโรคเบาหวาน พบผื่นแดงร่วมกับเชื้อซากลิปิตินและยารักษาโรคเบาหวานบางชนิดในระดับเดียวกับเชื้อซากลิปิติน ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการดูแลผิวและเท้าที่แพทย์หรือพยาบาลมอบให้คุณ ติดต่อแพทย์ของคุณหากคุณพบว่ามียุงกัดที่ผิวหนัง เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะที่เรียกว่าโรคเพมฟิกอยด์ แพทย์ของคุณอาจขอให้หยุดใช้ Komboglyze

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ หรือหาก你不แน่ใจว่าควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

### **ตรวจหรือตรวจไต**

ระหว่างการรักษาด้วยยานี้ แพทย์จะตรวจการทำงานของไตอย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่านั้น หากคุณเป็นผู้สูงอายุ และ/หรือหากการทำงานของไตแย่ง

### **เด็กและวัยรุ่น**

Komboglyze ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทราบว่ายานี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ในเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือไม่

### **ยาอื่นๆ และ Komboglyze**

หากคุณต้องการฉีดคอนทราสต์ที่มีไอโอดีนเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ เช่น ในบริบทของการเอ็กซเรย์หรือการสแกน คุณต้องหยุดใช้คอมโบไกลซ์ก่อนหรือในขณะที่ฉีด แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อคุณสามารถเริ่มการรักษาด้วย Komboglyze ได้อีกครั้ง

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกำลังรับประทาน เพิ่งกำลังรับประทาน หรืออาจกำลังใช้ยาอื่นอยู่ คุณอาจต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและการทำงานของไตบ่อยๆ หรือแพทย์ของคุณอาจปรับปริมาณของ

Komboglyze เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้:

- cimetidine ยาที่ใช้รักษาปัญหากระเพาะ ketoconazole ซึ่งใช้รักษา
- โรคติดเชื้อ bronchodilators (beta-2 agonists) ซึ่งใช้รักษาโรค
- หอบหืด diltiazem ซึ่งใช้สำหรับความดันโลหิตสูง
- 
- ไส้แพมป์ซิน ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อ เช่น วัณโรค
- corticosteroids ซึ่งใช้รักษาอาการอักเสบในโรคต่างๆ เช่น โรคหอบหืดและโรคข้ออักเสบ
- carbamazepine, phenobarbital หรือ phenytoin ซึ่งใช้ในการควบคุมอาการชัก (seizure) หรือความเจ็บปวดในระยะยาว
- ยาที่เพิ่มการผลิตปัสสาวะ (ยาขับปัสสาวะ)
- ยาที่ใช้รักษาอาการปวดและการอักเสบ (NSAID และ COX-2 inhibitors เช่น ibuprofen และ celecoxib)
- ยาบางชนิดสำหรับรักษาความดันโลหิตสูง (ACE inhibitors และ angiotensin II receptor antagonists)

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ หรือหาก你不แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

### **คอมโบไกลซ์ด้วยแอลกอฮอล์**

หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในขณะที่รับประทาน Komboglyze เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติก (ดู "คำเตือนและข้อควรระวัง")

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

### **การตั้งครุฑและให้มนุตร**

อย่าใช้ยานี้หากคุณกำลังตั้งครุฑหรืออาจจะตั้งครุฑ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อกรกได้

อย่าใช้ยานี้หากคุณกำลังให้มนุตรหรือวางแผนที่จะให้มนุตร เนื่องจากเมตฟอร์มินผ่านเข้าสู่บ้านมนุตรในปริมาณเล็กน้อย

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำก่อนรับประทานยาใดๆ

### **การขับรคและการใช้เครื่องจักร**

เช็กชากลิปตีนและเมตฟอร์มินมีอิทธิพลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับและการใช้เครื่องจักร ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับรคและใช้เครื่องจักรหรือทำงานอย่างปลอดภัย และมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อกานยานี้ร่วมกับยาที่ทราบว่าทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น อินซูลินและซัลโฟนิลูเรีย

## **3. วิธีการใช้ Komboglyze**

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

หากแพทย์ของคุณสั่งยานี้ร่วมกับซัลโฟนิลูเรียหรืออินซูลิน อย่าลืมใช้ยาอื่นตามที่แพทย์กำหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของคุณ

### **รับเท่าไรคะ**

- ปริมาณยาที่คุณจะใช้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของคุณและปริมาณที่คุณทานในปัจจุบันของเมตฟอร์มิน และ/หรือยาเม็ดเช็กชากลิปตีนและเมตฟอร์มินแต่ละเม็ด แพทย์ของคุณจะบอกคุณอย่างชัดเจนถึงปริมาณของยาที่ต้องกิน
  - ปริมาณที่แนะนำคือหนึ่งเม็ดวันละสองครั้ง
- หากคุณมีอาการไตลดลง แพทย์อาจสั่งจ่ายยาให้น้อยลง

### **วิธีรับประทานยานี้**

- กินยานี้ทางปาก
- รับประทานอาหารพร้อมอาหารเพื่อลดโอกาสที่คุณจะปวดท้อง

### **อาหารและการออกกำลังกาย**

เพื่อควบคุมโรคเบาหวานของคุณ คุณยังต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกาย แม้ว่า你会ใช้ยานี้ก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและการออกกำลังกายจากแพทย์หรือพยาบาลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณกำลังควบคุมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้รับประทานอาหารต่อไปในขณะที่คุณกำลังใช้ยานี้

### **หากคุณใช้ Komboglyze มากกว่าที่คว**

ถ้าคุณกินยา Komboglyze มากกว่าที่คว ให้ปรึกษาแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทันที นำชองยาไปด้วย

### **หากคุณลืมรับประทานKomboglyze**

- หากคุณลืมกินยานี้ ให้กินทันทีที่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากถึงเวลาสำหรับมือต่อไปของคุณ ให้ข้ามมือที่ลืมไปและทานมือต่อไปตามเวลาปกติ
- อย่าใช้ยานี้สองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณที่ลืม

### **หากคุณหยุดทานKomboglyze**

ใช้ยานี้ต่อไปจนกว่าแพทย์จะสั่งให้คุณหยุด นี้จะช่วยให้น้ำตาลในเลือดของคุณอยู่ภายใต้การควบคุม

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

#### 4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับก็ตาม

#### หยุดใช้ Komboglyze และติดต่อแพทย์ทันทีหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงดังต่อไปนี้:

- **กรดแลคติก**, Komboglyze อาจทำให้เกิดอาการหายากมาก (อาจส่งผลกระทบต่อถึง 1 ผู้ใช้ใน 10,000) แต่ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากที่เรียกว่ากรดแลคติก (ดูหัวข้อ “คำเตือนและข้อควรระวัง”) หากสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณต้อง**หยุดใช้ Komboglyze และติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที** เนื่องจากกรดแลคติกอาจทำให้โคมาได้
- **ปวดท้องรุนแรงและต่อเนื่อง**(บริเวณท้อง) ที่อาจทะลุไปถึงหลังของคุณ รวมทั้งคลื่นไส้และอาเจียน เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณของตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนอักเสบ)

คุณควรโทรหาแพทย์หากคุณพบผลข้างเคียงดังต่อไปนี้:

- ปวดข้ออย่างรุนแรง

#### ผลข้างเคียงอื่น ๆ ของ Komboglyze ได้แก่ :

สามัญ (อาจส่งผลกระทบต่อมากถึง 1 ใน 10 คน)

- ปวดหัว
- ปวดกล้ามเนื้อ (ปวดกล้ามเนื้อ)
- ป่วยหรือไม่ย่อย (อาการอาหารไม่ย่อย)
- การติดเชืของโครงสร้างที่เป็นพาหะของปัสสาวะ (การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ) การติดเชืของทางเดินหายใจส่วนบน
- จมูกหรือคออักเสบ เช่น เป็นหวัดหรือเจ็บคอ
- ภาวะอาหารอักเสบบ (โรคกระเพาะ) หรือลำไส้ ซึ่งบางครั้งเกิดจากการติดเชื้อ (โรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ) การติดเชื้อที่ไซนัส บางครั้งมีความรู้สึกเจ็บปวดและอึดที่บริเวณแก้มและตา (ไซนัสอักเสบ)
- ท้องอืด
- อาการเวียนศีรษะ
- ความเหนื่อยล้า (ความเหนื่อยล้า)

ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบต่อมากถึง 1 ใน 100 คน)

- ปวดข้อ (ปวดข้อ)
- ความยากลำบากในการรับหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ (หย่อนสมรรถภาพทางเพศ)

#### ผลข้างเคียงที่เห็นได้เมื่อรับประทานแซ็กซากลลิปตินเพียงอย่าง

เดียว: ทั่วไป

- อาการเวียนศีรษะ
- ความเหนื่อยล้า (ความเหนื่อยล้า)

#### ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเมื่อใช้แซ็กซากลลิปตินเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกัน:

ไม่ทราบ (ความถี่ไม่สามารถประมาณได้จากข้อมูลที่มีอยู่):

- ท้องผูก
- พุพองของผิวหนัง (bullous pemphigoid)

ผู้ป่วยบางรายมีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (ลิมโฟไซต์) ลดลงเล็กน้อยที่แสดงในการตรวจเลือดเมื่อใช้แซ็กซากลลิปตินเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้ป่วยบางรายรายงานว่า มีผื่นและปฏิกิริยาทางผิวหนัง (แพ้ง่าย) ขณะรับประทานแซ็กซากลลิปติน

ระหว่างการใชแซ็กซากลลิปตินภายหลังการอนุมัติ มีรายงานผลข้างเคียงเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรง (ภูมิแพ้) และอาการบวมที่ใบหน้าริมฝีปาก ลิ้น และลำคอที่อาจทำให้หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก หากคุณมีอาการแพ้ ให้หยุดใช้ยานี้และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที แพทย์ของคุณอาจสั่งยาเพื่อรักษาอาการแพ้และยาอื่นสำหรับโรคเบาหวานของคุณ

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

### ผลข้างเคียงที่เห็นเมื่อใช้เมตฟอร์มินเพียงอย่างเดียว:

พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบต่อมากกว่า 1 ใน 10 คน)

- คลื่นไส้ อาเจียน
- ท้องร่วงหรือปวดท้อง เบื่อ
- อาหาร

ทั่วไป

-รสโลหะในปากของคุณ

หายากมาก

- ลดระดับวิตามินบี 12 ปัญหาตับ (ตับ
- อักเสบ) รอยแดงของผิวหนัง (ผื่น) หรือ
- อาการคัน

### การรายงานผลข้างเคียง

หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลือง เว็บไซต์:

[www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard) หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App Store โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

## 5. วิธีเก็บ Komboglyze

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนตุ่มและกล่องหลังจาก EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส

อย่าใช้ยานี้หากบรรจุภัณฑ์เสียหายหรือแสดงสัญญาณของการปลอมแปลง

อย่าทิ้งยาผ่านทางน้ำเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

## 6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

### Komboglyze ประกอบด้วยอะไรบ้าง

สารออกฤทธิ์คือแซ็กซาคลิปตินและเมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วยแซ็กซาคลิปติน 2.5 มก. (ในรูปของไฮโดรคลอไรด์) และเมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ 1,000 มก.

ส่วนผสมอื่นๆ (สารเพิ่มปริมาณ) ได้แก่

- แคนแท็บเล็ต: โพรโตน K30 แมกนีเซียมสเตียเรต
- การเคลือบฟิล์ม: โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, มาโครกอล 3350, โททาเนียมไดออกไซด์ (E171), แป้งโรยตัว (E553b), เหล็กออกไซด์สีเหลือง (E172)
- หมึกพิมพ์: ครั่ง, สีครามแดงออลูมิเนียมเลค (E132)

### Komboglyze หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็คเกจ

- ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Komboglyze 2.5 มก./1,000 มก. ('เม็ด') มีสีเหลืองซีดถึงสีเหลืองอ่อนและรูปร่างโดยพิมพ์ "2.5/1000" ที่ด้านหนึ่ง และ "4247" พิมพ์อีกด้านหนึ่งด้วยหมึกสีน้ำเงิน Komboglyze มีอยู่ใน
- แผ่นออลูมิเนียมฟอยล์ ขนาดแพ็คเกจคือ 14, 28, 56 และ 60 เม็ดเคลือบฟิล์มในแผงฟอยล์ที่ไม่มีรูพรุน หลายแพ็คเกจประกอบด้วย 112 เม็ด (2 แพ็คเกจ 56) และ 196 (7 แพ็คเกจ 28) เม็ดเคลือบฟิล์มในแผงไม่มีรูพรุนและ 60 เม็ดเคลือบฟิล์ม x1 เม็ดในแผงฟอยล์ขนาดหนึ่งหน่วย

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

**ผู้ถืออนุญาตการตลาด**

AstraZeneca UK Limited

ความสามารถ 600 สีเขียว

Luton

LU1 3LU

ประเทศอังกฤษ

**ผู้ผลิต**

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

เชสเชียร์

SK10 2NA

ประเทศอังกฤษ

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 12/2020

© แอสตราเซนเนกา 2021

KOMBOGLYZE เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท AstraZeneca

CV 20 0099

**แหล่งข้อมูลอื่นๆ**

หากต้องการฟังหรือขอสำเนาแผ่นพับนี้เป็นอักษรเบรลล์ ตัวพิมพ์ใหญ่หรือไฟล์เสียงโปรดโทรติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย:

0800 198 5000

โปรดเตรียมข้อมูลดังนี้

**ชื่อผลิตภัณฑ์**

Komboglyze 2.5 มก./1,000 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม

**หมายเลขอ้างอิง**

17901/0329