

# TITLE - SAXAGLIPTIN + METFORMIN / KOMBIGLYZE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Disclaimer : Document presented by [www.911GlobalMeds.com](http://www.911GlobalMeds.com)



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medicines Org UK

**Package leaflet: Impormasyon para sa pasyente na  
Komboglyze®2.5 mg/1,000 mg na tabletang pinahiran ng pelikula  
saxagliptin/metformin hydrochloride**

**Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng mahalagang impormasyon para sa iyo.**

- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.
- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.
- Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

**Ano ang nasa leaflet na ito:**

1. Ano ang Komboglyze at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Komboglyze
3. Paano uminom ng Komboglyze
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Komboglyze
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

## **1. Ano ang Komboglyze at para saan ito ginagamit**

Ang gamot na ito ay naglalaman ng dalawang magkaibang sangkap na tinatawag na:

saxagliptin, bahagi ng isang klase ng mga gamot na tinatawag na DPP-4 inhibitors (dipeptidyl peptidase-4 inhibitors), at metformin, bahagi ng isang klase ng mga gamot na tinatawag na biguanides.

Parehong nabibilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na oral anti-diabetics.

### **Ano ang gamit ng Komboglyze**

Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang isang uri ng diabetes na tinatawag na 'type 2 diabetes'.

#### **Paano gumagana ang Komboglyze**

Ang Saxagliptin at metformin ay nagtutulungan upang kontrolin ang iyong asukal sa dugo. Pinapataas nila ang mga antas ng insulin pagkatapos kumain. Pinabababa rin nila ang dami ng asukal na ginawa ng iyong katawan. Kasama ng diyeta at ehersisyo, nakakatulong ito na mapababa ang iyong asukal sa dugo. Ang gamot na ito ay maaaring gamitin nang mag-isa o kasama ng iba pang mga gamot na antidiabetic, kabilang ang insulin.

Upang makontrol ang iyong diyabetis, kailangan mo pa ring mag-diet at mag-ehersisyo, kahit na iniinom mo ang gamot na ito. Kaya mahalagang sundin ang payo tungkol sa diyeta at ehersisyo mula sa iyong doktor o nars.

## **2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Komboglyze**

### **Huwag uminom ng Komboglyze**

- Kung ikaw ay allergic sa saxagliptin, metformin o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6);
- Kung nagkaroon ka ng malubhang reaksiyong allergic (hypersensitive) sa anumang iba pang katulad na mga gamot na iniinom mo upang makontrol ang iyong asukal sa dugo.  
Ang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerhiya ay maaaring kabilang ang:
  - Rash
  - Nakataas na pulang patak sa iyong balat (mga pantal)

- Pamamaga ng mukha, labi, dila, at lalamunan na maaaring magdulot ng kahirapan sa paghinga o paglunok.

Kung mayroon kang mga sintomas na ito, itigil ang pag-inom ng gamot na ito at tawagan kaagad ang iyong doktor o nars. Kung nagkaroon ka na ng diabetic coma;

- Kung mayroon kang hindi makontrol na diabetes, na may, halimbawa, malubhang hyperglycaemia (mataas na glucose sa dugo), pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, mabilis na pagbaba ng timbang, lactic acidosis (tingnan ang "Peligro ng lactic acidosis" sa ibaba) o ketoacidosis. Ang Ketoacidosis ay isang kondisyon kung saan ang mga sangkap na tinatawag na 'ketone bodies' ay naipon sa dugo at maaaring humantong sa isang pre-coma ng diabetes. Kasama sa mga sintomas ang pananakit ng tiyan, mabilis at malalim na paghinga, antok o ang iyong paghinga ay nagkakaroon ng kakaibang amoy ng prutas;
- Kung nabawasan mo nang husto ang paggana ng bato o mga problema sa iyong atay;
- Kung kamakailan kang inatake sa puso o kung mayroon kang pagpalya sa puso o malubhang problema sa sirkulasyon ng iyong dugo o nahihirapan sa paghinga na maaaring senyales ng mga problema sa puso;
- Kung mayroon kang matinding impeksyon o dehydrated (nawalan ng maraming tubig mula sa iyong katawan);
- Kung ikaw ay nagpapasuso (tingnan din ang "Pagbubuntis at pagpapasuso");
- Kung umiinom ka ng maraming alkohol (alinman sa araw-araw o paminsan-minsan lamang) (pakitingnan ang seksyong "Komboglyze na may alkohol");

Huwag inumin ang gamot na ito kung ang alinman sa mga nabanggit ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

### **Mga babala at pag-iingat:**

#### **Panganib ng lactic acidosis**

Ang Komboglyze ay maaaring magdulot ng isang napakabihirang, ngunit napakaseryosong side effect na tinatawag na lactic acidosis, lalo na kung ang iyong mga bato ay hindi gumagana ng maayos. Ang panganib na magkaroon ng lactic acidosis ay tumataas din sa hindi makontrol na diabetes, malubhang impeksyon, matagal na pag-aayuno o pag-inom ng alak, dehydration (tingnan ang karagdagang impormasyon sa ibaba), mga problema sa atay at anumang mga medikal na kondisyon kung saan ang isang bahagi ng katawan ay may nabawasang suplay ng oxygen (tulad ng talamak na malubhang sakit sa puso).

Kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo, makipag-usap sa iyong doktor para sa karagdagang mga tagubilin.

#### **Itigil ang pag-inom ng Komboglyze sa maikling panahon kung mayroon kang kondisyon na maaaring nauugnay sa dehydration(**

makabuluhang pagkawala ng mga likido sa katawan) tulad ng matinding pagsusuka, pagtatae, lagnat, pagkakalantad sa init o kung umiinom ka ng mas kaunting likido kaysa sa normal. Makipag-usap sa iyong doktor para sa karagdagang mga tagubilin.

#### **Itigil ang pag-inom ng Komboglyze at makipag-ugnayan kaagad sa doktor o sa pinakamalapit na ospital kung makaranas ka ng ilan sa mga sintomas ng lactic acidosis,**

dahil ang kundisyong ito ay maaaring humantong sa coma. Ang mga sintomas ng lactic acidosis ay kinabibilangan ng:

- pagsusuka
- sakit ng tiyan (sakit ng tiyan)
- kalamnan cramps
- isang pangkalahatang pakiramdam ng hindi maayos na may matinding pagod
- kahirapan sa paghinga
- nabawasan ang temperatura ng katawan at tibok ng puso

Ang lactic acidosis ay isang medikal na emerhensiya at dapat gamutin sa isang ospital.

Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Komboglyze

- Kung mayroon kang type 1 diabetes (ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng anumang insulin). Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin upang gamutin ang kundisyong ito;
- Kung mayroon ka o nagkaroon ka ng sakit sa pancreas;
- Kung umiinom ka ng insulin o isang gamot na antidiabetic na kilala bilang 'sulphonylurea', maaaring gusto ng iyong doktor na bawasan ang iyong dosis ng insulin o ang sulphonylurea kapag ininom mo ang alinman sa mga ito kasama ng gamot na ito, upang maiwasan ang mababang asukal sa dugo;
- Kung nagkaroon ka ng mga reaksiyong alerdyi sa anumang iba pang mga gamot na iniinom mo upang makontrol ang dami ng asukal sa iyong dugo;
- Kung ikaw ay may problema o umiinom ng gamot na maaaring magpababa ng depensa ng iyong katawan laban sa mga impeksyon;

- Kung naranasan mo na ang pagpalya ng puso o mayroon kang iba pang mga kadahilanan ng panganib para sa pagpalya ng puso tulad ng mga problema sa iyong mga bato. Ang iyong doktor ay magpapayo sa iyo ng mga palatandaan at sintomas ng pagpalya ng puso. Dapat mong tawagan kaagad ang iyong doktor, parmasyutiko o nars kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito. Maaaring kabilang sa mga sintomas, ngunit hindi limitado sa, pagtaas ng igsi ng paghinga, mabilis na pagtaas ng timbang at pamamaga ng mga paa (pedal edema);

Kung kailangan mong magkaroon ng malaking operasyon, dapat mong ihinto ang pag-inom ng Komboglyze sa panahon at ilang oras pagkatapos ng pamamaraan. Ang iyong doktor ang magpapasya kung kailan ka dapat huminto at kung kailan sisimulan muli ang iyong paggamot sa Komboglyze.

Ang mga sugat sa balat na may diabetes ay isang karaniwang komplikasyon ng diabetes. Ang pantal ay nakita kasama ng saxagliptin at sa ilang mga gamot na anti-diabetes sa parehong klase ng saxagliptin. Sundin ang mga rekomendasyon para sa pangangalaga sa balat at paa na ibinigay sa iyo ng iyong doktor o nars. Makipag-ugnayan sa iyong doktor kung nakatagpo ka ng blistering ng balat, dahil maaaring ito ay isang senyales para sa isang kondisyon na tinatawag na bullous pemphigoid. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang Komboglyze.

Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo, o kung hindi ka sigurado makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

#### **Mga pagsusuri o pagsusuri sa bato**

Sa panahon ng paggamot sa gamot na ito, susuriin ng iyong doktor ang paggana ng iyong bato nang hindi bababa sa isang beses sa isang taon o mas madalas kung ikaw ay matanda na at/o kung lumalala ka sa paggana ng bato.

## **Mga bata at kabataan**

Ang Komboglyze ay hindi inirekomenda para sa paggamit sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang. Hindi alam kung ligtas at mabisa ang gamot na ito kapag ginamit sa mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang.

## **Iba pang mga gamot at Komboglyze**

Kung kailangan mong magkaroon ng iniksyon ng contrast medium na naglalaman ng iodine sa iyong bloodstream, halimbawa sa konteksto ng isang X-ray o scan, dapat mong ihinto ang pag-inom ng Komboglyze bago o sa oras ng iniksyon. Ang iyong doktor ang magpapasya kung kailan mo masisimulan muli ang iyong paggamot sa Komboglyze.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang mga gamot. Maaaring kailanganin mo ng mas madalas na blood glucose at kidney function tests, o maaaring ayusin ng iyong doktor ang dosis ng Komboglyze. Ito ay lalong mahalaga na banggitin ang mga sumusunod:

- cimetidine, isang gamot na ginagamit upang gamutin ang mga problema sa tiyan
- ketoconazole na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal bronchodilators
- (beta-2 agonists) na ginagamit upang gamutin ang asthma diltiazem na ginagamit para sa mataas na presyon ng dugo
- rifampicin, isang antibiotic na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon tulad ng tuberculosis
- corticosteroids, na ginagamit upang gamutin ang pamamaga sa mga sakit tulad ng hika at arthritis
- carbamazepine, phenobarbital o phenytoin, na ginagamit upang kontrolin ang mga fit (seizure) o pangmatagalang pananakit
- mga gamot na nagpapataas ng produksyon ng ihi (diuretics)
- mga gamot na ginagamit upang gamutin ang pananakit at pamamaga (NSAID at COX-2 inhibitors, gaya ng ibuprofen at celecoxib)
- ilang mga gamot para sa paggamot ng mataas na presyon ng dugo (ACE inhibitors at angiotensin II receptor antagonists).

Kung ang alinman sa itaas ay nalalapat sa iyo, o kung hindi ka sigurado, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

## **Komboglyze na may alkohol**

Iwasan ang labis na pag-inom ng alak habang umiinom ng Komboglyze dahil maaaring tumaas ang panganib ng lactic acidosis (tingnan ang "Mga Babala at pag-iingat").

## **Pagbubuntis at pagpapasuso**

Huwag inumin ang gamot na ito kung ikaw ay buntis o maaaring mabuntis. Ito ay dahil ito ay maaaring makaapekto sa sanggol.

Huwag inumin ang gamot na ito kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpapasuso. Ito ay dahil ang metformin ay pumapasok sa gatas ng tao sa maliit na halaga.

Humingi ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminom ng anumang gamot.

### **Pagmamaneho at paggamit ng mga makina**

Ang Saxagliptin at metformin ay may maliit na impluwensya sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina. Maaaring maapektuhan ng hypoglycaemia ang iyong kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina o magtrabaho nang may ligtas na paghawak at may panganib ng hypoglycaemia kapag umiinom ng gamot na ito kasama ng mga gamot na kilala na nagdudulot ng hypoglycaemia gaya ng insulin at sulphonylureas.

## **3. Paano uminom ng Komboglyze**

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Kung inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito kasama ng sulphonylurea o insulin, tandaan na inumin ang iba pang gamot na ito ayon sa direksyon ng iyong doktor upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta para sa iyong kalusugan.

### **Magkano ang dadalhin**

- Ang halaga ng gamot na ito na iyong iinumay ay nag-iiba depende sa iyong kondisyon at ang mga dosis na kasalukuyan mong iniinom ng metformin at/o mga indibidwal na tablet ng saxagliptin at metformin. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor ang eksaktong dosis ng gamot na ito na dapat inumin.
- Ang inirerekumendang dosis ay isang tablet dalawang beses sa isang araw.

Kung nabawasan mo ang paggana ng bato, maaaring magreseta ang iyong doktor ng mas mababang dosis.

### **Paano inumin ang gamot na ito**

- Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig.
- Uminom kasabay ng pagkain upang mabawasan ang iyong pagkakataong magkaroon ng sira ang tiyan.

### **Diyeta at ehersisyo**

Upang makontrol ang iyong diyabetis, kailangan mo pa ring mag-diet at mag-ehersisyo, kahit na iniinom mo ang gamot na ito. Kaya mahalagang sundin ang payo tungkol sa diyeta at ehersisyo mula sa iyong doktor o nars. Sa partikular, kung ikaw ay sumusunod sa isang diabetic weight control diet, ipagpatuloy ito habang iniinom mo ang gamot na ito.

### **Kung umiinom ka ng mas maraming Komboglyze kaysa sa dapat mo**

Kung umiinom ka ng mas maraming Komboglyze na tablet kaysa sa nararapat, makipag-usap sa doktor o pumunta kaagad sa ospital. Dalhin ang pakete ng gamot.

### **Kung nakalimutan mong uminom ng Komboglyze**

- Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis ng gamot na ito, inumin ito sa sandaling maalala mo. Gayunpaman, kung oras na para sa iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at kunin ang iyong susunod na dosis sa karaniwang oras.
- Huwag uminom ng dobleng dosis ng gamot na ito para makabawi sa nakalimutang dosis.

### **Kung huminto ka sa pag-inom ng Komboglyze**

Ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot na ito hanggang sa sabihin sa iyo ng iyong doktor na huminto. Ito ay upang makatulong na panatilihin kontrolado ang iyong asukal sa dugo.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

## 4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

**Itigil ang pag-inom ng Komboglyze at makipag-ugnayan kaagad sa doktor kung mapapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto:**

- **Lactic acidosis**, Maaaring magdulot ang Komboglyze ng napakabihirang (maaaring makaapekto ng hanggang 1 user sa 10,000), ngunit napakaseryosong side effect na tinatawag na lactic acidosis (tingnan ang seksyong “Mga babala at pag-iingat”). Kung mangyari ito kailangan mo itigil ang pag-inom ng Komboglyze at makipag-ugnayan kaagad sa doktor o sa pinakamalapit na ospital, dahil ang lactic acidosis ay maaaring humantong sa coma.
- **Matindi at patuloy na pananakit sa tiyan**(tiyan) na maaaring umabot sa iyong likod, pati na rin ang pagduduwal at pagsusuka, dahil maaaring ito ay isang senyales ng isang inflamed pancreas (pancreatitis).

Dapat mong tawagan ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng sumusunod na side effect:

- matinding pananakit ng kasukasuan.

**Ang iba pang mga side effect ng Komboglyze ay kinabibilangan**

**ng:** Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

- sakit ng ulo
- pananakit ng kalamnan (myalgia)
- may sakit o hindi pagkatunaw ng pagkain (dyspepsia)
- impeksyon sa mga istrukturang nagdadala ng ihi (urinary tract infection)
- impeksyon sa itaas na daanan ng hangin
- namamagang ilong o lalamunan tulad ng may sipon o namamagang lalamunan
- namamagang tiyan (gastritis) o bituka, kung minsan ay sanhi ng impeksyon (gastroenteritis) na impeksyon sa iyong sinus, kung minsan ay may pakiramdam ng pananakit at pagkapuno sa likod ng iyong mga pisngi at mata (sinusitis)
- utot
- pagkahilo
- pagkapagod (fatigue).

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao)

- pananakit ng kasukasuan (arthralgia)
- kahirapan sa pagkuha o pagpapatili ng isang paninigas (erectile dysfunction).

**Mga side effect na nakikita kapag kumukuha ng saxagliptin nang nag-**

**iisa:** Karaniwan

- pagkahilo
- pagkapagod (fatigue).

**Mga side effect na nakikita kapag kumukuha ng saxagliptin nang nag-iisa o**

**pinagsama:** Hindi alam (hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data):

- pagtitibi
- paltos ng balat (bullous pemphigoid)

Ang ilang mga pasyente ay nagkaroon ng maliit na pagbawas sa bilang ng isang uri ng mga puting selula ng dugo (lymphocytes) na ipinakita sa isang pagsusuri sa dugo kapag ang saxagliptin ay ginamit nang mag-isa o pinagsama. Bilang karagdagan, ang ilang mga pasyente ay nag-ulat ng mga pantal at reaksyon sa balat (hypersensitivity) habang umiinom ng saxagliptin.

Sa panahon ng paggamit ng saxagliptin pagkatapos ng pag-apruba, ang mga karagdagang epekto ay naiulat na kinabibilangan ng mga seryosong reaksyong alerhiya (anaphylaxis), at pamamaga ng mukha, labi, dila, at lalamunan na maaaring magdulot ng kahirapan sa paghinga o paglunok. Kung mayroon kang reaksyong alerdyi, itigil ang pag-inom ng gamot na ito at tawagan kaagad ang iyong doktor. Maaaring magreseta ang iyong doktor ng gamot para gamutin ang iyong allergic reaction at ibang gamot para sa iyong diabetes.

**Mga side effect na nakikita kapag kumukuha ng metformin nang nag-**

**iisa:** Napakakaraniwan (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao)

- pagduduwal, pagsusuka
- pagtatae o pananakit ng tiyan
- pagkawala ng gana.

Karaniwan

-isang lasa ng metal sa iyong bibig.

Napakabihirang

- nabawasan ang antas ng bitamina B12 mga
- problema sa atay (hepatitis) pamumula ng balat
- (pantal) o pangangati.

**Pag-uulat ng mga side effect**

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow Card Scheme. Website: [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard) o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store. Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

**5. Paano mag-imbak ng Komboglyze**

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa paltos at sa karton pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Mag-imbak sa ibaba 25°C.

Huwag gamitin ang gamot na ito kung ang pakete ay nasira o nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikialam.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang kapaligiran.

**6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon**

**Ano ang nilalaman ng Komboglyze**

Ang mga aktibong sangkap ay saxagliptin at metformin hydrochloride. Ang bawat film-coated na tablet ay naglalaman ng 2.5 mg saxagliptin (bilang hydrochloride) at 1,000 mg metformin hydrochloride.

Ang iba pang mga sangkap (excipients) ay:

- Tablet core: povidone K30, magnesium stearate.
- Film-coating: polyvinyl alcohol, macrogol 3350, titanium dioxide (E171), talc (E553b), iron oxide yellow (E172).
- Printing ink: shellac, indigo carmine aluminum lake (E132).

**Ano ang hitsura ng Komboglyze at mga nilalaman ng pack**

- Ang Komboglyze 2.5 mg/1,000 mg na film-coated na tablet ('mga tablet') ay maputlang dilaw hanggang mapusyaw na dilaw at hugis-itlog, na may "2.5/1000" na naka-print sa isang gilid at "4247" na naka-print sa kabilang panig, sa asul na tinta. Available ang Komboglyze sa aluminum foil blister. Ang mga laki ng pack ay 14, 28, 56 at 60 na film-coated na tablet sa hindi butas na mga paltos, multipack na naglalaman ng 112 (2 pack ng 56) at 196 (7 pack ng 28) na film-coated na tablet sa hindi butas na mga paltos at 60 x1 na film-coated na mga tablet sa butas-butat na unit dose blisters.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

**May-hawak ng Awtorisasyon sa**

**Marketing** AstraZeneca UK Limited

600 Kakayahang Berde

Luton

LU1 3LU

United Kingdom

**Manufacturer**

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire

SK10 2NA

United Kingdom

**Huling binago ang leaflet na ito noong 12/2020**

© AstraZeneca 2021

Ang KOMBOGLYZE ay isang rehistradong trademark ng grupo ng mga kumpanya ng AstraZeneca.

CV 20 0099

**Iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon**

Upang makinig o humiling ng kopya ng leaflet na ito sa Braille, malaking print o audio mangyaring tumawag, nang walang bayad:

**0800 198 5000**

Mangyaring maging handa na ibigay ang sumusunod na impormasyon:

**Pangalan ng Produkto**

Komboglyze 2.5 mg/1,000 mg na film-coated na tablet

**Reference number**

17901/0329