Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

כתובת האתר של דף זה: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682019.html

מתוטרקסט

מבוטא כ (meth'' oh trex' eat)

אזהרה חשובה:

.עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות מאוד ומסכנות חיים. אתה צריך לקחת מתוטרקסט רק כדי לטפל בסרטן או במצבים מסוימים אחרים שהם חמורים מאוד ושלא ניתן לטפל בהם בתרופות אחרות. שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים של נטילת מתוטרקסט למצבך Methotrexate

ספר לרופא שלך אם יש לך או היה לך עודף נוזלים באזור הבטן או בחלל סביב הריאות ואם יש לך או סבלת אי פעם במחלת כליות. ספר גם לרופא שלך אם אתה נוטל תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (NSAIDs) כגון אספירין, כולין מגנזיום טריסליצילאט (Tricosal, Trilisate), איבופרופן (Advil, Motrin), מגנזיום סליצילאט (Doan's),נפרוקסן (Aleve, Naprosyn), או סלסלאט. מצבים ותרופות אלו עשויים להגביר את הסיכון שתפתח תופעות לוואי חמורות של מתוטרקסט. הרופא שלך יעקוב אחריך בזהירות רבה יותר וייתכן ויצטרך לתת לך מינון נמוך יותר של מתוטרקסט או להפסיק את הטיפול במתוטרקסט.

.עלול לגרום לירידה במספר תאי הדם המיוצרים על ידי מח העצם שלך. ספר לרופא שלך אם יש לך או היה לך אי פעם מספר נמוך של כל סוג של תאי דם או כל בעיה אחרת עם תאי הדם שלך. התקשר לרופא שלך מיד אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים: כאב גרון, צמרמורות, חום או סימנים אחרים של זיהום; חבורות או דימום חריגים; עייפות יתר; עור חיוור; או קוצר נשימה Methotrexate

.שאל את הרופא שלך לגבי השימוש הבטוח במשקאות אלכוהוליים בזמן שאתה נוטל מתוטרקסט. התקשר לרופא שלך מיד אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים: בחילה, עייפות קיצונית, חוסר אנרגיה, אובדן תיאבון, כאב בחלק הימני העליון של הבטן, הצהבה של העור או העיניים, או תסמינים דמויי שפעת. הרופא שלך עשוי להזמין ביופסיות כבד (הסרה של חתיכה קטנה מרקמת כבד לבדיקה במעבדה) לפני ובמהלך הטיפול במתוטרקסט .)Vesanoid(סולפסאלזין (אזולפידין), או טרטינואין ,)Accutane(עלול לגרום לנזק לכבד, במיוחד כאשר הוא נלקח למשך תקופה ארוכה. אם אתה שותה או שתית אי פעם כמויות גדולות של אלכוהול או אם יש לך או סבלת אי פעם במחלת כבד, הרופא שלך עשוי לומר לך לא לקחת מתוטרקסט אלא אם כן יש לך סוג של סרטן מסכן חיים מכיוון שיש סיכון גבוה יותר לפתח נזק לכבד. הסיכון שתפתח נזק לכבד עשוי להיות גבוה יותר גם אם אתה קשיש, שמן או סכרת. ספר לרופא שלך אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות: אציטרטין (סוריאטן),אזתיופרין (אימורן), איזוטרטינואין Methotrexate

.עלול לגרום לנזק בריאות. ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממחלת ריאות. התקשר לרופא שלך מיד אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים: שיעול יבש, חום או קוצר נשימה Methotrexate

.עלול לגרום לנזק לרירית הפה, הקיבה או המעיים. ספר לרופא שלך אם יש לך או היו לך אי פעם כיבי קיבה או קוליטיס כיבית (מצב הגורם לנפיחות ולפצעים ברירית המעי הגס [המעי הגס] ופי הטבעת). אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, הפסק ליטול מתוטרקסט והתקשר מיד לרופא שלך: פצעים בפה, שלשול, צואה שחורה, זפתית או מדממת, או הקאות מדממות או שנראות כמו שאריות קפה Methotrexate

נטילת מתוטרקסט עלולה להגביר את הסיכון שתפתח לימפומה (סרטן שמתחיל בתאי מערכת החיסון). אם אתה מפתח לימפומה, היא עשויה להיעלם ללא טיפול כאשר אתה מפסיק לקחת מתוטרקסט, או ייתכן שיהיה צורך לטפל בה בכימותרפיה.

אם אתה נוטל מתוטרקסט לטיפול בסרטן, אתה עלול לפתח סיבוכים מסוימים שכן מתוטרקסט פועל להרוס את התאים הסרטניים. הרופא שלך יעקוב אחריך בקפידה ויטפל בסיבוכים אלה אם הם מתרחשים.

.עלול לגרום לתגובות עור חמורות או מסכנות חיים. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר מיד לרופא שלך: חום, פריחה, שלפוחיות או קילוף עור Methotrexate

.עשוי להפחית את פעילות המערכת החיסונית שלך, ואתה עלול לפתח זיהומים חמורים. ספר לרופא שלך אם יש לך סוג כלשהו של זיהום ואם יש לך או היה לך אי פעם מצב שמשפיע על המערכת החיסונית שלך. הרופא שלך עשוי לומר לך שאסור ליטול מתוטרקסט אלא אם כן יש לך סרטן מסכן חיים. אם אתם חווים סימנים של זיהום כגון כאב גרון, שיעול, חום או צמרמורת, התקשרו לרופא מיד Methotrexate

אם אתה נוטל מתוטרקסט בזמן שאתה מטופל בהקרנות לסרטן, מתוטרקסט עלול להגביר את הסיכון שהטיפול בקרינה יגרום לנזק לעור, לעצמות או לחלקים אחרים בגופך.

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מעבדה מסוימות לפני, במהלך ואחרי הטיפול שלך כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך ל-methotrexate ולטפל בתופעות לוואי לפני שהן הופכות לחמורות.

ספר לרופא שלך אם אתה או בן הזוג שלך בהריון או מתכננים להיכנס להריון. אם את נקבה, תצטרך לעבור בדיקת הריון לפני שתתחיל ליטול מתוטרקסט. השתמש בשיטה אמינה למניעת הריון כדי שאת או בת הזוג שלך לא תיכנסו להריון במהלך או זמן קצר לאחר הטיפול. אם אתה גבר, אתה ובת הזוג שלך צריכים להמשיך להשתמש באמצעי מניעה במשך 3 חודשים לאחר הפסקת נטילת מתוטרקסט. אם אתה נקבה, עליך להמשיך להשתמש באמצעי מניעה עד שקיבלת מחזור אחד שהחל לאחר שהפסקת ליטול מתוטרקסט. אם אתה או בן זוגך נכנסים להריון, התקשרי לרופא מיד. Methotrexate עלול לגרום נזק או מוות לעובר.

היי האם נרשמה תרופה זו?

מתוטרקסט משמש לטיפול בפסוריאזיס חמורה (מחלת עור שבה נוצרים כתמים אדומים וקשקשים באזורים מסוימים בגוף) שלא ניתן לשלוט בה על ידי טיפולים אחרים. מתוטרקסט משמש גם יחד עם מנוחה, פיזיותרפיה ולעיתים תרופות אחרות לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית פעילה חמורה (RA; מצב שבו הגוף תוקף את המפרקים של עצמו, גורם לכאב, נפיחות ואובדן תפקוד) שלא ניתן לשלוט על ידי תרופות מסוימות אחרות. מתוטרקסט משמש גם לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן כולל סרטן שמתחיל ברקמות שנוצרות סביב ביצית מופרית ברחם, סרטן השד, סרטן ריאות ,סוגי סרטן מסוימים של הראש והצוואר, סוגים מסוימים של לימפומה ולוקמיה (סרטן). שמתחיל בתאי הדם הלבנים). Methotrexateהוא בקבוצה של תרופות הנקראות אנטי-מטבוליטים. Methotrexate מטפל בסרטן על ידי האטת צמיחת תאים סרטניים. Methotrexate מטפל בפסוריאזיס על ידי האטת צמיחת תאי העור כדי לעצור את היווצרות הקשקשים. Methotrexate עשוי לטפל בדלקת מפרקים שגרונית על ידי הפחתת הפעילות של מערכת החיסון.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

.מגיע כטבליה לנטילה דרך הפה. הרופא שלך יגיד לך באיזו תדירות עליך ליטול מתוטרקסט. לוח הזמנים תלוי במצב שיש לך ובאופן שבו הגוף שלך מגיב לתרופות Methotrexate

הרופא שלך עשוי לומר לך לקחת מתוטרקסט בלוח זמנים מתחלף שמתחלף מספר ימים כאשר אתה נוטל מתוטרקסט עם מספר ימים או שבועות שבהם אינך נוטל את התרופה. עקוב אחר הנחיות אלה בקפידה ושאל את הרופא או הרוקח אם אינך יודע מתי לקחת את התרופה.

אם אתה נוטל מתוטרקסט לטיפול בפסוריאזיס או דלקת מפרקים שגרונית, הרופא שלך עשוי לומר לך לקחת את התרופה פעם בשבוע. שימו לב היטב להנחיות הרופא שלכם. חלק מהאנשים שלקחו בטעות מתוטרקסט פעם ביום במקום פעם בשבוע חוו תופעות לוואי קשות מאוד או מתו.

עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח מתוטרקסט בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא.

אם אתה נוטל מתוטרקסט לטיפול בפסוריאזיס או דלקת מפרקים שגרונית, הרופא שלך עשוי להתחיל במינון נמוך של התרופה ולהגדיל בהדרגה את המינון. בצע את ההנחיות האלה בזהירות.

אם אתה נוטל מתוטרקסט לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית, ייתכן שיחלפו 3 עד 6 שבועות עד שהסימפטומים שלך יתחילו להשתפר, ו-12 שבועות או יותר עד שתרגיש את התועלת המלאה של מתוטרקסט. המשך ליטול מתוטרקסט גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק ליטול מתוטרקסט מבלי לדבר עם הרופא שלך.

השימושים בתרופה זו

מתוטרקסט משמש לעתים גם לטיפול במחלת קרוהן (מצב שבו מערכת החיסון תוקפת את רירית מערכת העיכול, גורמת לכאבים, שלשולים, ירידה במשקל וחום), טרשת נפוצה (MS; מצב בו מערכת החיסון תוקפת את העצבים, גורם לחולשה, חוסר תחושה, אובדן קואורדינציה בשרירים ובעיות בראייה, דיבור ושליטה בשלפוחית השתן), ומחלות אוטואימוניות אחרות

מחלות (מצבים המתפתחים כאשר מערכת החיסון תוקפת בטעות תאים בריאים בגוף). שאל את הרופא שלך לגבי הסיכונים בשימוש בתרופה זו למצבך.

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת מתוטרקסט,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי ל-methotrexate, לכל תרופה אחרת או לכל אחד מהמרכיבים בטבליות methotrexate.שאל את הרופא או הרוקח שלך עבור רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה לוקח או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר את התרופות המפורטות בסעיף אזהרה חשובה וכל אחת מהאפשרויות הבאות: אנטיביוטיקה מסויימת כגון כלורמפניקול (כלורומיצטין), פניצילינים וטטרציקלינים; חומצה פולית (זמינה לבד או כמרכיב בכמה מולטי ויטמינים); תרופות אחרות לדלקת מפרקים שגרונית; פניטואין (דילנטין); probenecid (בנמיד); סולפנאמידים כגון קו-טרימוקסזול (Bactrim, Septra),)Urobiotic(sulfadiazine, sulfamethizole ו -)Gantrisin(sulfisoxazole;ותיאופילין (Theochron, Theolair). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.

- ספר לרופא שלך אם יש לך או היה לך אי פעם אחד מהמצבים המוזכרים בסעיף אזהרה חשובה או רמה נמוכה של חומצה פולית בדם שלך.
- אל תניקי בזמן שאת נוטלת מתוטרקסט.
- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל מתוטרקסט.

- תכנן להימנע מחשיפה מיותרת או ממושכת לאור שמש או לאור אולטרה סגול (מיטות שיזוף ומנורות שמש) וללבוש ביגוד מגן, משקפי שמש וקרם הגנה. Methotrexate עשוי להפוך את העור שלך לרגיש לאור שמש או לאור אולטרה סגול. אם יש לך פסוריאזיס, הפצעים שלך עלולים להחמיר אם תחשוף את העור לאור השמש בזמן שאתה נוטל מתוטרקסט.
- אין לך חיסונים כלשהם במהלך הטיפול שלך במתוטרקסט מבלי לדבר עם הרופא שלך.

האם עלי לפעול לפי הוראות תזונתיות מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

תופעות לוואי של תרופה זו יכולה לגרום?

עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף: Methotrexate

- סחֶרַחוֹרֶתֶ

- נומהָ
- כּאֵב ראֹש
- חניכיים נפוחות ורכות
- תיאבון מופחת
- עיניים אדומות
- איבוד שיער

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים האלה או מאלה המפורטים בסעיף אזהרה חשובה, התקשר לרופא שלך מיד:

- ראייה מטושטשת או אובדן ראייה פתאומי
- התקפים
- בִּלְבּוּל
- חולשה או קושי להזיז את אחד או שני הצדדים של הגוף
- אובדן ההכרה

.עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה Methotrexate

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatchבאינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[) או בטלפון (332-800-1-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (http://goo.gl/c4Rm4p]http://goo.gl/c4Rm4p[) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות .כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם.
http://www.upandaway.org]http://www.upandaway.org[

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

צריך לדעת מידע אחר?

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כמו ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- ראומטרקס®
- טרקסאל®

השמות שלהם

- אמטופטרין
- MTX

מתוקן לאחרונה - 15/04/2017

למד כיצד לצטט דף זה

האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור

AHFS®מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות®כל הזכויות שמורות. שִׁכְפּוּל .4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland ,
לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022