Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682019.html

Metotrexato

pronunciado como (meth'' oh trex' ate)

AVISO IMPORTANTE:

O metotrexato pode causar efeitos colaterais muito graves e com risco de vida. Você só deve tomar metotrexato para tratar câncer ou outras condições muito graves e que não podem ser tratadas com outros medicamentos. Converse com seu médico sobre os riscos de tomar metotrexato para sua condição.

Informe o seu médico se você tem ou já teve excesso de líquido na área do estômago ou no espaço ao redor dos pulmões e se tem ou já teve doença renal. Informe também o seu médico se estiver a tomar medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), como aspirina, trisalicilato de magnésio colina (Ticosal, Trilisate), ibuprofeno (Advil, Motrin), salicilato de magnésio (Doan's), naproxeno (Aleve, Naprosyn) ou salsalato. Essas condições e medicamentos podem aumentar o risco de você desenvolver efeitos colaterais graves do metotrexato. O seu médico irá monitorizá-lo com mais cuidado e poderá ter de lhe dar uma dose mais baixa de metotrexato ou interromper o seu tratamento com metotrexato.

O metotrexato pode causar uma diminuição no número de células sanguíneas produzidas pela medula óssea. Informe o seu médico se tem ou já teve um número baixo de qualquer tipo de células sanguíneas ou qualquer outro problema com as suas células sanguíneas. Ligue para o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas: dor de garganta, calafrios, febre ou outros sinais de infecção; hematomas ou sangramentos incomuns; cansaço excessivo; pele pálida; ou falta de ar.

O metotrexato pode causar danos ao fígado, especialmente quando tomado por um longo período de tempo. Se você bebe ou já bebeu grandes quantidades de álcool ou se tem ou já teve doença hepática, seu médico pode lhe dizer para não tomar metotrexato, a menos que você tenha uma forma de câncer com risco de vida, porque há um risco maior de você desenvolver danos no fígado. O risco de desenvolver danos no fígado também pode ser maior se você for idoso, obeso ou tiver diabetes. Informe o seu médico se estiver tomando algum dos seguintes medicamentos: acitretina (Soriatane), azatioprina (Imuran), isotretinoína (Accutane), sulfassalazina (Azulfidine) ou tretinoína (Vesanoid). Pergunte ao seu médico sobre o uso seguro de bebidas alcoólicas enquanto estiver tomando metotrexato. Contacte o seu médico imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas: náuseas, cansaço extremo, falta de energia, perda de apetite, dor na parte superior direita do estômago, amarelecimento da pele ou dos olhos ou sintomas semelhantes aos da gripe. O seu médico pode solicitar biópsias hepáticas (remoção de um pequeno pedaço de tecido hepático para ser examinado em laboratório) antes e durante o tratamento com metotrexato.

O metotrexato pode causar danos nos pulmões. Informe o seu médico se tem ou já teve doença pulmonar. Ligue para o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas: tosse seca, febre ou falta de ar.

O metotrexato pode causar danos ao revestimento da boca, estômago ou intestinos. Informe o seu médico se você tem ou já teve úlceras estomacais ou colite ulcerativa (uma condição que causa inchaço e feridas no revestimento do cólon [intestino grosso] e reto). Se você tiver algum dos seguintes sintomas, pare de tomar metotrexato e chame seu médico imediatamente: feridas na boca, diarréia, fezes pretas, alcatroadas ou com sangue, ou vômito com sangue ou com aparência de borra de café.

Tomar metotrexato pode aumentar o risco de desenvolver linfoma (câncer que começa nas células do sistema imunológico). Se você desenvolver linfoma, ele pode desaparecer sem tratamento quando você parar de tomar metotrexato, ou pode precisar ser tratado com quimioterapia.

Se estiver a tomar metotrexato para tratar o cancro, pode desenvolver certas complicações, uma vez que o metotrexato funciona para destruir as células cancerígenas. O seu médico irá monitorizá-lo cuidadosamente e tratar estas complicações se ocorrerem.

O metotrexato pode causar reações cutâneas graves ou potencialmente fatais. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: febre, erupção cutânea, bolhas ou descamação da pele.

O metotrexato pode diminuir a atividade do seu sistema imunológico e você pode desenvolver infecções graves. Informe o seu médico se tiver algum tipo de infeção e se tem ou já teve alguma condição que afete o seu sistema imunitário. Seu médico pode dizer que você não deve tomar metotrexato a menos que tenha câncer com risco de vida. Se você tiver sinais de infecção, como dor de garganta, tosse, febre ou calafrios, ligue para o seu médico imediatamente.

Se você tomar metotrexato enquanto estiver sendo tratado com radioterapia para câncer, o metotrexato pode aumentar o risco de que a radioterapia cause danos à sua pele, ossos ou outras partes do seu corpo.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico solicitará alguns exames laboratoriais antes, durante e após o tratamento para verificar a resposta do seu corpo ao metotrexato e para tratar os efeitos colaterais antes que se tornem graves.

Informe o seu médico se você ou seu parceiro está grávida ou planeja engravidar. Se você for do sexo feminino, precisará fazer um teste de gravidez antes de começar a tomar metotrexato. Use um método confiável de controle de natalidade para que você ou seu parceiro não engravidem durante ou logo após o tratamento. Se você for homem, você e sua parceira devem continuar a usar anticoncepcionais por 3 meses após parar de tomar metotrexato. Se for mulher, deve continuar a usar anticoncepcionais até ter um período menstrual que começou depois de ter parado de tomar metotrexato. Se você ou seu parceiro engravidarem, ligue para o seu médico imediatamente. O metotrexato pode causar danos ou morte ao feto.

por que este medicamento é prescrito?

O metotrexato é usado para tratar a psoríase grave (uma doença de pele na qual se formam manchas vermelhas e escamosas em algumas áreas do corpo) que não podem ser controladas por outros tratamentos. O metotrexato também é usado junto com repouso, fisioterapia e, às vezes, outros medicamentos para tratar a artrite reumatóide ativa grave (AR; uma condição na qual o corpo ataca suas próprias articulações, causando dor, inchaço e perda de função) que não pode ser controlada por alguns outros medicamentos. O metotrexato também é usado para tratar certos tipos de câncer, incluindo cânceres que começam nos tecidos que se formam ao redor de um óvulo fertilizado no útero, câncer de mama, câncer de pulmão, certos tipos de câncer de cabeça e pescoço, certos tipos de linfoma e leucemia (câncer que começa nos glóbulos brancos). O metotrexato está em uma classe de medicamentos chamados antimetabólitos. O metotrexato trata o câncer retardando o crescimento das células cancerígenas. O metotrexato trata a psoríase retardando o crescimento das células da pele para impedir a formação de escamas. O metotrexato pode tratar a artrite reumatóide, diminuindo a atividade do sistema imunológico.

como este medicamento deve ser usado?

O metotrexato vem como um comprimido para tomar por via oral. O seu médico irá dizer-lhe com que frequência deve tomar metotrexato. O cronograma depende da condição que você tem e de como seu corpo responde à medicação.

Seu médico pode lhe dizer para tomar metotrexato em um esquema rotativo que alterna vários dias quando você toma metotrexato com vários dias ou semanas quando você não toma a medicação. Siga estas instruções cuidadosamente e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se não souber quando tomar a medicação.

Se estiver a tomar metotrexato para tratar a psoríase ou a artrite reumatóide, o seu médico pode dizer-lhe para tomar a medicação uma vez por semana. Preste muita atenção às instruções do seu médico. Algumas pessoas que tomaram metotrexato por engano uma vez ao dia em vez de uma vez por semana experimentaram efeitos colaterais muito graves ou morreram.

Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome metotrexato exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Se estiver a tomar metotrexato para tratar a psoríase ou a artrite reumatóide, o seu médico pode começar com uma dose baixa do medicamento e aumentar gradualmente a sua dose. Siga estas instruções cuidadosamente.

Se você estiver tomando metotrexato para tratar a artrite reumatoide, pode levar de 3 a 6 semanas para que seus sintomas comecem a melhorar e 12 semanas ou mais para sentir todos os benefícios do metotrexato. Continue a tomar metotrexato mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar metotrexato sem falar com o seu médico.

outros usos para este medicamento

O metotrexato também é usado às vezes para tratar a doença de Crohn (condição na qual o sistema imunológico ataca o revestimento do trato digestivo, causando dor, diarréia, perda de peso e febre), esclerose múltipla (EM; condição na qual o sistema imunológico ataca os nervos, causando fraqueza, dormência, perda de coordenação muscular e problemas de visão, fala e controle da bexiga) e outras doenças autoimunes.

doenças (condições que se desenvolvem quando o sistema imunológico ataca as células saudáveis do corpo por engano). Pergunte ao seu médico sobre os riscos de usar este medicamento para sua condição.

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar metotrexato,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao metotrexato, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de metotrexato. Peça ao seu médico ou farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar os medicamentos listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE e qualquer um dos seguintes: certos antibióticos, como cloranfenicol (cloromicetina), penicilinas e tetraciclinas; ácido fólico (disponível sozinho ou como ingrediente em alguns multivitamínicos); outros medicamentos para artrite reumatóide; fenitoína (Dilantin); probenecida (Benemid); sulfonamidas tais como cotrimoxazol (Bactrim, Septra), sulfadiazina, sulfametizol (Urobiotic) e sulfisoxazol (Gantrisin); e teofilina (Theochron, Theolair). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se você tem ou já teve alguma das condições mencionadas na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE ou um baixo nível de folato no sangue.
- não amamente enquanto estiver a tomar metotrexato.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar metotrexato.
- planeje evitar a exposição desnecessária ou prolongada à luz solar ou à luz ultravioleta (camas de bronzeamento e lâmpadas solares) e usar roupas de proteção, óculos de sol e protetor solar. O metotrexato pode tornar sua pele sensível à luz solar ou à luz ultravioleta. Se você tem psoríase, suas feridas podem piorar se você expor sua pele à luz solar enquanto estiver tomando metotrexato.
- não tome nenhuma vacina durante o tratamento com metotrexato sem falar com o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

O metotrexato pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- tontura

- sonolência
- dor de cabeça
- gengivas inchadas e sensíveis
- diminuição do apetite
- olhos avermelhados
- perda de cabelo

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas ou os listados na secção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, contacte o seu médico imediatamente:

- visão turva ou perda súbita de visão
- convulsões
- confusão
- fraqueza ou dificuldade em mover um ou ambos os lados do corpo
- perda de consciência

O metotrexato pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Rheumatrex®
- Trexall®

outros nomes

- Ametopterina
- MTX

Última revisão - 15/04/2017

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022