



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → Methoxy Polyethylene Glycol-Epoetin Beta ฉีด

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619007.html>

Methoxy Polyethylene Glycol-Epoetin Beta ฉีด

ออกเสียงว่า (meth ox" ee pol" ee eth 'i leen glye' kol e poe' e tin bay' ta)

คำเตือนที่สำคัญ:

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง:

การใช้ methoxy polyethylene glycol-epoetin beta injection อาจเพิ่มความเสี่ยงที่สั้มเลือดจะก่อตัวหรือเคลื่อนไปที่ขาและปอด แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง สั้มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (DVT สั้มเลือดที่ขา) เส้นเลือดอุดตันที่ปอด (PE; สั้มเลือดในปอด) หรือหากคุณกำลังจะเป็นโรค การผ่าตัด. ก่อนทำการผ่าตัดใดๆ แม้แต่การผ่าตัดทางทันตกรรม แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังรับการรักษาดังกล่าว การฉีด methoxy polyethylene glycolepoetin beta โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมีการผ่าตัดปลูกถ่ายหลอดเลือดหัวใจ (CABG) หรือการผ่าตัดเพื่อรักษาปัญหากระดูก แพทย์ของคุณอาจสั่งยาต้านการแข็งตัวของเลือด ("ทินเนอร์เลือด") เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสั้มเลือดในระหว่างการผ่าตัด หากคุณกำลังรับการบำบัดด้วยการฟอกไต (การรักษาเพื่อขจัดของเสียออกจากเลือดเมื่อไตไม่ทำงาน) สั้มเลือดอาจเกิดขึ้นในการเข้าถึงหลอดเลือดของคุณ (สถานที่ที่ท่อไตเทียมเชื่อมต่อกับร่างกายของคุณ) แจ้งให้แพทย์ทราบหากการเข้าถึงหลอดเลือดหยุดทำงานตามปกติ หากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที: อาการเจ็บหน้าอก; หายใจลำบากหรือหายใจถี่ ปวดขาโดยมีหรือไม่มีอาการบวม แขนหรือขาที่เย็นหรือซีด ความสับสน ปัญหาในการพูด; แขนหรือขาอ่อนแรงหรือชาอย่างกะทันหัน (โดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย) หรือที่ใบหน้า ปัญหาการมองเห็น เดินลำบาก อาการวิงเวียนศีรษะ สูญเสียความสมดุล หรือการประสานงาน; หรือเป็นลม โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที: อาการเจ็บหน้าอก; หายใจลำบากหรือหายใจถี่ ปวดขาโดยมีหรือไม่มีอาการบวม แขนหรือขาที่เย็นหรือซีด ความสับสน ปัญหาในการพูด; แขนหรือขาอ่อนแรงหรือชาอย่างกะทันหัน (โดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย) หรือที่ใบหน้า ปัญหาการมองเห็น เดินลำบาก อาการวิงเวียนศีรษะ สูญเสียความสมดุลหรือการประสานงาน; หรือเป็นลม โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที: อาการเจ็บหน้าอก; หายใจลำบากหรือหายใจถี่ ปวดขาโดยมีหรือไม่มีอาการบวม แขนหรือขาที่เย็นหรือซีด ความสับสน ปัญหาในการพูด; แขนหรือขาอ่อนแรงหรือชาอย่างกะทันหัน (โดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย) หรือที่ใบหน้า ปัญหาการมองเห็น เดินลำบาก อาการวิงเวียนศีรษะ สูญเสียความสมดุลหรือการประสานงาน; หรือเป็นลม

แพทย์ของคุณจะปรับขนาดยาฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta เพื่อให้ระดับฮีโมโกลบินของคุณ (ปริมาณโปรตีนที่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดง) สูงพอที่คุณไม่จำเป็นต้องถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแดง (ถ่ายโอนสีแดงของบุคคลหนึ่งคน เซลล์เม็ดเลือดไปยังร่างกายของบุคคลอื่นเพื่อรักษาโรคโลหิตจางอย่างรุนแรง) หากคุณได้รับการฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta มากพอที่จะเพิ่มฮีโมโกลบินของคุณให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงปกติ มีความเสี่ยงมากขึ้นที่คุณจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือพัฒนาปัญหาหัวใจที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตรวมทั้งหัวใจวายและภาวะหัวใจล้มเหลว . โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้: อาการเจ็บหน้าอก ความดันกด หรือความรัดกุม; หายใจถี่; คลื่นไส้ มึนหัว; เหงื่อออก; ความรู้สึกไม่สบายหรือปวดแขน, ไหล่ คอ กราม หรือหลัง หรือบวมที่มือ เท้า หรือข้อเท้า

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะตรวจสอบความดันโลหิตของคุณบ่อยๆ ระหว่างการรักษาด้วยการฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta ของคุณ

แพทย์จะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาหรือบอกให้คุณหยุดใช้การฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta เป็นระยะเวลาหนึ่ง หากการทดสอบแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลข้างเคียง ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างระมัดระวัง

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหาก你有คำถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

ผู้ป่วยมะเร็ง:

ไม่ควรใช้การฉีด Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta เพื่อรักษาภาวะโลหิตจางที่เกิดจากเคมีบำบัดมะเร็ง

hy เป็นยานี้กำหนด?

การฉีด Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta ใช้รักษาโรคโลหิตจาง (จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ) ในผู้ที่ เป็นโรคไตวายเรื้อรัง (ภาวะที่ไตหยุดทำงานอย่างช้า ๆ และถาวรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง) ในผู้ใหญ่และ ไม่ได้ฟอกไตและในเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ฟอกไตที่ได้รับการรักษาภาวะโลหิตจางแล้ว ไม่ควรใช้การฉีด Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta ในการรักษาโรคโลหิตจางที่เกิดจากเคมีบำบัดมะเร็ง และไม่ควรใช้แทนการถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง การฉีด Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (ESAs) มันทำงานโดย ทำให้ไขกระดูก (เนื้อเยื่ออ่อนภายในกระดูกที่สร้างเลือด) เพื่อสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงมากขึ้น

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

การฉีด Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta เป็นสารละลาย (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (เข้าเส้นเลือด) ในผู้ใหญ่และทางหลอดเลือดดำในเด็ก โดยปกติแล้วจะฉีดทุกๆ 2 หรือ 4 สัปดาห์ตามที่แพทย์ของคุณกำหนด ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้การฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta ตรงตามที่กำหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

แพทย์ของคุณจะเริ่มต้นให้คุณในขนาดต่ำของการฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta และปรับขนาดยาตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและความรู้สึกของคุณ โดยปกติไม่เกินเดือนละครั้ง แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดใช้การฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta เป็นระยะ ๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

อย่าเขย่าการฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

ฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta injection ลงในกระบอกฉีดยาของตัวเองเสมอ ห้ามเขย่าด้วยของเหลวใดๆ และห้ามผสมกับยาอื่นๆ

แพทย์หรือพยาบาลอาจให้การฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta หรือแพทย์ของคุณอาจตัดสินใจว่าคุณสามารถฉีดด้วยตัวเองหรือคุณอาจให้เพื่อนหรือญาติฉีดยา คุณและบุคคลที่จะทำการฉีดยาควรอ่านข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วยที่มาพร้อมกับการฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta ก่อนที่คุณจะใช้เป็นครั้งแรกที่บ้าน ขอให้แพทย์ของคุณแสดงให้คุณเห็นหรือบุคคลที่จะฉีดยาวิธีการฉีดยา

คุณสามารถฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta injection ได้ผิวหนังบริเวณใดก็ได้ที่บริเวณด้านนอกของต้นแขน ตรงกลางของต้นขาด้านหน้า หรือท้อง

ดูที่สารละลายเมทอกซี โพลีเอทิลีนไกลคอล-อีโพอทินเบตา ก่อนทำการฉีดเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มฉีดยาที่บรรจุไว้ล่วงหน้า นั้นติดฉลากชื่อที่ถูกต้องและความแรงของยาและวันหมดอายุที่ยังไม่ผ่าน ตรวจสอบดูด้วยว่าสารละลายมีความใสและไม่มีสิ่งเจือปนออกเหลืองเล็กน้อย และไม่มีก้อน สะเก็ด หรืออนุภาค หากมีปัญหากับยาของคุณ โปรดติดต่อเภสัชกรและอย่าฉีดยา

อย่าใช้หลอดฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้ามากกว่าหนึ่งครั้ง ทิ้งกระบอกฉีดยาที่ใช้แล้วในภาชนะที่ทนต่อการเจาะ ถ้ามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้ใช้อื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันทควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพ้ methoxy polyethylene glycol-epoetin beta ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา
- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ ถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และหากเคยมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (PRCA) โรคโลหิตจางชนิดรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นหลังการรักษาด้วย ESA เช่น การฉีดดาร์บีโพอทิน อัลฟา การฉีดอีพอเอทิน อัลฟา หรือเมทอกซี polyethylene glycol-epoetin beta แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้การฉีด methoxy polyethylene glycol-epoetin beta
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากเคยเป็นหรือเคยมีอาการชักหรือเป็นมะเร็ง
- แจ้งแพทย์หากกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากตั้งครรภ์ขณะใช้การฉีดเมทอกซีโพลีเอทิลีนไกลคอล-อีโพอทินเบตาโทรหาแพทย์ของคุณ

ฉันทควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

แพทย์ของคุณอาจสั่งอาหารพิเศษเพื่อช่วยควบคุมความดันโลหิตของคุณและช่วยเพิ่มระดับธาตุเหล็กเพื่อให้การฉีดเมทอกซีโพลีเอทิลีนไกลคอล-อีพอเอทินเบตาทำงานได้ดีที่สุด ปฏิบัติตามคำแนะนำนำเหล่านี้อย่างระมัดระวังและสอบถามแพทย์หรือนักโภชนาการหากคุณมีคำถามใดๆ

ฉันควรทำอะไรถ้าฉันลืมยา?

โทรหาแพทย์ของคุณเพื่อถามว่าต้องทำอะไรหากคุณพลาดการฉีดเมทอกซีโพลีเอทิลีนไกลคอล - อีพอเอทินเบตา อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีดเมทอกซีโพลีเอทิลีนไกลคอล-เอพอเอทินเบตาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- กืองเสียว
- อาเจียน
- กืองผูก
- น้ำมูกไหล จาม และคัดจมูก
- ปวดหัว
- กล้ามเนื้อกระตุก
- ปวดหลัง
- อาการปวดท้อง
- มีไข้ ไอ หรือหนาวสั่น
- ปวดขาหรือมือ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

- ผื่น
- ลมพิษ
- อาการคัน
- ผื่นหนังพุพองหรือผิวลอก
- หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม
- หายใจดังเสียงฮืด ๆ
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
- อาการชัก

การฉีดเมทอกซีโพลีเอทิลีนไกลคอล-เอพอเอทินเบตาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาดังกล่าว ใดๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉันทันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?

เก็บยาไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ในตู้เย็นและให้ห่างจากแสง นอกจากนี้ยังสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 30 วัน; อย่าหยุดมัน ทิ้งยาที่ถูกแช่แข็งหรือหากเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนานกว่า 30 วัน

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตาครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล๊อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ <https://www.poissonhelp.org/help> [<https://www.poissonhelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

- หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันทันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- Mircera®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2019

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบธesda, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022