TITLE - METHOXY POLYETHYLENE GYCOL-EPOETIN BETA / MIRCERA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN CHINESE

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619007.html

甲氧基聚乙二醇-Epoetin Beta 注射液

发音为 (meth ox" ee pol" ee eth' i leen glye' kol e poe' e tin bay' ta)

重要警告：

慢性肾病患者：

使用甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液可能会增加血栓在腿部和肺部形成或移动到腿部和肺部的风险。告诉您的医生您是否患有或曾经患有心脏病、中风、深静脉血栓形成（DVT；腿部血栓）、肺栓塞（PE；肺部血栓），或者您是否将患手术。在进行任何手术（甚至是牙科手术）之前，请告诉您的医生或牙医您正在接受甲氧基聚乙二醇生成素 β 注射液治疗，尤其是在您进行冠状动脉旁路移植术 (CABG) 手术或治疗骨骼问题的手术时。您的医生可能会开一种抗凝剂（“血液稀释剂”）以防止在手术过程中形成凝块。如果您正在接受血液透析治疗（在肾脏不工作时从血液中清除废物的治疗），您的血管通路（血液透析管连接到您身体的地方）可能会形成血块。如果您的血管通路停止正常工作，请告诉您的医生。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生或立即寻求医疗帮助：胸痛；呼吸困难或呼吸急促；腿部疼痛，伴有或不伴有肿胀；凉爽或苍白的手臂或腿；困惑; 说话困难；手臂或腿（尤其是身体的一侧）或面部突然虚弱或麻木；视力问题；行走困难；头晕; 失去平衡或协调；或昏厥。立即致电您的医生或立即寻求医疗帮助：胸痛；呼吸困难或呼吸急促；腿部疼痛，伴有或不伴有肿胀；凉爽或苍白的手臂或腿；困惑; 说话困难；手臂或腿（尤其是身体的一侧）或面部突然虚弱或麻木；视力问题；行走困难；头晕; 失去平衡或协调；或昏厥。立即致电您的医生或立即寻求医疗帮助：胸痛；呼吸困难或呼吸急促；腿部疼痛，伴有或不伴有肿胀；凉爽或苍白的手臂或腿；困惑; 说话困难；手臂或腿（尤其是身体的一侧）或面部突然虚弱或麻木；视力问题；行走困难；头晕; 失去平衡或协调；或昏厥。

您的医生会调整您注射甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 的剂量，使您的血红蛋白水平（在红细胞中发现的一种蛋白质的量）刚好足够高到您不需要输注红细胞（转移一个人的红细胞将血细胞转移到另一个人的身体以治疗严重的贫血症）。如果您接受足够的甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液以将您的血红蛋白增加到正常或接近正常水平，那么您中风或出现严重或危及生命的心脏问题（包括心脏病发作和心力衰竭）的风险更大. 如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生或寻求紧急医疗帮助：胸痛、挤压或紧绷；气促; 恶心; 头晕目眩；出汗; 手臂不适或疼痛，肩部、颈部、下巴或背部；或手、脚或脚踝肿胀。

与您的医生和实验室保持所有约会。在您使用甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液治疗期间，您的医生会经常监测您的血压。您的

医生还会下令进行某些测试，以检查您的身体对甲氧基聚乙二醇生成素 β 注射液的反应。如果测试表明您有出现严重副作用的高风险，您的医生可能会减少您的剂量或告诉您停止使用甲氧基聚乙二醇 - 依泊汀 β 注射液一段时间。仔细遵循医生的指示。

当您开始使用甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液进行治疗时以及每次重新配药时，您的医生或药剂师都会为您提供制造商的患者信息表（药物指南）。仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。您也可以访问美国食品和药物管理局 (FDA) 网站

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 或制造商的网站获取用药指南。

与您的医生讨论接受甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液的风险。

癌症患者:

甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液不应用于治疗癌症化疗引起的贫血。

为什么要开这种药？

甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液用于治疗成人慢性肾功能衰竭（肾脏在一段时间内缓慢永久停止工作）患者的贫血（红细胞数量低于正常值）和不接受透析治疗的儿童以及 5 岁及以上接受过透析治疗且已经接受过另一种贫血治疗的儿童。甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液不应用于治疗癌症化疗引起的贫血，也不应用于代替红细胞输注治疗严重贫血。甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液属于一类称为促红细胞生成剂 (ESA) 的药物。它的作用是使骨髓（制造血液的骨骼内的软组织）产生更多的红细胞。

这个药应该怎么用？

甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液以溶液（液体）形式出现，用于成人皮下（皮下）或静脉内（静脉内）注射，儿童静脉内注射。它通常按照医生的指示每 2 或 4 周注射一次。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示使用甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液。不要使用或多或少地使用它，或者使用它比医生规定的更频繁。

您的医生会开始给您注射低剂量的甲氧基聚乙二醇-epoetin beta，并根据您的实验室结果和您的感觉调整您的剂量，通常每月不超过一次。您的医生也可能会告诉您停止使用甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液一段时间。请仔细遵循这些说明。

不要摇晃甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液。

始终在其自己的注射器中注射甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液。不要用任何液体稀释它，也不要与任何其他药物混合。

甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射剂可能由医生或护士进行，或者您的医生可能会决定您可以自己注射，或者您可能有朋友或亲戚进行注射。您和将要进行注射的人在您第一次在家中使用之前，应该阅读制造商为患者提供的甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液的信息。请您的医生向您或将要注射药物的人展示如何注射药物。

您可以将甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液注射到上臂外侧、大腿前部中部或胃部的任何部位的皮下。

注射前务必查看甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 溶液。确保预充式注射器上标有正确的药物名称和强度以及尚未过期的有效期。还要检查溶液是否清澈、无色至略带黄色，并且不含结块、薄片或颗粒。如果您的药物有任何问题，请致电您的药剂师，不要注射。

不要多次使用预装注射器。将用过的注射器丢弃在防刺穿容器中。询问您的医生或药剂师如何处置防刺穿容器。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在使用甲氧基聚乙二醇-epoetin beta注射液之前，

- 如果您对甲氧基聚乙二醇-epoetin beta、任何其他药物或甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。请咨询您的药剂师或查看药物指南以获取成分列表。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药、维生素、营养补充剂。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 告诉您的医生您是否患有或曾经患有高血压，以及您是否曾经患有纯红细胞再生障碍（PRCA；一种在使用 ESA（如 darbepoetin alfa 注射液、epoetin alfa 注射液或甲氧基）治疗后可能出现的严重贫血症聚乙二醇-epoetin beta. 您的医生可能会告诉您不要使用甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液。
- 如果您有或曾经有过癫痫或癌症，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在使用甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液时怀孕，请致电您的医生。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

您的医生可能会开一种特殊的饮食来帮助控制您的血压并帮助增加您的铁水平，以便甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液尽可能地发挥作用。仔细遵循这些指示，如果您有任何问题，请咨询您的医生或营养师。

如果我忘记服药该怎么办？

如果您错过一剂甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液，请致电您的医生询问该怎么做。不要使用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 腹泻
- 呕吐
- 便秘
- 流鼻涕、打喷嚏和充血
- 头痛
- 肌肉痉挛
- 背痛
- 肚子痛
- 发烧、咳嗽或发冷
- 腿或手疼痛

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状或“重要警告”部分中列出的症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 皮疹
- 麻疹
- 瘙痒
- 皮肤水泡或脱皮
- 面部、喉咙、舌头、嘴唇或眼睛肿胀
- 喘息
- 呼吸或吞咽困难
- 癫痫发作

甲氧基聚乙二醇-epoetin beta 注射液可能会引起其他副作用。如果您在使用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在冰箱中并远离光线。它也可以在室温下储存长达 30 天；不要冻结它。丢弃任何已冷冻或已在室温下储存超过 30 天的药物。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括：

- 快速或快速的心跳

我应该知道其他信息吗？

不要让其他人使用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 米塞拉®

最后修订 - 2019 年 1 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日