Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682795.html

Metilprednisolona

pronunciado como (meth ill pred niss' oh lone)

por que este medicamento é prescrito?

A metilprednisolona, um corticosteróide, é semelhante a um hormônio natural produzido pelas glândulas supra-renais. Muitas vezes, é usado para substituir esse produto químico quando seu corpo não o produz o suficiente. Alivia a inflamação (inchaço, calor, vermelhidão e dor) e é usado para tratar certas formas de artrite; pele, sangue, rim, olho, tireóide e distúrbios intestinais (por exemplo, colite); alergias graves; e asma. A metilprednisolona também é usada para tratar certos tipos de câncer.

Este medicamento às vezes é prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

como este medicamento deve ser usado?

A metilprednisolona vem como um comprimido para tomar por via oral. O seu médico irá prescrever um esquema de dosagem que seja melhor para você. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome metilprednisolona exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Não pare de tomar metilprednisolona sem falar com seu médico. Parar a droga abruptamente pode causar perda de apetite, dor de estômago, vômitos, sonolência, confusão, dor de cabeça, febre, dores articulares e musculares, descamação da pele e perda de peso. Se você tomar grandes doses por um longo tempo, seu médico provavelmente diminuirá sua dose gradualmente para permitir que seu corpo se ajuste antes de interromper completamente o medicamento. Fique atento a estes efeitos secundários se estiver a diminuir gradualmente a sua dose e depois de parar de tomar os comprimidos. Se estes problemas ocorrerem, contacte o seu médico imediatamente. Pode ser necessário aumentar a dose de comprimidos temporariamente ou começar a tomá-los novamente.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar metilprednisolona,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a metilprednisolona, aspirina, tartrazina (um corante amarelo em alguns alimentos e medicamentos processados) ou qualquer outro medicamento.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos você está tomando, especialmente anticoagulantes ('diluentes do sangue'), como varfarina (Coumadin), medicamentos para artrite, aspirina, azitromicina (Zithromax), claritromicina (Biaxin), ciclosporina (Neoral, Sandimmune) , digoxina (Lanoxin), diuréticos ('pílulas de água'), eritromicina, estrogênio (Premarin), cetoconazol (Nizoral), oral

anticoncepcionais, fenobarbital, fenitoína (Dilantin), rifampicina (Rifadin), teofilina (Theo-Dur) e vitaminas.

- se você tiver uma infecção fúngica (exceto na pele), não tome metilprednisolona sem falar com seu médico.
- informe o seu médico se tem ou já teve doença hepática, renal, intestinal ou cardíaca; diabetes; uma glândula tireóide hipoativa; pressão alta; doença mental; miastenia grave; osteoporose; infecção ocular por herpes; convulsões; tuberculose (TB); ou úlceras.
- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar metilprednisolona, contacte o seu médico.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar metilprednisolona.
- se você tem um histórico de úlceras ou toma grandes doses de aspirina ou outro medicamento para artrite, limite o consumo de bebidas alcoólicas enquanto estiver tomando este medicamento. A metilprednisolona torna o estômago e os intestinos mais suscetíveis aos efeitos irritantes do álcool, aspirina e certos medicamentos para artrite. Este efeito aumenta o risco de úlceras.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Seu médico pode instruí-lo a seguir uma dieta com baixo teor de sódio, baixo teor de sal, rica em potássio ou rica em proteínas. Siga estas instruções.

A metilprednisolona pode causar dor de estômago. Tome metilprednisolona com alimentos ou leite.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Quando você começar a tomar metilprednisolona, pergunte ao seu médico o que fazer se você esquecer uma dose. Anote essas instruções para que você possa consultá-las mais tarde.

Se você tomar metilprednisolona uma vez ao dia, tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A metilprednisolona pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- dor de estômago
- irritação do estômago
- vômito
- dor de cabeça
- tontura
- insônia
- inquietação

- depressão
- ansiedade
- acne
- aumento do crescimento do cabelo
- contusões fáceis
- períodos menstruais irregulares ou ausentes

Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

- erupção cutânea
- rosto inchado, pernas ou tornozelos inchados
- problemas de visão
- resfriado ou infecção que dura muito tempo
- fraqueza muscular
- fezes pretas ou alcatroadas

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima desmaiou,

teve uma convulsão, tem dificuldade para respirar ou não pode ser acordado, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará alguns exames de laboratório para verificar sua resposta à metilprednisolona. Os exames são especialmente importantes para crianças porque a metilprednisolona pode retardar o crescimento ósseo.

Se a sua condição piorar, ligue para o seu médico. Sua dose pode precisar ser ajustada.

Leve um cartão de identificação que indique que você pode precisar tomar doses suplementares (anote a dose completa que você tomou antes de diminuí-la gradualmente) de metilprednisolona durante períodos de estresse (lesões, infecções e ataques de asma graves). Pergunte ao seu farmacêutico ou médico como obter este cartão. Liste seu nome, problemas médicos, medicamentos e dosagens, nome do médico e número de telefone no cartão.

Este medicamento torna você mais suscetível a doenças. Se você estiver exposto a catapora, sarampo ou tuberculose (TB) enquanto estiver tomando metilprednisolona, ligue para o seu médico. Não tome vacina, outra imunização ou qualquer teste cutâneo enquanto estiver tomando metilprednisolona, a menos que seu médico lhe diga que você pode.

Relate quaisquer lesões ou sinais de infecção (febre, dor de garganta, dor ao urinar e dores musculares) que ocorram durante o tratamento.

Seu médico pode instruí-lo a se pesar todos os dias. Relate qualquer ganho de peso incomum.

Se a sua expectoração (a matéria que você expeliu durante um ataque de asma) engrossar ou mudar de cor de branco claro para amarelo, verde ou cinza, ligue para o seu médico; essas alterações podem ser sinais de uma infecção.

Se você tem diabetes, a metilprednisolona pode aumentar seu nível de açúcar no sangue. Se você monitora seu açúcar no sangue (glicose) em casa, teste seu sangue ou urina com mais frequência do que o habitual. Ligue para o seu médico se o açúcar no sangue estiver alto ou se o açúcar estiver presente na urina; sua dose de medicação para diabetes e sua dieta podem precisar ser alteradas.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Medrol®

Última revisão - 15/09/2017

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022