Source : New Zealand Medicines Authority

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

מיקמין-

Micafungin (כמו נתרן)

מידע על רפואת צריכה

מה יש בעלון זה

עלון זה עונה על כמה שאלות נפוצות על Mycamine.
הוא אינו מכיל את כל המידע הזמין.
זה לא בא במקום שיחה עם הרופא או הרוקח.

לכל התרופות יש סיכונים ויתרונות.
הרופא שלך שקל את הסיכונים שיש לך Mycamine מול היתרונות שהם מצפים שיהיו לו עבורך.

אם יש לך חששות לגבי נטילת תרופה זו, שאל את הרופא או הרוקח.

שמור עלון זה.

ייתכן שתצטרך לקרוא אותו שוב.

למה משמש Mycamine

תרופה זו משמשת לטיפול:

- מבוגרים, מתבגרים וילדים שיש להם פטרייה רצינית זיהום הנקרא קנדידה פולשנית (זיהום הנגרם על ידי שמרים הנקראים*קַמְחָן*שחדר לגוף)

- מבוגרים ובני נוער ≥ 16 שנים שיש להם זיהום פטרייתי בצינור המזון (וושט) שבו טיפול לווריד מתאים

- מבוגרים, מתבגרים וילדים הנמצאים בסיכון לפתח א*קַמְחָן*(שמרים) זיהום בזמן שעוברים סוג מסוים של השתלת תאי גזע או אם צפויה לך ספירת תאי דם לבנים מתחת לרמה מסוימת.

תרופה זו שייכת לקבוצת תרופות הנקראות אכינוקנדינים המשמשים לטיפול בזיהומים הנגרמים על ידי תאי פטרייה או שמרים הנקראים קנדידה.

זה עובד על ידי הפרעה לייצור של חלק מדופן התא הפטרייתי, מה שהופך את הפטרייה לא מסוגלת לחיות ולגדול.

שאל את הרופא שלך אם יש לך שאלות לגבי הסיבה לכך נרשמה עבורך תרופה.

ייתכן שהרופא שלך רשם את זה מסיבה אחרת.

לפני שנותנים לך Mycamine

כשאסור לקבל את זה

אל תקבל Mycamine אם יש לך אלרגיה ל:

- כל תרופה המכילה מיקאפונגין
- כל אחד מהמרכיבים המפורטים בסוף העלון
- כל תרופה אחרת השייכת לקבוצת האכינוקנדין.

חלק מהתסמינים של תגובה אלרגית עשויים לכלול:

- קוצר נשימה
- צפצופים או קשיי נשימה
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או חלקים אחרים בגוף
- פריחה, גירוד או כוורות על העור

אין להחזיק את התרופה לאחר תאריך התפוגה המודפס על האריזה או אם האריזה קרועה או מראה סימני חבלה.

אם אינך בטוח אם עליך להתחיל לקבל תרופה זו, דבר עם הרופא שלך.

לפני שתתחיל לקחת את זה

ספר לרופא שלך אם יש לך אלרגיות לתרופות, מזונות, חומרים משמרים או צבעים אחרים.

ספר לרופא שלך אם יש לך או היה לך אחד מהמצבים הרפואיים הבאים:

- אנמיה המוליטית (אנמיה עקב פירוק כדוריות דם אדומות) או המוליזה (פירוק כדוריות דם אדומות)
- בעיות בכליות כגון אי ספיקת כליות או בדיקת תפקוד כליות לא תקינה
- בעיות כבד כגון אי ספיקת כבד, הפטיטיס או בדיקות תפקודי כבד לא תקינות.

ספר לרופא שלך אם את בהריון או מתכננת להיכנס להריון או מניקה. הרופא שלך יכול לדון איתך על הסיכונים והיתרונות הכרוכים בכך.

אם לא סיפרת לרופא שלך על כל אחד מהדברים לעיל, ספר לו/ה לפני שתתחיל מקבל Mycamine.

נטילת תרופות אחרות

ספר לרופא או לרוקח אם אתה נוטל תרופה אחרת תרופות, כולל כל מה שאתה מקבל ללא מרשם מבית המרקחת, הסופרמרקט או חנות מזון הבריאות שלך.
תרופות מסוימות ומיקמין עלולים להפריע זה לזה. אלו כוללים:

- תרופות המשמשות לטיפול בזיהומים פטרייתיים, itraconazole
- תרופה המשמשת למניעת השתלת כליה, sirolimus דחִיהָ
- .תרופה המשמשת לטיפול בלחץ דם גבוה, nifedipine

תרופות אלו עשויות להיות מושפעות מ-Mycamine. ייתכן שתצטרך כמויות שונות של אלה תרופות, או אולי תצטרך ליטול תרופות שונות.

לרופא ולרוקח שלך יש מידע נוסף על תרופות שיש להיזהר בהן או להימנע מהן בעת קבלת תרופה זו.

כיצד ניתן מיקמין

תרופה זו חייבת להיות מוכנה ולתת לך בבית החולים על ידי אחות או איש מקצוע אחר בתחום הבריאות.

כמה יתנו לך

הרופא שלך יחליט כמה Mycamine תקבל בכל יום.

למבוגרים, מתבגרים מעל גיל 16:

- המינון הרגיל לטיפול בפולשני *קַנדִידָה* זיהום הוא 100 מ"ג ליום עבור חולים השוקלים יותר מ-40ק"ג, ו-2 מ"ג/ק"ג ליום עבור חולים ששוקלים 40 ק"ג או פחות
- המינון לטיפול *אַספֶרגִילוּס* זיהום בוושט הוא 150 מ"ג עבור חולים השוקלים יותר מ-40 ק"ג ו-3 מ"ג/ק"ג ליום עבור חולים במשקל 40 ק"ג או פחות

- המינון הרגיל לחולים בסיכון לפתח *אַספֶרגִילוּס* הזיהום הוא 50 מ"ג ליום עבור חולים השוקלים יותר מ-40 ק"ג ו-1 מ"ג/ק"ג ליום עבור חולים במשקל 40 ק"ג או פחות.

לילדים (כולל יילודים) ולמתבגרים מתחת לגיל 16:

- המינון הרגיל לטיפול בפולשני *קַנדִידָה* זיהום הוא 100 מ"ג ליום עבור חולים השוקלים יותר מ-40ק"ג, ו-2 מ"ג/ק"ג ליום עבור חולים ששוקלים 40 ק"ג או פחות
- המינון הרגיל לחולים בסיכון לפתח *אַספֶרגִילוּס* זיהום הוא 50 מ"ג ליום עבור חולים השוקלים יותר מ-40 ק"ג ו-1מ"ג/ק"ג ליום עבור חולים במשקל 40 ק"ג או פחות.

מתי זה יינתן

תרופה זו ניתנת פעם ביום בעירוי איטי לווריד. העירוי נמשך בדרך כלל שעה.

כמה זמן יתנו לך את זה

לטיפול בפולשני *קַנדִידָה* זיהום, בדרך כלל תקבל את התרופה למשך 14 יום לפחות, אך הטיפול יימשך בדרך כלל לפחות שבוע לאחר שתסמינים ותוצאות דם מראות שהזיהום הוסר.

למשך *קַנדִידָה* זיהום בוושט, הטיפול יימשך בדרך כלל לפחות שבוע לאחר היעלמות התסמינים.

למניעת *קַנדִידָה* זיהום, הטיפול יימשך בדרך כלל לפחות שבוע לאחר שמספר תאי הדם הלבנים יחזור לקדמותו.

אם אתה מתגעגע למנה

הרופא שלך עוקב אחר התגובה והמצב שלך כדי לקבוע כמה זמן יש צורך בטיפול. עם זאת, אם אתה חושש שאולי החמצת מנה, פנה מיד לרופא שלך או לרופא אחר.

אם נותנים לך יותר מדי (מנת יתר)

הרופא שלך עוקב אחר התגובה והמצב שלך כדי לקבוע מה המינון הדרוש. עם זאת, אם אתה חושש שאולי קיבלת יותר מדי Mycamine, פנה מיד לרופא שלך או לרופא אחר.

בזמן שאתה מקבל Mycamine

דברים שאתה חייב לעשות

אם אתה עומד להתחיל להשתמש בתרופה חדשה כלשהי, הזכר לרופא ולרוקח שאתה מקבל Mycamine.

ספר לכל רופא, רופא שיניים ורוקח אחרים שמטפלים בך שאתה סובל מזה רפואה.

אם אתה עומד לעבור ניתוח, ספר למנתח או לרופא המרדים שאתה עובר את זה רפואה.
זה עשוי להשפיע על תרופות אחרות המשמשות במהלך הניתוח.

אם את נכנסת להריון בזמן קבלת תרופה זו, ספר לרופא מיד.

תופעות לוואי

ספר לרופא או לרוקח בהקדם האפשרי אם אתה לא מרגיש טוב בזמן שאתה מקבל Mycamine.

תרופה זו מסייעת לרוב האנשים במניעה או טיפול בזיהומים פטרייתיים, אך עשויות להיות תופעות לוואי לא רצויות אצל מספר אנשים. לכל התרופות יכולות להיות תופעות לוואי. לפעמים הם רציניים, רוב הזמן הם לא. ייתכן שתזדקק לטיפול רפואי אם אתה מקבל חלק מתופעות הלוואי.

אל תיבהל מהרשימות הבאות של תופעות הלוואי. ייתכן שלא תחווה אף אחד מהם.

שאל את הרופא או הרוקח שלך לענות על כל שאלה שיש לך.

ספר לרופא או לרוקח אם אתה מבחין באחד מהדברים הבאים והם מדאיגים אותך:

- שִׁלשׁוּל
- בחילה או הקאות

- עצירות
- חום או חום גבוה
- כאֵב ראֹש
- כאבי בטן או אי נוחות
- קלִקוּל קִבָּהָ
- עייפות
- אובדן תיאבון
- כאבי מפרקים או גב
- קשיי שינה
- להִשתַעֵל.

ספר לרופא שלך בהקדם האפשרי אם אתה מבחין באחד מהדברים הבאים:

- נפיחות של הידיים, הקרסוליים או הרגליים
- קוצר נשימה או קשיי נשימה

- פריחה, גירוד או כוורות
- דופק מהיר או שינויים באופן שבו הלב פועם
- קושי במתן שתן
- הצהבה של העור או העיניים.

הרשימה לעיל כוללת תופעות לוואי חמורות שעשויות לדרוש טיפול רפואי .

ספר לרופא או לרוקח אם אתה מבחין במשהו שגורם לך להרגיש לא טוב.

תופעות לוואי אחרות שאינן מופיעות לעיל עשויות להופיע גם אצל אנשים מסוימים.

חלק מתופעות הלוואי הללו (לדוגמה ,שינויים בתוצאות בדיקות דם או לחץ דם) ניתן למצוא רק כאשר הרופא שלך עושה בדיקות מעת לעת כדי לבדוק את ההתקדמות שלך.

אחרי קבלת מיקמין

אחְסון

יש לשמור בקבוקונים שלא נפתחו במקום קריר ויבש שבו
הטמפרטורה נשארת מתחת ל-25°ג.

יש להשתמש בתמיסת העירוי המוכנה מיד ולשמור אותה מוגנת מפני אור. אם ה

תמיסת עירוי נראית עכורה, אין להשתמש בה.

תיאור מוצר

כמו מה זה נראה

.UVמ"ג היא אבקה בצבע לבן להזרקה הכלולה בתוך בקבוקון זכוכית עם פקק גומי, מכסה הפוך כחול וסרט עטיפה מגן Mycamine 50

.UVמ"ג היא אבקה בצבע לבן להזרקה הכלולה בתוך בקבוקון זכוכית עם פקק גומי, פקק אדום הפוך וסרט עטיפה מגן 100 Mycamine

שתי החוזקות זמינות באריזות של 1או 10 בקבוקונים.

רכיבים

.כמרכיב הפעיל)כנתרן micafungin(מכיל 50 מ"ג או 100 מ"ג של Mycamine

כל בקבוקון מכיל גם:

- לקטוז
- חומצת לימון נטולת מים
- נתרן הידרוקסידי.

תרופה זו אינה מכילה סוכרוז, גלוטן, טרטרזין או כל צבעי אזו אחרים.

ספק

:מופץ בניו זילנד על ידי Mycamine

bioCSL)NZ(Ltd
ת.ד. 62 590
גרינליין, אוקלנד, 1546 ניו זילנד

-=סימן מסחרי רשום

מספרי רישום אוסטרליים:

50מ"ג - 100 R 196108
AUSTמ"ג - AUST R 196109

עלון זה הוכן במאי 2014.