Source : New Zealand Medicines Authority

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Mycamine-

Micafungine (sous forme de sodium)

Renseignements sur les médicaments destinés aux consommateurs

Que contient ce dépliant

Cette notice répond à quelques questions courantes sur Mycamine. Cela ne contient pas toutes les informations disponibles. Cela ne remplace pas la discussion avec votre médecin ou votre pharmacien.

Tous les médicaments ont des risques et des avantages. Votre médecin a évalué les risques que vous courez avec Mycamine par rapport aux bénéfices qu'il en attend pour vous.

Si vous avez des inquiétudes concernant la prise de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conservez cette notice.

Tu auras peut-être besoin de le relire.

Dans quel cas Mycamine est-il utilisé

Ce médicament est utilisé pour traiter :

- adultes, adolescents et enfants qui ont une infection fongique grave infection appelée candidose invasive (une infection causée par une levure appelée*Candidose*qui a pénétré le corps)
- adultes et adolescents ≥ 16 ans qui ont une infection fongique dans le tuyau alimentaire (œsophage) lorsqu'un traitement dans une veine est approprié
- adultes, adolescents et enfants à risque de développer une *Candidose*(levure) pendant que vous subissez un certain type de greffe de cellules souches ou si vous êtes censé avoir un nombre de globules blancs inférieur à un certain niveau.

Ce médicament appartient à un groupe de médicaments appelés échinocandines qui sont utilisés pour traiter les infections causées par des cellules fongiques ou de levure appelées Candida.

Il agit en interférant avec la production d'une partie de la paroi cellulaire fongique, rendant le champignon incapable de vivre et de se développer.

Demandez à votre médecin si vous avez des questions sur la raison pour laquelle ce un médicament vous a été prescrit.

Votre médecin peut vous l'avoir prescrit pour une autre raison.

Avant de recevoir Mycamine

Quand tu ne dois pas l'avoir

Ne prenez pas Mycamine si vous êtes allergique à :

- tout médicament contenant de la micafungine
- l'un des ingrédients énumérés à la fin de cette notice
- tout autre médicament appartenant au groupe des échinocandines.

Certains des symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure:

- essoufflement
- respiration sifflante ou difficulté à respirer
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou d'autres parties du corps
- éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire sur la peau

Ne conservez pas ce médicament après la date de péremption imprimée sur l'emballage ou si l'emballage est déchiré ou présente des signes d'altération.

Si vous ne savez pas si vous devez commencer à prendre ce médicament, parlez-en à votre médecin.

Avant de commencer à le prendre

Informez votre médecin si vous avez des allergies à d'autres médicaments, aliments, conservateurs ou colorants.

Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu l'une des conditions médicales suivantes :

- anémie hémolytique (anémie due à la dégradation des globules rouges) ou hémolyse (dégradation des globules rouges)
- problèmes rénaux tels que l'insuffisance rénale ou un test de la fonction rénale anormal
- problèmes hépatiques tels qu'insuffisance hépatique, hépatite ou tests de la fonction hépatique anormaux.

Dites à votre médecin si vous êtes enceinte ou prévoyez de devenir enceinte ou si vous allaitez. Votre médecin peut discuter avec vous des risques et des avantages encourus.

Si vous n'avez pas informé votre médecin de l'un des éléments ci-dessus, informez-le avant de commencer recevant Mycamine.

Prendre d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, y compris ceux que vous obtenez sans ordonnance de votre pharmacie, supermarché ou magasin d'aliments naturels.
Certains médicaments et Mycamine peuvent interférer entre eux. Ceux-ci inclus:

- itraconazole, médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques
- sirolimus, un médicament utilisé pour prévenir la greffe de rein rejet
- la nifédipine, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle.

Ces médicaments peuvent être affectés par Mycamine. Vous pouvez avoir besoin de différentes quantités de ces médicaments, ou vous devrez peut-être prendre des médicaments différents.

Votre médecin et votre pharmacien ont plus d'informations sur les médicaments à prendre avec précaution ou à éviter lors de la prise de ce médicament.

Comment Mycamine est administré

Ce médicament doit être préparé et vous être administré à l'hôpital par une infirmière ou un autre professionnel de la santé.

Combien vous sera donné

Votre médecin décidera de la quantité de Mycamine que vous recevrez chaque jour..

Pour les adultes, adolescents ≥ 16 ans :

- la dose habituelle pour traiter une maladie invasive *Candidose* l'infection est de 100 mg par jour pour les patients pesant plus de 40 kg et de 2 mg/kg par jour pour les patients pesant 40 kg ou moins
- la dose pour traiter un *Candidose* infection de l'œsophage est de 150 mg pour les patients pesant plus de 40 kg et de 3 mg/kg par jour pour les patients pesant 40 kg ou moins
- la dose habituelle pour les patients à risque de développer une *Candidose* l'infection est de 50 mg par jour pour les patients pesant plus de 40 kg et de 1 mg/kg par jour pour les patients pesant 40 kg ou moins.

Pour les enfants (y compris les nouveau-nés) et les adolescents de < 16 ans :

- la dose habituelle pour traiter une maladie invasive *Candidose* l'infection est de 100 mg par jour pour les patients pesant plus de 40 kg et de 2 mg/kg par jour pour les patients pesant 40 kg ou moins
- la dose habituelle pour les patients à risque de développer une *Candidose* l'infection est de 50 mg par jour pour les patients pesant plus de 40 kg et 1 mg/kg par jour pour les patients pesant 40 kg ou moins.

Quand il sera donné

Ce médicament est administré une fois par jour par perfusion lente dans une veine. La perfusion dure généralement une heure.

Combien de temps va-t-on te le donner

Pour le traitement d'une maladie invasive *Candidose* infection, vous recevrez généralement ce médicament pendant au moins 14 jours, mais le traitement se poursuivra généralement pendant au moins une semaine après que les symptômes et les résultats sanguins auront montré que l'infection a disparu.

Pour un *Candidose* infection de l'œsophage, le traitement se poursuivra généralement pendant au moins une semaine après la disparition des symptômes.

Pour la prévention de *Candidose* infection, le traitement se poursuivra généralement pendant au moins une semaine après le retour à la normale du nombre de globules blancs.

Si vous oubliez une dose

Votre médecin surveille votre réponse et votre état pour déterminer la durée du traitement nécessaire. Cependant, si vous craignez d'avoir oublié une dose, parlez-en immédiatement à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé.

Si on vous en donne trop (surdosage)

Votre médecin surveille votre réponse et votre état pour déterminer la dose nécessaire. Cependant, si vous craignez d'avoir reçu trop de Mycamine, parlez-en immédiatement à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé.

Pendant que vous recevez Mycamine

Choses que vous devez faire

Si vous êtes sur le point de commencer un nouveau médicament, rappelez à votre médecin et à votre pharmacien que vous recevez Mycamine.

Dites à tous les autres médecins, dentistes et pharmaciens qui vous traitent que vous souffrez de ce Médicament.

Si vous allez subir une intervention chirurgicale, informez le chirurgien ou l'anesthésiste que vous subissez ce Médicament.
Cela peut affecter d'autres médicaments utilisés pendant la chirurgie.

Si vous tombez enceinte pendant que vous recevez ce médicament, informez-en immédiatement votre médecin.

Effets secondaires

Informez votre médecin ou votre pharmacien dès que possible si vous ne vous sentez pas bien pendant que vous recevez Mycamine.

Ce médicament aide la plupart des gens à prévenir ou à traiter les infections fongiques, mais il peut avoir des effets secondaires indésirables chez quelques personnes. Tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Parfois ils sont sérieux, la plupart du temps ils ne le sont pas. Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux si vous ressentez certains des effets secondaires.

Ne vous inquiétez pas des listes d'effets secondaires suivantes. Vous n'en rencontrerez peut-être aucun.

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de répondre à toutes vos questions.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez l'un des effets suivants et qu'ils vous inquiètent :

- Diarrhée
- Nausées ou vomissements

- Constipation
- Fièvre ou température élevée
- Mal de crâne
- Douleur ou inconfort à l'estomac
- Indigestion
- Fatigue
- Perte d'appétit
- Douleurs articulaires ou dorsales
- Difficulté à dormir
- La toux.

Informez votre médecin dès que possible si vous remarquez l'un des effets suivants :

- Gonflement des mains, des chevilles ou des pieds
- Essoufflement ou difficulté à respirer
- Éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire
- Rythme cardiaque rapide ou changements dans la façon dont le cœur bat
- Difficulté à uriner
- Jaunissement de la peau ou des yeux.

La liste ci-dessus comprend les effets secondaires graves qui peuvent nécessiter des soins médicaux.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez quelque chose qui vous fait vous sentir mal.

D'autres effets secondaires non mentionnés ci-dessus peuvent également survenir chez certaines personnes.

Certains de ces effets indésirables (par exemple, des modifications des résultats des tests sanguins ou de la tension artérielle) ne peuvent être détectés que lorsque votre médecin effectue des tests de temps en temps pour vérifier vos progrès.

Après avoir reçu Mycamine

Stockage

Les flacons non ouverts doivent être conservés dans un endroit frais et sec où
la température reste inférieure à 25°C

La solution pour perfusion préparée doit être utilisée immédiatement et conservée à l'abri de la lumière. Si la solution pour perfusion apparaît trouble, elle ne doit pas être utilisée.

Description du produit

À quoi il ressemble

Mycamine 50 mg est une poudre injectable de couleur blanche contenue dans un flacon en verre muni d'un bouchon en caoutchouc, d'un capuchon amovible bleu et d'un film rétractable anti-UV.

Mycamine 100 mg est une poudre injectable de couleur blanche contenue dans un flacon en verre muni d'un bouchon en caoutchouc, d'un capuchon amovible rouge et d'un film rétractable anti-UV.

Les deux dosages sont disponibles en boîtes de 1 ou 10 flacons.

Ingrédients

Mycamine contient 50 mg ou 100 mg de micafungine (sous forme de sodium) comme ingrédient actif.

Chaque flacon contient également :

- lactose
- acide citrique anhydre
- hydroxyde de sodium.

Ce médicament ne contient pas de saccharose, de gluten, de tartrazine ou d'autres colorants azoïques.

Fournisseur

Mycamine est distribué en Nouvelle-Zélande par :

bioCSL (NZ) Ltd
Case postale 62 590
Greenlane, Auckland, 1546
Nouvelle-Zélande

- =Marque déposée

Numéros d'immatriculation australiens :

50 mg - AUST R 196108
100 mg - AUST R 196109

Cette notice a été rédigée en mai 2014.